

วิธีการควบคุมการออกดอกออกต่อผลผลิต ขนาดและคุณภาพผลในการผลิตมะนาวอกรดู
Modification of flowering enhancement on yield and fruit quality
for off-season crop production in lime

นายวสันต์ ผ่องสมบูรณ์

นายอนุรักษ์ สุขารมย์

นายทวีป หลวงแก้ว

บทคัดย่อ

สภาพการขาดแคลนมะนาวในฤดูแล้งยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เทคโนโลยีของการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดินร่วมกับเทคนิคของการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือกเพื่อส่งเสริมการออกดอกผลของมะนาวออกฤดูกาลได้ อาจยังไม่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่เกษตรกรเลือกนำไปใช้เพื่อการผลิตมะนาวอกรดู จึงได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูกาลมะนาว โดยศึกษาวิธีการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดินร่วมกับการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก วิธีการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดินในความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก วิธีการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดินในปริมาณ ๐.๒๕ กรัมต่อทรงฟุ่มต้นกว้าง ๑ เมตรร่วมกับวิธีการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก(วิธีแน่นำ) และวิธีการไม่มีการบังคับการออกดอก(untreated control) กับมะนาวพันธุ์แป้นรำไโพ่าย อายุ ๓ ปี ที่สวนเกษตรกรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕(แปลง๑) และ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖(แปลง๒) ผลการทดลองพบว่า ทั้ง ๓ วิธีการของการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดิน และวิธีการให้สารพาโคลบิวท์ราชาโอลิทางดินในปริมาณ ๐.๒๕ กรัมต่อทรงฟุ่มต้นกว้าง ๑ เมตรร่วมกับวิธีการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือกมีผลทำให้ต้นมะนาวออกดอกก่อนฤดูระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม และให้ผลผลิตในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งสองปี โดยออกดอกเฉลี่ยระหว่าง ๗๒.๕ - ๘๒.๑% และเฉลี่ยระหว่าง ๗๕.๕ - ๘๐.๖% และให้ผลผลิตจำนวนระหว่าง ๑,๐๙๐.๒ - ๑,๒๓๑.๑ ผลต่อต้น และเฉลี่ยจำนวนระหว่าง ๑,๒๙๓.๐ - ๑,๕๓๑.๑ ผลต่อต้นในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตามลำดับ ขณะที่ต้นมะนาวที่ไม่มีการบังคับการออกดอกสามารถออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูน้อยที่สุดกล่าวคือ ออกดอกเฉลี่ย ๒๑.๙% และ ๒๒.๗% และมีผลผลิตเฉลี่ย ๓๓๓.๒ และ ๔๔๗.๑ ผลต่อต้น ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตามลำดับ ต้นมะนาวที่ได้รับการบังคับการออกดอกด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีความสามารถในการให้ผลผลิตในฤดูกาล(ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอกด้วยวิธีเดียว(control)

คำสำคัญ : นอกฤดู ออกดอกสะสม วิธีการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

๖. คำนำ

ในแต่ละปีมักประสบปัญหาผลผลิตมะนาวขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง(นอกฤดูกาล) แต่กลับล้นตลาดในช่วงฤดูฝน(ในฤดูกาล) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกไม่ประสบความสำเร็จในการผลิตมะนาวเป็นการค้าจากการได้รับผลตอบแทนต่ำไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในการปฏิบัติจัดการสวน การควบคุมให้ต้นมะนาวสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เป็นหนทางหลักของการแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นคือ ต้องมีวิธีการในการควบคุมให้ต้นมะนาวสามารถสร้างดอกและติดผลได้หนาแน่นมากขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษจิกายน อันจะทำให้มีผลผลิตเก่าเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้ในช่วงเวลาห่างจากเดือนมกราคม กุழพันธ์ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการมาก มะนาวจึงมีราคาแพง นอกจากนี้การควบคุมให้ต้นมะนาวสามารถออกดอกและผลได้ก่อนฤดูดังกล่าวอย่างก่อให้เกิดผลดีตามมาโดยจะส่งผลให้ต้นมะนาวมีความสามารถออกดอกติดผลในฤดูกาลปกติได้ลดลง ระหว่างเดือนมกราคม กุழพันธ์ มีนาคม และเมษายน เป็นผลให้มีผลผลิตตามฤดูกาลน้อยลง แก้ปัญหามะนาวล้นตลาด ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการกระจายฤดูกาลของการผลิตมะนาวได้ต่อเนื่องตลอดปี

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดูหรือฤดูแล้งให้มีคุณภาพเพื่อการบริโภคสด จำเป็นต้องเพิ่มความสามารถของต้นมะนาวในการออกดอกและติดผลได้มากขึ้น และสร้างดอกและผลตามฤดูกาลได้ลดลง เพื่อเพิ่มการกระจายการผลิตมะนาวออกสู่ตลาดได้ต่อเนื่องจนตลอดจนสามารถผลิตได้ยั่งยืนยังมีความสัมพันธ์กับการจัดการควบคุมให้สภาพต้นมีความสมบูรณ์และแข็งแรงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นต่างๆ พร้อมที่จะให้มีการเจริญออกดอก และสามารถให้ผลผลิตในรุ่นต่อไปได้ดีนั้น ยังต้องร่วมพัฒนาการจัดการด้านอื่นๆ ได้แก่ เขตกรรม ภารกษาพีช พันธุ์ รวมทั้ง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตมะนาวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันมีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดใหม่กันอย่างกว้างขวางและหลาย ใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการสร้างและพัฒนาการของ ดอก ผล กิ่งใบ ลำต้น และราก ตลอดจน เมล็ดพันธุ์พืชหล่ายชนิดและพันธุ์ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มะม่วง กล้วยไม้ แก้วมังกร มะละกอ รวมทั้งข้าว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มการออกดอก ติดผล การเจริญและพัฒนาของผลซึ่งมีผลไปถึงคุณภาพดอกและผลหลังเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

มีรายงานการศึกษาพบประสิทธิภาพของการให้สารพาโคลบิวทร้าโซล ซึ่งเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินในเมล็ดหล่ายชนิดมีผลส่งเสริมการออกดอกก่อนฤดูของมะนาวได้(จาร์ง และคณะ, ๒๕๔๐ ; อำนวย, ๒๕๔๑) ซึ่งพบว่าการให้ทางดินรอบโคนต้นด้วยสารพาโคลบิวทร้าโซลอัตราเนื้อสาร ๑ กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง ๑ เมตรในสภาพดินเหนียว และอัตราเนื้อสาร ๑.๕-๒ กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง ๑ เมตรในสภาพดินทราย สามารถกระตุ้นการออกดอกก่อนฤดูของมะนาวได้ภายใน ๒ เดือนหลังการให้สาร แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปใช้เป็นเทคโนโลยีปฏิบัติควบคุมให้ได้ผลอย่างแน่นอนรวมทั้งอาจทำให้เกิดผลเสียอันเนื่องจากการสะสมตาก้างของสารดังกล่าวในดินและในต้นมะนาวซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นมะนาวลดลง การศึกษาและพัฒนาเทคนิคของการบังคับการออกดอกได้ ได้แก่การใช้เทคนิคของการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือกมีผลส่งเสริมการออกดอกของมะม่วง(Blaikie et al., ๒๕๔๔ ; Pongsomboon et al., ๒๕๔๔) ลำไย(พาวิน และคณะ, ๒๕๔๓) การนำเสนอเทคนิคดังกล่าวมาศึกษาและพัฒนาปรับใช้ กับมะนาวอาจสามารถควบคุมการออกดอกและผลของสวนมะนาวได้ดีและแน่นอนมากยิ่งขึ้น

๗. วิธีดำเนินการ

- อุปกรณ์

๑. ต้นมะนาวพันธุ์เปลี่ยนรำไพ อายุระหว่าง ๓-๕ ปีที่ปลูกในสภาพดินเหนียวและเจริญเติบโตสม่ำเสมออยู่ในวัยที่ให้ผลผลิตได้ ณ สวนเกษตรกร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๒. สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในการศึกษาทดลองนี้คือสารพาโคลบิวทร้าโซล

๓. ปุ่ยทางดิน ได้แก่ ปุ่ยคอก และปุ่ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖ , ๔๐-๐-๐ และ ๐-๐-๖๐
๔. สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จำเป็น
๕. เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพายหลังขนาดความจุ ๒๕ ลิตร
๖. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควนและรักษาต้น ได้แก่ เลื่อย กรรไกรตัดแต่งกิ่ง และเชือกปอมนิล่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑.๒ มิลลิเมตร
๗. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารพาโคลบิวราโซลและสารอื่นๆแก่ต้นมะนาวได้แก่ เครื่องซึ่งเครื่องพ่นสารเคมีชนิดเครื่องยนต์ ภาชนะต่างๆ จบ และบัวหัวน้ำสำหรับผสมสารดังกล่าวกับน้ำ

- วิธีการ

เป็นการศึกษา ผลของการให้สารพาโคลบิวราโซลทางใบร่วมกับการควนและรักษาต้นด้วยเชือกต่อการออกดอกติดผลนอกฤดูของมะนาวพันธุ์การค้า โดยเปรียบเทียบกับวิธีการให้สารพาโคลบิวราโซลทางดินอัตรา ๐.๒๕ กรัมต่อหงายพื้นที่ ๑ เมตรร่วมกับการควนและรักษาต้นด้วยเชือกซึ่งเป็นวิธีแนะนำให้ใช้ในการผลิตมะนาวฤดูแล้ง รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลกระทบของวิธีการต่างๆ ต่อการเจริญและการให้ผลผลิตได้ในปีต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ติดต่อสวนเกษตรกรแหล่งปลูกมะนาว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ขอใช้ทำแปลงทดลอง
- คัดเลือกต้นทดลองมะนาวพันธุ์เปลิร์นร่าไฟ อายุระหว่าง ๓-๕ ปี ที่มีขนาด ความสมบูรณ์สูงมาก และสามารถให้ผลผลิตได้

- ปฏิบัติโดยต้นทดลองตามเกณฑ์ที่เหมาะสม(GAP)ของส้มและมะนาว

- หลังตัดแต่งกิ่งและต้นในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เริ่งการสร้างกิ่งใบใหม่ด้วยการให้น้ำปุ่ยคอกหรือปุ่ยหมัก ร่วมกับปุ่ยเคมี และสารที่จำเป็น ดูแลกิ่งใบรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์ร่วมกับการจัดการอารักษาพืชเป็นระยะๆ วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี ๖ ชุด(blocks)(๕ต้นเป็น ๑ block) และ ๕ กรรมวิธี ประกอบด้วย

- ๑) พ่นสารทางใบด้วยสารพาโคลบิวราโซลความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๒) ควนและรักษาต้นร่วมกับพ่นสารทางใบด้วยสารพาโคลบิวราโซลความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๓) ควนและรักษาต้นร่วมกับพ่นสารทางใบด้วยสารพาโคลบิวราโซลความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๔) ควนและรักษาต้นร่วมกับการฉีดสารพาโคลบิวราโซลทางดิน ปริมาณ ๐.๒๕ กรัมต่อหงายพื้นที่ ๑ เมตร(วิธีแนะนำ)
- ๕) ไม่ปั้งคันออก(cut)

- ให้กรรมวิธีบังคับออกดอกในระยะเวลาเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน

วิธีการให้สารทางใบ โดยละลายสารพาโคลบิวราโซลตามสัดส่วนที่กำหนดกับน้ำสะอาด และผสมสารจับในลงในถังพ่นสาร พ่นสารเปยกชุ่มใบทั่วต้นจนไฟลั้น(run off)

ส่วนวิธีการฉีดสารพาโคลบิวราโซลทางดินทำโดยก่อนวันฉีดสารดังกล่าว ๑ วัน ถ้าฝนไม่ตก มีการให้น้ำแก่ต้นทดลองให้เปยกชุ่มเพื่อให้ดินมีสภาพชื้นพร้อมต่อการคุ้งชับน้ำและอาหาร เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นใช้จอบหรือพลาวรุ่งดูด ทำแฉ่งตื้นรับน้ำรอบโคนต้นสัมรรถมีประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ละลายสารพาโคลบิวราโซลตามกำหนดด้วยน้ำสะอาดปริมาตรระหว่าง ๔ ลิตรและระดับลงเอ่งรอบโคนต้นที่เตรียมไว้ สารเคมีดังกล่าวจะค่อยๆซึมสู่ดินและรากหลังจากนั้นมีการให้น้ำตามให้เปยกชุ่มอีก ๑-๒ วันเพื่อส่งเสริมการคุ้งชับสารดังกล่าว

การควนและรักษาต้นด้วยเชือกเริ่มจากพิจารณาส่วนของลำต้นที่เจริญเหนือพื้นดินขึ้นมาเป็นหลัก โดยส่วนของลำต้นที่จะทำการควนมีลักษณะกลมเรียบโดยรอบไม่เป็นร่องเว้าลึกเพื่อรองรับการคล้องและสอดรัดด้วยเส้นเชือกปอเข้าร่องเหล็กจากการควน กรณีต้นมะนาวทดลองไม่มีลักษณะเหมาะสมดังกล่าว ได้แก่ ส่วนของลำต้นเจริญเหนือพื้นดินเป็นร่องเว้าไม่กลมเรียบ หรือส่วนของกิ่งแขนงหลักเจริญแยกจากส่วนโคนลำต้น พิจารณาเลือกส่วนของ

กิ่งแขนงหลักซึ่งมีลักษณะกลมเรียบไม่เป็นร่องว้าดังกล่าว ใช้เลือยตัดแต่งกิ่งหรือเลือยอื่นที่มีขนาดเดียวกันที่นิปัพน คุมและค่อนข้างถี่ ควนกิ่งต้นมะนาวให้รอยควนอยู่สูงจากพื้นดินกว่า ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไปและควน ๑ รอยเกือบรอบกิ่งต้นให้เว้นรอยไม่ถูกควนไว้ประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ควนเฉพาะส่วนเปลือกต้น(ตัดห่ออาหาร)กำหนดขนาด รอยแพลลิกถึงส่วนเนื้อไม้และกว้างร้าว ๑.๕-๒.๐ มิลลิเมตรหรือมีขนาดเท่าร่องเลือย จากนั้นจึงรัดรอบรอยแพลลิก ด้วยเชือกป้อมน้ำ寥ที่มีขนาดเดียวกับร่องแพลลิกให้เส้นเชือกคล้องลงไปในรอยแพลลิกบนปิดมิดรอยควนแล้ว จึงมัดเชือกขั้นชั้นเนาะตรงบริเวณที่ไม่ถูกควน และหารอยแพลลิกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรากที่เมื่อรัดกิ่งต้นด้วยเชือก แล้วเสร็จและหลังปลดเชือกออกเมื่อต้นมะนาวอกดอก เพื่อให้รอยแพลลิกประสานกันและมีการปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาเพื่อส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของดอกและผล

หลังวันบังคับออกดอก บำรุงต้นด้วยการพ่นทางใบ ราศุอาหารรอง จุลธาตุและอาหารเสริมที่จำเป็น ได้แก่ แคลเซียม โปรตีน สังกะสี แมgnีเซียม และอื่นๆ ร่วมกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู และโรคของมะนาว และใส่ปุ๋ยทางดินสัดส่วน ๓:๑:๔ ได้แก่สูตร ๑๕:๕:๒๐ อัตราตามคำแนะนำจากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อเร่งการพัฒนาการของกิ่งใบให้สมบูรณ์สม่ำเสมอทั่วต้นส่งเสริมการสร้างดอกและให้ผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้ง และเมื่อติดผลแล้ว ๑-๒ เดือน ให้ปุ๋ยสูตร ๑๕:๕:๒๐+๒ และเสริมด้วยการพ่นทางใบ ราศุอาหารรอง จุลธาตุและอาหารเสริมที่จำเป็น ได้แก่ แคลเซียม โปรตีน สังกะสี แมgnีเซียม และอื่นๆ ร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรู และโรคของมะนาว

การบันทึกข้อมูล ลักษณะและขนาดของการออกดอกนอกฤดู วันเริ่มและสิ้นสุดการออกดอกนอกฤดู การออกดอกในฤดูที่ตามมา ผลผลิตต่อต้นทั้งนอกและในฤดู และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา

%การออกดอกได้ของต้นมะนาว คิดจาก ค่าเฉลี่ยร้อยละของจำนวนกิ่งที่ออกดอกได้จากการสุ่มพื้นที่ผิว ทรงพุ่ม ๔ ทิศทาง ๑ ตารางเมตร โดยแต่ละทิศใช้การบันทึกจำนวนกิ่งยอดที่ออกดอกได้(flowering terminals)ต่อ จำนวนกิ่งยอดทั้งหมด(total terminals)ในพื้นที่ทรงพุ่มดังกล่าวและคำนวณค่าเป็นร้อยละ

- เวลาและสถานที่

ระยะเวลา เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และสิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๕๖

สถานที่ ดำเนินการศึกษา ณ สวนเกษตรกร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

๔. ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาการใช้เทคนิคของการควนและรัดกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทร่าโซลทามาในการบังคับการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูของมะนาวพันธุ์เป็น ปรากฏผลดังต่อไปนี้

ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จากการให้กรรมวิธีทดลองต่างๆ กันต้นมะนาวในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ (แปลง๑) พบว่าทุกกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกต่างๆ(กรรมวิธีที่ ๑ ๒ ๓ และ๔) ยกเว้นกรรมวิธีที่ไม่มีการบังคับการออกดอกด้วยวิธีใดๆ(control)(กรรมวิธีที่ ๕) สามารถกระตุ้นให้ต้นมะนาวออกดอกได้ก่อนฤดูได้เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยออกดอกหนาแน่นมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษจิกายน (๒๕๕๕) มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกสะสม (cumulative flowering) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ออกดอกเฉลี่ยระหว่าง ๗๒.๕ - ๘๗.๑% ขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอกได้น้อยที่สุดเฉลี่ย ๗๑.๙%(ดัง Table ๑.) จนกระทั่งในระยะฤดูหนาวของการออกดอกในรอบปีหลังจากผ่านช่วงเวลาของอากาศแห้งแลเหี่ยน ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ต้นมะนาวโดยทั่วไปมีการพักตัวหยุดการเจริญเติบโตสะสม อาหาร มีการพัฒนาการของตัวดอก และเจริญออกดอกได้หนาแน่นรวมถึงปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เฉลี่ย ๘๕.๐% และในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๕ดังกล่าวต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการให้สารพาโคลบิวทร่าโซลทามาทั้งที่ระดับความเข้มข้น ๒๐๐ และ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับวิธีการควนและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก และต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการให้สารพาโคลบิวทร่าโซลทามาที่ระดับความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างเดียว สามารถออกดอก

ได้น้อยและไม่แตกต่างทางสถิติกับต้นม翰นาที่ได้รับการบังคับออกอดอกรด้วยวิธีการให้สารพาโคลบิวราโซลทางดิน ในปริมาณ ๐.๒๕ กรัมต่อหงส์พุ่มต้นกว้าง ๑ เมตรร่วมกับวิธีการควนและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก(วิธีแนะนำหรือเปรียบเทียบ) ออกอดอกรดได้เฉลี่ยระหว่าง ๑๙.๙ - ๒๐.๗% ซึ่งลดลงกว่าต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรดๆ รวม ๔ เท่า (ดังTable ๑) อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนต้นม翰นาทั้งที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ และที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรด(control) มีการออกอดอกรดเล็กน้อยประปาระหว่าง ๘.๐ - ๑๙.๗% จนกระทั่งปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรด มีการสร้างดอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ ๓๗.๗% ในขณะที่ต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ ทั้ง๔ กรรมวิธีออกอดอกรดได้น้อยระหว่าง ๙.๒ - ๑๔.๖%

ต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ สามารถให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยเฉลี่ยจำนวนระหว่าง ๑,๐๙๐.๒ - ๑,๒๓๑.๑ ผลต่อต้น มากกว่าต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรด(control)(เฉลี่ยจำนวน ๑๑๓.๒ ผลต่อต้น) และในทางตรงกันข้าม ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลจากต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ ทั้ง๔(กรรมวิธีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมโดยเฉลี่ยจำนวนระหว่าง ๕๓๔.๔ - ๖๑๗.๘ ผลต่อต้น (Table ๑)

ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีทดลองในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ແປງໝ) ปรากฏว่าทุกกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรด ยกเว้นกรรมวิธีที่ไม่มีการบังคับการออกอดอกรดด้วยวิธีใดๆ (control) สามารถกระตุ้นให้ต้นม翰นาออกอดอกรดได้ก่อนฤดูการระหว่างต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และมีเปอร์เซ็นต์การออกอดอกสะสม (cumulative flowering) ไม่แตกต่างกันโดยออกหนาแน่นมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเปอร์เซ็นต์การออกอดอกสะสม (cumulative flowering) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ออกอดอกรเฉลี่ยระหว่าง ๗๕.๕ - ๘๐.๖% (Table ๓) ขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรดต่างๆ ออกอดอกรได้น้อยที่สุดเฉลี่ย ๒๒.๗% (ดัง Table ๓) และเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวของการออกอดอกในฤดูหนาวปลายเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ (กรรมวิธีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) สามารถออกอดอกได้น้อยมาก(เฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๓, ๑๐.๔, ๘.๖ และ ๗.๕ % ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการออกอดอกของต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรดต่างๆ (เฉลี่ยเท่ากับ ๘๗.๑%) หลังจากนั้นในระยะเวลาระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ทุกต้นม翰นาทดลองมีการออกอดอกรดได้เล็กน้อยโดยปริบประภัยและพร้อมหรือหลังการแตกใบใหม่ จนกระทั่งกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรด มีการสร้างดอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ ๕๓.๑%. ในขณะที่ต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ ทั้ง๔ กรรมวิธียังออกอดอกรดได้บ้างเฉลี่ยระหว่าง ๑๙.๒ - ๒๔.๖% (ดัง Table ๓)

ในทำนองเดียวกันต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ สามารถให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยเฉลี่ยจำนวนระหว่าง ๑,๒๗๓.๐ - ๑,๕๓๑.๑ ผลต่อต้น มากกว่าต้นม翰นาที่ไม่ได้รับการบังคับออกอดอกรด(control)(เฉลี่ยจำนวน ๔๕๗.๑ ผลต่อต้น) และในทางตรงกันข้าม ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลจากต้นม翰นาที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกอดอกรดต่างๆ ทั้ง๔(กรรมวิธีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมโดยเฉลี่ยจำนวนระหว่าง ๕๓๔.๔ - ๖๑๗.๘ ผลต่อต้น (Table ๔)

การศึกษานี้ แสดงผลสอดคล้องกับรายงานการศึกษาและแนะนำการใช้เทคโนโลยีการให้สารพาโคลบิวราโซลในการบังคับม翰นาให้ออกอดอกรดโดยผ่านกระบวนการออกฤดูกาล(รำง และคณ, ๒๕๔๖; วสันต์ และ รำง, ๒๕๔๖) ผลของสารพาโคลบิวราโซลในการบังคับการออกอดอกนอกฤดูของพืชหลายชนิดเนื่องจากอิทธิพลของสารเคมีดังกล่าวในการยับยั้งการสร้างสารจิบเบอเรลลินในส่วนเนื้อเยื่อเจริญ (subapical meristems) ของพืชมีผลลดการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบและส่งเสริมการพัฒนาการของตัวดอกของพืชได้ (พีระเดช, ๒๕๕๒)

การตอบสนองของต้นม翰นาในการออกอดอกรดและให้ผลผลิตได้ก่อนฤดูกาลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของต้นม翰นาในการให้ผลผลิตได้ในฤดูกาลในระยะเวลาต่อมาอย่างมาก แต่พบว่าต้นม翰นาที่ได้รับ

การบังคับการออกดอกด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีความสามารถในการให้ผลผลิตในฤดูกาล (ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ได้ลดลงเฉลี่ยประมาณ ๓ - ๔ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นมีนาคมที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอกด้วยวิธีใดๆ (control) ซึ่งให้ผลผลิตในฤดูกาลดังกล่าวโดยเฉลี่ยจำนวน ๑,๔๔๖.๔ และ ๑,๔๔๖.๐ ผลต่อตัน (ดู Table ๒ และ Table ๔ ตามลำดับ)

จากการทดลองนี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมให้มีความมีการกระจายช่วงฤดูกาลของการผลิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากวิธีการบังคับการออกดอกของมีนาคมโดยการให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซล ทางไปในความเข้มข้นของสาร ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรมีปริมาณเนื้อสารอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับเทคนิคของการให้สารดังกล่าวทางดิน(ปริมาณ ๐.๒๕ กรัมเนื้อสารต่อกวนดินที่หุ่งว่าง ๑ เมตร) ซึ่งนอกจากเป็นการลดต้นทุนและปริมาณสารเคมีดังกล่าวต่อกองค้างในดินและต้นพืชแล้ว การแนะนำใช้ต่ำที่ทดสอบให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องอาจทำได้สะดวกกว่า

และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองกับมีนาคมที่ปีกุลจากต้นที่ได้รับการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ต้นจะไม่มีระบบของรากแก้ว สภาพต้นมีนาคมมักอ่อนแอบและโอมได้ง่าย ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป จึงนำที่จะมีการศึกษาหาแนวทางควบคุมให้เกิดการกระจายฤดูกาลผลิตมีนาคมที่ปีกุลโดยการใช้ต้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังควรศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถควบคุมการออกดอกติดผลมีนาคมที่ปีกุลที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่ต้องปลูกซ้อมหรือย้ายพื้นที่แปลงปลูกมีนาคมและลดปัญหาการจัดการสวนทั้งด้านเขตกรรมและการอารักขาพืช

๙. สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ

จากการศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกต่อผลผลิต ขนาดและคุณภาพผลในการผลิตมีนาคมออกฤดู ด้วยการใช้การให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซลทางใบร่วมกับเทคนิคของการคั่นและรัดกิ่งต้นในการบังคับการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูของมีนาคมที่ปีกุลแบ่งรำไพ สรุปได้ดังนี้

๑) ที่วิธีการให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซลทางใบความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และวิธีการให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซลทางใบที่ความเข้มข้น ๒๐๐ หรือ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับเทคนิคของการคั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือกมีผลควบคุมให้เกิดการออกดอกและการให้ผลผลิตก่อนฤดูของมีนาคมที่ปีกุลแบ่งรำไพได้ไม่แตกต่างกันของทั้ง๒ รอบปีโดยออกดอกเฉลี่ยระหว่าง ๗๒.๕ - ๘๒.๑% และให้ผลผลิตจำนวนระหว่าง ๑,๐๙๐.๒ - ๑,๒๓๑.๑ ผลต่อตันในปี๒๕๕๔-๒๕๕๕ และออกดอกเฉลี่ยระหว่าง ๗๕.๕ - ๘๐.๖% และให้ผลผลิตจำนวนระหว่าง ๑,๒๙๓.๐ - ๑,๔๓๑.๑ ผลต่อตันในปี๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒) วิธีการไม่มีการบังคับการออกดอกสามารถออกดอกและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นอกฤดูน้อยที่สุดเฉลี่ย ๒๑.๙% และเฉลี่ยจำนวน ๓๐๓.๒ ผลต่อตัน ตามลำดับในปี๒๕๕๔-๒๕๕๕ และเฉลี่ย ๒๒.๗% และเฉลี่ยจำนวน ๔๙๗.๑ ผลต่อตัน ตามลำดับในปี๒๕๕๔-๒๕๕๖

๓) ต้นมีนาคมที่ได้รับการบังคับการออกดอกด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีความสามารถในการให้ผลผลิตในฤดูกาล (ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นมีนาคมที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอกด้วยวิธีใดๆ (control)

๔) วิธีการให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซลทางใบความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสามารถควบคุมให้เกิดการออกดอกและการให้ผลผลิตช่วงก่อนฤดูของมีนาคมที่ปีกุลแบ่งรำไพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลจากการวิจัยนี้สามารถแนะนำวิธีการให้สารพาร์โคโลบิวทร่าโซลทางใบความเข้มข้น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อควบคุมให้เกิดการออกดอกและการให้ผลผลิตช่วงก่อนฤดูของมีนาคมที่ปีกุลแบ่งรำไพ

สามารถส่งเสริมให้แก่เกษตรกรได้นำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการผลิตมะนาวเป็นการค้า และเป็นแนวทางของการกระจายการให้ผลผลิตมะนาวได้ตลอดปีมากขึ้น

๑๑. คำขอบคุณ

คณะผู้ดำเนินงานขอขอบคุณ เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวที่สนับสนุนแปลงทดลองมะนาว คือ นายอุบล อ่องเกา ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๒ ที่ได้ให้การสนับสนุน ตลอดจน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการช่วยปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

๑๒. เอกสารอ้างอิง

รั่ง ช่วยเจริญ วสันต์ ผ่องสมบูรณ์ ปิติมน์ พัชร์ดำรงกุล และ ชำนาญ ทองกลัด. ๒๕๔๐. การศึกษาปริมาณการใช้สารพาโคคลบิวทร่าโซลทางดิน และช่วงเวลาการให้สารให้โดยเรียบต่อการอุดอุกและการให้ผลผลิตมะนาวออกฤทธิ์. หน้า ๓๒๘ - ๓๒๙ ใน รายงานผลการวิจัยประจำปี ๒๕๔๐, ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร, สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.

รั่ง ช่วยเจริญ วสันต์ ผ่องสมบูรณ์ อนุรักษ์ สุขารามย์ และ ไชยวัฒน์ วัฒนไชย. ๒๕๔๖. การใช้สารแพคโคคลบิวทร่าโซลและเทคนิคการคั่นและรัดกิ่งต้นเพื่อควบคุมการผลิตมะนาวออกฤทธิ์. วารสารวิชาการเกษตร. ๒๑(๒):๓๖ - ๑๔๑.

ประทีป กุณาล. ๒๕๔๒. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ผล. เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่องฮอร์โมนจำเป็นหรือไม่ในการผลิตพืชสวน ในการจัดงานนิทรรศการ งานพืชสวน๒๕๔๒”งานพืชสวนสร้างสรรสรพนอาชีพ” วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒.

พีระเดช ทองคำไฟ. ๒๕๓๒. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๑๗๙ หน้า

พาวิน มะโนชัย, วินิธรรม สุทธนต์, วินัย วิริยะวงศ์, เอกสนต์ อุสสหานันท์ และ นภดล จรัสสัมฤทธิ์. ๒๕๔๓. ผลของการคั่นกิ่งต่อการอุดอุกของลำไยพันธุ์เพชรสาครระหว่าง วารสารเกษตร. ปีที่๑๖ ฉบับที่ ๒. หน้า ๑๗๑-๑๗๓.

วสันต์ ผ่องสมบูรณ์ และ รั่ง ช่วยเจริญ. ๒๕๔๖. จัดการสวนอย่างไร? จึงได้มะนาวฤทธิ์แล้ว.. เอกสารเผยแพร่ วิชาการ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. ๗ หน้า.

อำนาจ สิงหมล. ๒๕๔๑. อิทธิพลของสารพาโคคลบิวทร่าโซลต่อการอุดอุกและติดผลของมะนาวพันธุ์แป้นเมือง การปลิดผลบนต้นออกก่อนการให้สาร. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, ภาควิชาพืชสวน, คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.๑๓ หน้า.

Blaikie, S.J., J. Leonardi, J.W. Muller, N. Scott Steele and E.K.Chacko. ๑๙๙๙. Effect of cincturing and chemical treatments on growth and yield of mango cv. Kensington Pride. Page.๙๖ In Working Abstract & Program, The Sixth International Mango Symposium, April ๖-๙, ๑๙๙๙, Pattaya, Thailand.

Pongsomboon, W., P. Thayamanonda and P. Anupunt. ๑๙๙๙. Effects of cincturing, Sirocare and paclobutrazol applications on flowering and fruiting of cvs. Khieo Sawoei and Nam Dokmai mangoes. Pages ๑๗-๒๗ In: Annual Report ๑๙๙๙/๙๙. Flowering Behaviour and Subsequent Productivity of Mangoes ACIAR Project ๙๐๑. Horticultural Research Institute, Department of Agriculture, Bangkok.

၆၈. ဂာကန်သာ

Table ၁. Effects of paclobutrazol foliar application and cincturing technique on off-season and subsequent on-season flowerings(%) for ၃- year-old ‘Pan’lime trees grown in the farmer orchard at Phichit in ၂၀၁၈-၂၀၁၉. The treatments were applied to the experimented trees on ၃၀ September, ၂၀၁၈.(plot ၁)

Treatments	Off-season flowering (%) ^{a/} (October- December,၂၀၁၈)	On-season flowering (%) ^{b/}			
		၁၁ January ၂၀၁၉	၁၄ March ၂၀၁၉	၁၅ April ၂၀၁၉	၁၆ June ၂၀၁၉
၁.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁}	၄၇.၈၈	၂၀.၈၃b	၁၇.၈၁	၁၈.၈ b	၂၄.၂ b
၂.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၂၈.၈၈	၂၀.၈၃b	၁၈.၅	၁၈.၅ ab	၁၈.၅ b
၃.) Paclobutrazol foliar spray at ၆၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၂၈.၈၈	၁၇.၈၃b	၁၇.၀	၁၈.၈ a	၁၉.၅ b
၄.) Paclobutrazol soil application at 0.၂၅g m ^{-၂} tree diameter combined with cincturing (recommended)	၂၈.၈၈	၁၇.၈၃b	၁၈.၈	၂၄.၈ b	၁၈.၈ b
၅.) Non treated (control)	၂၈.၈၃b	၂၈.၀၂	၂၄.၂ ^{ns}	၂၈.၀ b	၂၈.၈ a
CV(%)	၁၈.၈	၂၈.၈	၁၈.၈	၁၈.၈	၁၈.၈

ns : non-significant difference

The mean values not sharing with the common letters are significantly different at $P \leq 0.05$.

Table ၂. Effects of paclobutrazol foliar application and cincturing technique on crop yield(a number of fruit per tree) for ၃- year-old ‘Panrumpai’lime trees grown in the farmer orchard at Phichit in ၂၀၁၈-၂၀၁၉. The treatments were applied to the experimented trees on ၃၀ September, ၂၀၁၈. (plot ၁)

Treatments	a number of fruit per tree	
	Off-season crop ^{a/}	On-season crop ^{b/}
၁.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁}	၈,၂၈၈.၈ a	၂၅၁၈.၈ b
၂.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၈,၁၉၈.၈ a	၁၀၀၄.၈ b
၃.) Paclobutrazol foliar spray at ၆၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၈,၀၅၀.၈ a	၂၈၈.၈ b
၄.) Paclobutrazol soil application at 0.၂၅g m ^{-၂} tree diameter combined with cincturing (recommended)	၈,၂၈၈.၈ a	၁၈၈.၈ b
၅.) Non treated (control)	၈,၀၈၈.၈ b	၈,၂၅၈.၈ a

The mean values not sharing with the common letters are significantly different at $P \leq 0.05$.

^{a/} Data were collected between February and April ၂၀၁၉.

^{b/} Data were collected between May and October ၂၀၁၉.

Table ၆. Effects of paclobutrazol foliar application and cincturing technique on off-season and subsequent on-season flowerings(%) for ၃- year-old ‘Panrumpai’lime trees grown in the farmer orchard at Phichit in ၂၀၁၇-၂၀၁၈. The treatments were applied to the experimented trees on ၂၈-၂၉ August, ၂၀၁၇.(plot ၁)

Treatments	Off-season flowering (%) ^{a/} (October- December,၂၀၁၇) ၂၀၈၈	On-season flowering (%) ^{b/}			
		၂၅ January ၂၀၈၈	၂၈ March ၂၀၈၈	၂၂ May ၂၀၈၈	၂၅ June ၂၀၈၈
၈.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁}	၂၅.၅ a	၁၀.၈ b	၈.၅	၇.၂	၁၂.၈ b
၉.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၂၀.၅ a	၁၀.၄ b	၈.၈	၈.၅	၁၄.၂ b
၁၀.) Paclobutrazol foliar spray at ၂၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၂၇.၃ a	၈.၄ b	၈.၂	၈.၅	၁၂.၉ b
၁၁.) Paclobutrazol soil application at ၀.၁၅၅ m ^{-၁} tree diameter combined with cincturing (recommended)	၂၀.၅ a	၈.၅ b	၈.၈	၈.၅	၁၂.၉ b
၁၂.) Non treated (control)	၂၂.၈ b	၂၁.၈ a	၂၀.၅ ^{ns}	၁၁.၀ ^{ns}	၁၃.၈ a
CV(%)	၂၀.၅	၁၁.၄	၂၀.၅	၁၀.၈	၁၁.၄

ns : non-significant difference

The mean values not sharing with the common letters are significantly different at $P \leq 0.05$.

Table ၇. Effects of paclobutrazol foliar application and cincturing technique on crop yield(a number of fruit per tree) for ၃- year-old ‘Pan’lime trees grown in the farmer orchard at Phichit in ၂၀၁၇-၂၀၁၈. The treatments were applied to the experimented trees on ၂၈-၂၉ August, ၂၀၁၇. (plot ၁)

Treatments	a number of fruit per tree	
	Off-season crop ^{a/}	On-season crop ^{b/}
၈.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁}	၈,၃၂၄.၈ a	၄၇၅.၄ b
၉.) Paclobutrazol foliar spray at ၄၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၈,၁၃၈.၀ a	၂၁၂.၈ b
၁၀.) Paclobutrazol foliar spray at ၂၀၀ mg. l ^{-၁} combined with cincturing	၈,၄၅၈.၈ a	၁၄၄.၈ b
၁၁.) Paclobutrazol soil application at ၀.၁၅၅ m ^{-၁} tree diameter combined with cincturing (recommended)	၈,၄၇၀.၈ a	၄၈၈.၈ b
၁၂.) Non treated (control)	၄၇၈.၈ b	၈,၄၅၈.၈ a

The mean values not sharing with the common letters are significantly different at $P \leq 0.05$.

^{a/} Data were collected between February and April ၂၀၁၇.

^{b/} Data were collected between May and October ၂၀၈၈.