

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่ลึ้นสุด

- 1. แผนงานวิจัย** : วิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียน
- 2. โครงการวิจัย** : การคัดเลือกலองเกสรที่มีประสิทธิภาพต่อการติดผลทุเรียนในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
- 3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)** : ทดสอบการติดผลในสภาพแปลงเมื่อผสมด้วยเกสรทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในสภาพอุณหภูมิสูงและต่ำ(ปี2561)
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Fruit set test in the orchard condition when pollination with durian pollen that has been selected in high and low temperature conditions
- 4. คณะผู้ดำเนินงาน**
- | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| หัวหน้าการทดลอง | นางอกรีดี กอร์บี้เพบูล์ | สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี |
| ผู้ร่วมงาน | ธีรุณิ ชุตินันทกุล | สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี |
| | นางสาวมาลัยพร เชื้อบันพิตร | สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี |
| | นางนาทระพี สุขจิตไพบูลย์ผล | สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี |

อภิรดี กอร์ปไพบูลย์¹ มาลัยพร เชื้อบันติต¹ อรุณ พุฒิชุดินันทกุล¹ และ นาราพี สุจิตไพบูลย์ผล¹
Apiradee Korpphaiboon¹ malaiporn chuebandit¹ Theerawut Chutinanthalakun² and Natraphee Sukjitchaiboonphol¹

Abstract

Fruit set test in the orchard condition when pollination with durian pollen that has been selected in high and low temperature conditions. Conducting experiments at Mornthong durian orchard in Chanthaburi province. From October 2017 to September 2018. The objective to study fruit set of the Mornthong durian varieties when polination with the pollen of the Chanthaburi 3 durian. RCB experiment plan has 4 methods. 1. temperature at the time of full bloom pollination durian Mornthong with pollen of durian Mornthong(control). 2. At 15 °C, pollination durian Mornthong with pollen of Chantaburi 3 durian. 3. At 30 °C, pollination durian Mornthong with pollen of Chantaburi 3 durian. 4. At 35 °C, pollination durian Mornthong with pollen of Chantaburi 3 durian found that the pollination at 30 °C had the most fruiting percentage at 18.68 %, followed by at 35 °C. The percentage of fruiting was 13.40 % and pollination at 23.3-34.2 °C (control). There are percentage fruiting 11.14 % and at 15 °C the pollination cannot be fruiting. The growth of durian fruits,

there are growth at months 1, 2, 3 and 4 are not different. Peel color are YG146 and YG152, Pulp color is Y10B, Sensory evaluation and the shape to the Mornthong varieties.

บทคัดย่อ

ทดสอบการติดผลในสภาพแเปลงนเมื่อผสมด้วยเกสรทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในสภาพอุณหภูมิสูงและต่ำ ทำการทดลองที่สวนทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทองเมื่อผสมด้วยละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี คือ 1. อุณหภูมิ ณ เวลาที่ดอกบาน ผสมเกสรตัวผู้ทุเรียนหมอนทองกับเกษตรตัวเมียทุเรียนหมอนทอง(ควบคุม) 2. ที่ 15 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 กับเกษตรตัวเมียทุเรียนหมอนทอง 3. ที่ 30 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 กับเกษตรตัวเมียของทุเรียนหมอนทอง 4. ที่ 35 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 กับเกษตรตัวเมียของทุเรียน

หมอนทอง พบว่า การผลิตสมเกสรที่ 30 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลมากที่สุด คือ ร้อยละ 18.68 รองลงมา คือที่ 35 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผล คือ ร้อยละ 13.40 และ การผลิตสมเกสรที่ 23.3-34.2 องศาเซลเซียส(ควบคุม) มีร้อยละการติดผล ร้อยละ 11.14 ส่วนที่ 15 องศาเซลเซียส การผลิตสมเกสร ไม่สามารถติดผลได้ ในส่วนการเจริญเติบโตของผลทุเรียน มีการเจริญเติบโตเดือนที่ 1 2 3 และ 4 ไม่แตกต่างกัน มีสีเปลือก คือ YG146 และ YG152 มีสีเนื้อ คือ Y10B การทดสอบปัจจัยมีลักษณะตรงตามพันธุ์หมอนทอง.¹

5. คำนำ

ทุเรียน (*Durio zibethinus* Murray) ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชแหล่งผลไม้ ทำให้เกษตรกรหันภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเพื่อเน้นการส่งออก เช่นในจังหวัดจันทบุรี ในปี 2557 จังหวัดจันทบุรีมีการผลิตโดยมีพื้นที่ปลูกรวม 192,591 ไร่ พื้นที่ให้ผล 167,504 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 242,686 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,449 กิโลกรัม/ต่อไร่ ทุเรียนคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 85 หรือประมาณ 206,283 ตัน ผลผลิตปี 2557 มีการกระจายตัวหลายรุ่นทำให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียนคุณภาพมีการส่งออก ร้อยละ 73.90 หรือประมาณ 179,345 ตัน ตลาดหลักได้แก่ จีน ไต้หวัน อ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปผลสด แข็ง โดยผลผลิตบางส่วนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 19.10 หรือ ประมาณ 46,353 ตัน ผลผลิตที่เหลือประมาณ 16,988 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.00 นำไปแปรรูป และอื่นๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 37.39 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม 9,073.19 ล้านบาท แต่การเก็บเกี่ยว ในปี 2557 ของ จ.จันทบุรี ทุเรียนมีการเก็บเกี่ยวประมาณ 5 รุ่น ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557 โดย รุ่นแรก เป็นทุเรียนตันตุดและทุเรียนพันธุ์กระดุม ซึ่งออกผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. ถึงเดือน มี.ค. 57 ผลผลิตร้อยละ 4.63 หรือประมาณ 11,234 ตัน รุ่นที่ 2 ช่วงเดือนเม.ย.57 ผลผลิตร้อยละ 27.87 หรือประมาณ 67,648 ตัน รุ่นที่ 3 ช่วงเดือน พ.ค. 57 ผลผลิตร้อยละ 43.10 หรือประมาณ 104,596 ตัน รุ่นที่ 4 ช่วงเดือน มิ.ย.57 ผลผลิตร้อยละ 20.76 หรือประมาณ 50,375 ตัน และผลผลิตที่เหลือรุ่นสุดท้าย ช่วงเดือน ก.ค. 57 ผลผลิตร้อยละ 3.64 หรือประมาณ 8,833 ตัน ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากคือ 11 พ.ค.-10 มิ.ย.57 ผลผลิต 116,287 ตัน เฉลี่ยวันละ 3,751 ตัน (สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2557) แม้ว่าการกระจายตัวหลายรุ่นทำให้ทุเรียนราคาดี

¹

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี.๘๗๐ อ.ชลุง จ.จันทบุรี ๒๒๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๙-๗๐๓๐

²

Chanthaburi Horticultural Research Center Tapoon sub district, Klung district, Chanthaburi province 22190 Tel. 0-3939-7030

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ๐ ซอย สุวรรณวัฒนกิจ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๐๕๘๓

Horticulture Research Institute 50 Soi Suwannawakkasikit, Lad Yao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel. 02-579-0583

โดยเฉพาะหมอนทอง แต่การกระจายตัวทรายรุนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูง ต่ำแตกต่างกันมากในเวลาไม่ได้เลี้ยงกัน ทำให้การออกดอกออกทุเรียนหมอนทองในแต่ละรุนออกปริมาณไม่สม่ำเสมอและมักออกในปริมาณน้อย ในขณะที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเกินไปในช่วงเวลาการบานของดอกทุเรียนส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตของลักษณะของเกรสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง(Naoko, 2015) จึงส่งผลกระทบให้การติดผลไม่ดีหรือไม่ติด ทำให้ผลผลิตทุเรียนในแต่ละรุนมีปริมาณน้อย ต้นทุเรียนจึงมีการออกดอกช้าอีก ผลผลิตจึงกระจายตัวทรายรุนส่งผลกระทบต่อการจัดการผลิตของเกษตรกร โครงการนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาหาเกรสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์การค้าหรือพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ ที่ลักษณะของเกรสรตัวผู้มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิต่างกัน เพื่อนำมาทดสอบการใช้เกรสรตัวผู้จากพันธุ์หมอนทอง เพื่อตั้งรับปัญหาการติดผลน้อยในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงการติดผลของทุเรียนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อรังไข่ได้รับการผสม(Fertilization) ส่วนของเกรสรเพศเมีย รังไข่และฐานรองดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปเป็นผล(Fruit) Ovule ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาไปเป็นเมล็ด(Seed) ซึ่งการผสมเกรสรและOvule ที่ได้รับการผสมแล้วจะส่งผลให้ส่วนของเกรรเพศเมียมีการพัฒนาต่อไปได้ เกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียของทุเรียน พร้อมที่จะถ่ายลักษณะของเกรร หรือพร้อมที่จะผสมเกรรในเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งเกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียที่อยู่ในดอกเดียวกัน มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ากันได้(Incompatibility) หรือผสมไม่ติด แต่ถ้าเป็นลักษณะของเกรรจากต่างพันธุ์ หรือต่างต้น หรือต่างดอก จะเข้ากันได้ดีกว่าหรือผลติดได้ดีกว่า อีกสาเหตุที่ดอกทุเรียนไม่สามารถผสมตัวเองได้เนื่องจากความไม่พอดีของส่วนต่าง ๆ ของดอก ซึ่งมีเกรรเพศผู้และเกรรเพศเมียยาวไม่พอดีกัน ทำให้โอกาสที่จะผสมตัวเองมีน้อยลง ดอกทุเรียนมีเกรรเพศผู้อยู่ต่ำ เกรรเพศเมียอยู่สูง เรียกว่า ดอกประเภท Pin and Thrum และพืชที่มีดอกกลักษณะนี้ เรียกว่า Heterogamous plant และดอกทุเรียนยังมีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นวง(Gamosepalous or Symsepalous flower) ป้องกันการผสมเกรร และดอกที่ห้อยลง ทำให้การผสมตัวเองเกิดได้ยากขึ้นอีกด้วย(สังคม,2547)(ปัญจพรและคณะ, 2547) การผสมเกรรของทุเรียนข้ามพันธุ์ช่วยให้เพิ่มร้อยละในการติดผล แต่ส่งผลกระทบต่อกุณภาพของผลทุเรียน และระยะการเก็บเกี่ยวที่เปลี่ยนไปตามลักษณะของพันธุ์ที่นำลักษณะของเกรรตัวผู้มาใช้ในการผสม(Ni Luh Puta Indriyani,2012) (Honsho, C et.al.,2004) (Honsho, C et.al.,2007)

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นการค้าโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีขั้นตอนในการผลิตทุเรียนหมอนทองเป็นการค้าที่มีความสำคัญหลายขั้นตอน การใช้แรงงานคนช่วยในการผสมเกรรดอกทุเรียนในเย็นจนถึงเวลาค่ำ เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากหากเกษตรกรไม่ช่วยผสมเกรรอาชญาการผสมเกรรจากแมลงซึ่งมีอยู่น้อยในสวนทุเรียนที่ใช้สารเคมีทุเรียนหมอนทองจะติดผลน้อยมากบางครั้งไม่ติดผลเลย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Honsho, C et.al.,2004 เรื่องการผสมพันธุ์ทุเรียนโดยทำการศึกษาผลของการผสมเปิด ผสมในพันธุ์เดียวกันและผสมข้ามพันธุ์ในทุเรียนสีสายพันธุ์ คือ หมอนทอง ชนี กระดุมทอง และพวงมนี พบว่า เมื่อผสมเปิดมีร้อยละการติดผลต่ำที่สุด 0-14 การผสมในพันธุ์เดียวกันมีการติดผลที่ต่ำในพันธุ์

หมอนทองมีร้อยละการติดผล 7.7 ชนนิร้อยละ 3.6 และพวงมนณิร้อยละ 0 เมื่อผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์กระดุมทองร้อยละของการติดผลเพิ่มขึ้นในพันธุ์หมอนทองร้อยละ 27.2 และชนนี 16.3 เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้เกษตรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์อื่นที่มีปลูกในสวนมาช่วยในการผสมกับเกษตรตัวเมียของพันธุ์หมอนทอง หากไม่มีเกษตรจากพันธุ์อื่นเกษตรกรมักใช้เกษตรตัวผู้จากทุเรียนหมอนทองสามารถช่วยในการเพิ่มการติดผลได้เช่นกันปัจจุบันการปลูกทุเรียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น ในปี 2557 จ.จันทบุรีมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนมากถึงประมาณ 5 รุ่น การกระจายตัวว Haley รุ่นสาเหตุหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงต่ำแตกต่างกันมากในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่งผลให้ในแต่ละรุ่นทุเรียนออกดอกปริมาณน้อยและการติดผลน้อยจึงมีการออกดอกอีก ผลผลิตทุเรียนจึงมีกระจายตัว Haley รุ่น ผลผลกระทบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงร้อนหรือเย็นมากเกินไปกระทบต่อความมีชีวิตของลักษณะของเกษตรตัวผู้ของทุเรียนหมอนทองส่งผลให้การติดผลไม่ดีหรือไม่ติดผลผลผลิตในแต่ละรุ่นน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Naoko, 2015 ทำการศึกษาความมีชีวิตของลักษณะของเกษตรตัวผู้และความสามารถในการออกของเกษตรตัวผู้ในหลอดเรณูในเกษตรเมีย ที่อุณหภูมิ 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C และ 35°C ในเวลากลางคืน พบว่า ที่อุณหภูมิต่ำ 10°C มีร้อยละการออกของเกษตรตัวผู้ต่ำที่สุด คือ ร้อยละ 0.8 และที่อุณหภูมิสูง 35°C มีร้อยละการออกของเกษตรตัวผู้เท่ากับ 7.8 ในขณะที่ 20°C และ 25°C มีร้อยละการออกของเกษตรตัวผู้เท่ากับ 47.3 และ 45.5 ตามลำดับ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปมีผลกระทบต่อความมีชีวิต และความสามารถในการออกของเกษตรตัวผู้ให้มีการออกน้อยกว่าความยาวของหลอดเรณูในเกษตรเมีย และออกช้ากว่าระยะเวลาในการผสมของเกษตรตัวเมีย ทำให้ไม่ได้รับการผสมจึงไม่ติดผล หากในปีต่อๆ ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมากหรือเมื่อปี 2557 งานวิจัยนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาทุเรียนติดผลน้อยให้กับเกษตรโดยใช้เกษตรตัวผู้ที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ทุเรียนออกดอกโดยมุ่งเน้นศึกษา 5 ช่วงอุณหภูมิคือ 15°C 20°C 25°C 30°C และ 35°C เมื่องานวิจัยแล้วเสร็จเกษตรสามารถนำงานวิจัยไปใช้เมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นคำแนะนำ เช่น ที่อุณหภูมิต่ำควรใช้ลักษณะของเกษตรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์ใดเป็นต้น และอีกส่วนที่มีความสำคัญ คือ เมื่อใช้เกษตรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์อื่นเป็นการผสมข้ามพันธุ์ควรมีการเก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิตที่ได้จริงจากการทดลองว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตหรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ni Luh Puta Indriyani, 2012 ทำการศึกษาอิทธิพลของการผสมข้ามพันธุ์โดยใช้เกษตรตัวผู้และเกษตรตัวเมียจากทุเรียนพันธุ์ต่างๆ เช่น Matahari, Kani, Otong, Sitokong, Lai, Kim, Sunan, Bokor, Hortimart และ Tangkue พบร้าร้อยละการติดผลอยู่ในช่วง 0-20 ผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณภาพผลผลิต เช่น น้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความยาวนาน ความหนาเปลือก ความยาวผล จำนวนพุ่ต่อผล จำนวนพุ่ที่ไม่มีเนื้อต่อผล ความหนาเนื้อ ส่วนที่กินได้ จำนวนเมล็ดต่อผล น้ำหนักเมล็ดต่อผล ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเมล็ด ร้อยละของเมล็ดลีบ และ จำนวนวันที่เก็บเกี่ยว ผลการทดลองที่ได้มีค่าแตกต่างจากเมื่อไม่ได้ผสมข้ามพันธุ์

6. วิธีดำเนินการ

- อุปกรณ์

- ต้นทุเรียนแปลงรverbรวมพันธุ์ทุเรียนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
- ต้นทุเรียนหม่อนทองอายุ 7-8 ปี ของสวนเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช กล้องจุลทรรศน์ งานเลี้ยงเชือ กระเจกสไลด์ moist paper
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิชนิดเพวเที่ย กล่องโฟม
- อุปกรณ์ในการเช็คคุณภาพทุเรียน เช่น แผ่นเทียบสี เครื่องวัดความหวาน เครื่องปั่นเหวี่ยง
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

- วิธีการ

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ชั้้า ชั้าละ 30 ดอก ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 ที่อุณหภูมิ ณ เวลาที่ดีออกบาน ผสมเกสรตัวผู้ทุเรียนหม่อนทองกับเกสรตัวเมียหม่อนทอง(ควบคุม)

กรรมวิธีที่ 2 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ทุเรียนจันทบุรี 3 กับเกสรตัวเมียหม่อนทอง

กรรมวิธีที่ 3 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ทุเรียนจันทบุรี 3 กับเกสรตัวเมียหม่อนทอง

กรรมวิธีที่ 4 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ผสมเกสรตัวผู้ทุเรียนจันทบุรี 3 กับเกสรตัวเมียหม่อนทอง

วิธีปฏิบัติการทดลอง

1. ศึกษาสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า เพื่อวางแผนการทดลอง หากข้อมูลจาก อุตุนิยมวิทยาไม่เป็นไปตามกรรมวิธี ทำการจำลองอุณหภูมิ บริเวณช่อดอกในต้น โดยใช้กล่องโฟมร่วมกับ เครื่องทำความเย็นชนิดเพวเที่ยในกล่องโฟม ในกรรมวิธีอุณหภูมิต่ำและสูง (ดัดแปลงจาก Naoko, 2015) โดย คุณอุณหภูมิประมาณ 7 วัน (Naoko, 2015)

2. ตัดเกสรเพศผู้ดอกทุเรียนพันธุ์หม่อนทองในระยะดอกเริ่มบานวันแรกออกผสมเกสรเพศเมียของ หม่อนทองกับละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการออกของละอองเกสรที่ดีที่สุดในแต่ ละอุณหภูมิจากการทดลองที่ 1 (เวลา 19.00 น.) จำนวน 120 ดอก บันทึกการติดผลและคุณภาพผลต่อไป

3. ประเมินปริมาณดอก บันทึกจำนวนรุ่นของการออกดอก

4. บันทึกอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาที่ดอกบาน ผสมเกสรในเวลา 19.00 น.

5. ประเมินการติดผล แต่งผล โยงผล

การบันทึกข้อมูล

1. ร้อยละของการติดผล

2. คุณภาพผล

- เวลาและสถานที่

เริ่มต้น ตุลาคม 2560 - สิ้นสุด กันยายน 2561

สถานที่ทำการทดลอง ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี แปลงทุเรียนเกษตรกร จ.จันทบุรี

7. ผลการทดลองและวิจารณ์

ในปลายเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนมีนาคม ดอกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์จันทบุรี 3 บานพร้อมกัน จึงทำการจำลองอุณหภูมิที่ 15 30 และ 35 องศาเซลเซียส บริเวณช่องดอกในต้นของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยใช้กล่องโฟมร่วมกับเครื่องทำความเย็นแบบเพาเทีย (Peltier) (ดัดแปลงจาก Naoko, 2015) โดยคุณอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิในแต่ละกรรมวิธี ประมาณ 7 วัน (Naoko, 2015) ตัดเกรสรเพศผู้ดอกทุเรียนพันธุ์หมอนทองในระยะดอกเริ่มบานวันแรกออก(เวลา 13.00 น.) เก็บดอกทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 (เวลา 17.00 น.) ทำการผสมเกรสรเพศเมียของหมอนทองกับละอองเกรสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 (เวลา 19.00 น.) จำนวน 120 ดอก หลังจากผสม 72 ชั่วโมง ตัดทั้งดอก 10 ดอก เอาเฉพาะเกรสรตัวเมีย แขวนสารละลาย Copenhagen เพื่อนำมาศึกษาการผสมละอองเกรรกับเกรสรเพศเมียด้วยกล้องจุลทรรศน์ต่อไป อีก 90 ดอก ปล่อยไว้ให้ติดผลเพื่อบันทึกการร้อยละติดผล พบว่า การผสมเกรรทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลมากที่สุด คือ 18.68 ในกรรมวิธีควบคุมอุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลมากเป็นลำดับ 2 คือ 13.40 และการผสมเกรรทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่อุณหภูมิ ณ เวลาที่ดอกบาน 23.3-34.2 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลน้อยที่สุด คือ 11.14 (Table 1)

ในส่วนการเจริญเติบโตของผลทุเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองอุณหภูมิ 23.3-34.2 องศาเซลเซียส และ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ควบคุมอุณหภูมิกายในกล่องให้เท่ากับ 30 และ 35 องศาเซลเซียส มีการเจริญเติบโตเดือนที่ 1 2 3 และ 4 ผลใกล้เคียงกัน แต่เมื่อควบคุมอุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 15 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ไม่สามารถติดผลได้ (Table 2)

ดอกทุเรียนที่บานช่วงอุณหภูมิ 23.3-34.2 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีความกว้างผล คือ 7.95 14.38 20.33 และ 21.20 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุมอุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 30 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรรเพศผู้

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความกว้างผล คือ 8.50 15.10 18.32 และ 20.75 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุม อุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 35°C ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความกว้างผล คือ 6.25 18.17 19.50 และ 20.25 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2)

เมื่อดอกบานช่วงอุณหภูมิสูง 23.3-34.2 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีความยาวผล คือ 11.35 19.33 26.72 และ 28.09 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุม อุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 30 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความยาวผล คือ 11.50 20.20 28.50 และ 29.25 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุม อุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 35 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความยาวผล คือ 10.10 22.25 25.75 และ 28.50 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2)

เมื่อดอกบานช่วงอุณหภูมิสูง 23.3-34.2 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีเส้นรอบวงผล คือ 26.65 40.78 60.22 และ 67.27 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อ ควบคุมอุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 30 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีเส้นรอบวงผล คือ 21.50 41.50 65.00 และ 65.35 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุม อุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 35 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีเส้นรอบวงผล คือ 22.25 42.25 65.25 และ 68.33 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2)

เมื่อดอกบานช่วงอุณหภูมิสูง 23.3-34.2 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีความยาวขั้วผล คือ 6.61 7.61 7.42 และ 8.03 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุม อุณหภูมิในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 30 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความยาวขั้วผล คือ 7.10 7.22 7.50 และ 7.65 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงเวลาที่ดอกบานให้เท่ากับ 35 องศาเซลเซียส ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความยาวขั้วผล คือ 7.50 8.27 8.61 และ 8.50 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2)

ในส่วนคุณภาพผลทุเรียนของผลทุเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองอุณหภูมิ 23.3-34.2 องศาเซลเซียส และ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องให้เท่ากับ 30 และ 35 องศาเซลเซียส มีคุณภาพผลใกล้เคียงกัน มี น้ำหนักผล คือ 4.10 3.20 และ 4.80 กิโลกรัม ตามลำดับ มีความหนาเปลือก 1.53 1.38 และ 1.56 เซนติเมตร ตามลำดับ มีน้ำหนักเปลือก 2.96 1.80 และ 2.80 กรัม ตามลำดับ มีน้ำหนักเปลือก 2.19 1.87 และ 2.15 กรัม ตามลำดับ มีความแน่นเนื้อ 2.42 2.37 และ 1.93 N ตามลำดับ มีน้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล

0.35 0.29 และ 0.27 ตามลำดับ มีน้ำหนักเมล็ด 137.50 120.00 และ 130.00 กรัมตามลำดับ มีเมล็ดลีบ 93.75 62.50 และ 65.00 % ตามลำดับ และ มี %TSS 6.72 7.30 และ 6.40 ตามลำดับ (Table 3)

ในส่วนสีเปลือก สีเนื้อ และการซิม ของผลทุเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียน พันธุ์หมอนทองอุณหภูมิ 23.3-34.2 องศาเซลเซียส และ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียน พันธุ์จันทบุรี 3 ควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องให้เท่ากับ 30 และ 35 องศาเซลเซียส มี ลักษณะตรงตามพันธุ์ หมอนทอง มีสีเปลือก YG146 และ YG152 ตามลำดับ มีสีเนื้อ Y10B ความสม่ำเสมอของการสูกภายในผล สม่ำเสมอ ก้านห้อมหวาน ความหวานเนื้อ ความมันเนื้อ เส้นใย ความละเอียด และความเหนียวเนื้อ ปานกลาง (Table 4)

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

เมื่อใช้เกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ผสมเกรสรตัวเมียทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่อุณหภูมิสูง 30 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลมากที่สุด และที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีร้อยละการติดผลรองลงมา และมี การติดผลมากกว่าการผสมเกรสรเพศผู้และเพศเมียพันธุ์หมอนทองที่อุณหภูมิ ณ เวลาที่ดอกบาน 23.3-34.2°C ในส่วนการเจริญเติบโตของผลทุเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ผสมด้วยเกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และ เกรสรเพศผู้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีการเจริญเติบโตเดือนที่ 1 2 3 และ 4 สีเปลือก สีเนื้อ และการซิม ลักษณะ ตรงตามพันธุ์หมอนทอง มีสีเปลือก YG146 และ YG152 มีสีเนื้อ Y10B ความสม่ำเสมอของการสูกภายในผล สม่ำเสมอ ก้านห้อมหวาน ความหวานเนื้อ ความมันเนื้อ เส้นใย ความละเอียด และความเหนียวเนื้อ ปานกลาง ผลไม่แตกต่างกัน

9. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษา นักวิชาการ นำไปพัฒนาต่ออยอด เพื่อในการนำเสนองานเกรสรทุเรียนพันธุ์ที่ มีความแข็งแรงเหมาะสมกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหาการผสมเกรสรไม่ติดในอุณหภูมิสูง และต่ำ
- เพื่อเป็นข้อมูลถ่ายทอด และเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วประเทศที่มีการปลูกทุเรียนและประสบปัญหา นำไปใช้แก้ปัญหาการผสมเกรสรไม่ติดในอุณหภูมิสูงและต่ำ

10. คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณทรงศักดิ์ เพิ่มผล เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นทุเรียนที่ใช้ทำการทดลอง

11. เอกสารอ้างอิง

- ปัญจพร เลิศรัตน์, เปญจมาส รัตนชินกร, สุชาติ วิจิตรานนท์, ศรุต สุทธิอรามณ์, สมทรง ปวีณการก์, Hirany หรัญ ประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทร์ประณิก, เสริมสุข ลักษณ์เพ็ชร์. 2547 ทุเรียน. เอกสารวิชาการ ทุเรียน. กรมวิชาการเกษตร.
- สังคม เทชวงศ์เสถียร. 2547. สรีวิทยาของพืชสวน. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 173 หน้า.
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. 2557. สรุปสถานการณ์ผลิตเงาะมังคุดลง Kong ปี 2557 จังหวัดจันทบุรี. วันที่ค้นข้อมูล 17 กรกฎาคม 2558. เวปไซด์ www.chanthaburi.doae.go.th/report1/report50.pdf.
- Shitose Honsho, Keizo Yonenori, Songpol Somsri, Suranant Subhadrabandhu, Akira Sugiura. 2004. Marked improvement of fruit set in thai durian by artificial cross-pollination. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 101: 399-406.
- Shitose Honsho, Keizo Yonenori, Songpol Somsri, Takuya Tetsumura, Kensuke Yamashita, Chinawat Yapwattanaphun. 2007. Characterization of male reproductive organs in durian; Anther Dehiscence 250 and pollen longevity. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 76: 120-124.
- Shitose Honsho, Keizo Yonenori, Songpol Somsri, Takuya Tetsumura, Kensuke Yamashita. 2007. Effective pollination period in durian (*Durio Zibethinus Murr.*) and the factors regulating it. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 111: 193-196.
- Naoko Kozai, Hirokazu Higuchi, Sombat Tongtao, and Tatsushi Ogata. 2015. Low night temperature inhibits fertilization in ‘Monthong’ durian (*Durio zibethinus Murr.*). Original article. 20 p.
- Ni Luh Putu Indriyani, Sri Hadiat i , Fitriana Nasution, Edi son, Sudjijo and Yulia Irawati. 2012. Maternal and paternal effect on the characters of durian (*Durio Zibethinus Murr.*) fruit from cross-pollination. Indonesia. Journal of fruit and ornamental plant research. 20:23-33.

ກາຄພນວກ

Tables

Table 1 Percentage of fruit set in ‘Monthong’ durian when pollination with ‘Chanthaburi 3’ durian and ‘Monthong’ durian Full bloom at 23.3-34.2, 15, 30 and 35°C

Treatment	Number of	Number of	Percentage
	anthesis	fruit set	of fruit set
Full bloom at 23.3-34.2°C	493.75 a	55.00 a	11.14 b
Monthong Durian' pollens X Monthong			
Full bloom at 15°C	28.75	0	0
Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong			
Full bloom at 30°C	22.75 b	4.25 b	18.68 a
Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong			
Full bloom at 35°C	24.25 b	3.25 b	13.40 b
Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong			
C.V.(%)	15.49	11.77	3.36

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different using DMRT at 95%

Table 2 Fruit size of Durian when pollination with ‘Chanthaburi 3’ durian and ‘Monthong’ durian Full bloom at 23.3-34.2, 15, 30 and 35°C

Treatment	fruits width (cm.)				fruits length (cm.)				fruits circumference (cm.)				fruit pedicels length (cm.)			
	Month after fruit set				Month after fruit set				Month after fruit set				Month after fruit set			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Full bloom at 23.3-34.2°C Monthong Durian' pollens X Monthong	7.95b	14.38b	20.33	21.20	11.35	19.33	26.72a	28.09	26.65	40.78	70.22	67.27	6.61ab	7.61ab	7.42b	8.03
Full bloom at 15°C Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Full bloom at 30°C Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong	8.50a	15.10b	18.32	20.75	11.50	20.20	28.50b	29.25	21.50	41.50	65.00	65.35	7.10a	7.22b	7.50b	7.65
Full bloom at 35°C Chanthaburi 3 Durian' pollens X Monthong	6.25c	18.17a	19.50	20.25	10.10	22.25	25.75b	28.50	22.25	42.25	65.25	68.33	7.50a	8.27a	8.61a	8.50
C.V.(%)	4.13	7.48	12.67	10.28	14.63	12.36	14.26	13.50	12.26	13.62	4.00	4.50	5.44	6.95	6.95	7.22

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different using DMRT at 95%

Table 3 Quality of Durian when pollination with ‘Chanthaburi 3’ durian and ‘Monthong’ durian Full bloom at 23.3-34.2, 15, 30 and 35°C

Treatment	fruits	peel	peel weight	pulp	firmness	pulp weight :	seed	abortion	TSS
	weight(g)	thickness	(g)	thickness	(N)	fruits weight	weight	seed (%)	(%)
		(cm.)		(cm.)			(g)		
Full bloom at 23.3-34.2°C Monthong Durian' pollens X Monthong	4,100.00b	1.53	2,962.50a	2.19	2.42	0.35a	137.50	93.75a	6.72

Full bloom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
at 15°C									
Chanthaburi									
3 Durian'									
pollens X									
Monthong									
Full bloom	3,200.00c	1.38	1,800.00b	1.87	2.37	0.29ab	120.00	62.50b	7.30
at 30°C									
Chanthaburi									
3 Durian'									
pollens X									
Monthong									
Full bloom	4,800.00a	1.56	2,800.00a	2.15	1.93	0.27b	130.00	65.00b	6.40
at 35°C									
Chanthaburi									
3 Durian'									
pollens X									
Monthong									
C.V. (%)	5.45	15.13	10.83	10.85	6.55	16.15	13.45	6.29	10.91

Mean values followed by different letters in the same column are significantly different using DMRT at 95%

Table 4 Peel color Pulp color and Sensory evaluation Durian when pollination with 'Chanthaburi 3' durian and 'Monthong' durian Full bloom at 23.3-34.2, 15, 30 and 35°C

Treatment	Shape of the culticar	peel color	Pulp color	Symtoms of pathogen	symptoms of Abnormal / insect	Ripening	odor	Pulp sweet	Pulp taste	Fiber	Pulp ness
Full bloom at 23.3- 34.2°C	Monthong	YG	Y10	none	none	normally	Sweet	medium	medium	medium	medium
Monthong Durian'		146	B								
pollens X Monthong											
Full bloom at 15°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chanthaburi 3 Durian'											
pollens X Monthong											
Full bloom at 30°C	Monthong	YG	Y10	none	none	normally	Sweet	medium	medium	medium	medium

Chanthaburi 3 Durian'	146	B
pollens X Monthong		
Full bloom at 35°C	Monthong	YG
Y10	none	none
normally	Sweet	medium
medium	medium	medium
Chanthaburi 3 Durian'	152	B
pollens X Monthong		

Figures

Figure 1 Petite refrigeration equipment

Figure 2 Installation of temperature control equipment on the ‘Monthong’ durian tree

Figure 3 ‘Monthong’ durian when pollination with ‘Chanthaburi 3’ at 15, 30, 35 °C

Figure 4 Fruit of Durian when pollination with ‘Chanthaburi 3’ durian and ‘Monthong’ durian