

ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Study on Wan Phetchaklap's Propagation by Tissue Culture

นางสุภาภรณ์ สาชาติ^{๑/} นางพรพรรณภา รัตนโกศล^{๒/} นางสาวแสงมณี ชิงดวง^{๑/}

บทคัดย่อ

ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี ๒ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การชักนำขึ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น โดยนำหน่ออ่อนที่มีตา ขนาดยาวประมาณ ๕-๑๐ นิ้ว มาเลี้ยงบนสูตรอาหาร Murashige และ Skoog (๑๙๖๒)(MS) ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้น ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ppm นาน ๔๕ วัน พบว่า ทุกสูตรอาหารชักนำให้เกิดต้นจากหน่ออ่อนได้ไม่แตกต่างกัน และได้จำนวน ๑ ต้นต่อ ๑ ชิ้นส่วน จากนั้นนำส่วนยอดของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ได้ขนาดประมาณ ๔-๕ ซม. มาขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณยอด บนสูตรอาหาร Murashige และ Skoog (๑๙๖๒) (MS) ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้น ๐ ๒ ๔ ๖ และ ๘ ppm นาน ๔๕ วัน พบว่า ทุกสูตรอาหาร MS ทั้งที่เติมและไม่เติม BA มีการเพิ่มปริมาณยอด/หน่อใหม่สูงประมาณ ๔-๖ ต้น และทุกสูตรอาหารสามารถเกิดรากได้และดีที่สุดในการเลี้ยงกิ่งในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม ๖ppm BA

Study on Wan Phetchaklap's Propagation by Tissue Culture, has ๒ important steps. Meristem induction develop to plantlet, was conducted using young suckers with the bud and size length ๕-๑๐ inches. They were cultured on MS medium supplemented with ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ppm BA for ๔๕ days. Every treatments cannot different to induce shoot from young sucker and only single shoot per tissue. Then was conducted using the top of young shoots with size length ๔-๕ cm to multiplication on MS medium supplemented with ๐ ๒ ๔ ๖ และ ๘ ppm BA for ๔๕ days. Every treatment of MS medium can induce shoot multiplication, gave new shoots about ๔-๖ shoots and can rooting. BA at ๖ ppm gave the highest number of shoots.

^{๑/} สถาบันวิจัยพืชสวน

^{๒/} ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

๑. คำนำ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกกระแสนิยม เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมาก จึงเป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดการบุกกรุกป่าเพื่อแสวงหาสมุนไพรต่าง ๆ เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ กรมวิชาการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรของพืชสมุนไพรป่า และสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เป็นยารักษาโรค จึงได้สำรวจ ศึกษา รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสมุนไพร และจัดทำแปลงเพื่อปลูกเปรียบเทียบกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ถึงเกษตรกรผู้สนใจธุรกิจสมุนไพรต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากการอนุรักษ์แล้วการพัฒนาการผลิตที่ให้มีการหมุนเวียนใช้อย่างเพียงพออย่างยั่งยืน

ว่านเพชรกลับ (*Boesenbergia cf. thorelii* (Gagnep.) Hoes) เป็นพืชสมุนไพรหายาก/หาไม่ได้ชนิดหนึ่ง ที่ปรากฏในรายการพืชสมุนไพรของร้านขายยาเจ้ากรมเปือ ซึ่งได้รายงานให้กับกองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระตำหนักงน้อย ตำบลคูไต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สรรพคุณของว่านเพชรกลับ ใช้เหง้าตำ ปอกสมานแผลสด ใช้ดองกับเหล้าขาวดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ (นายเกษตร, ๒๕๔๕) และสามารถรักษาโรคไตได้ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านได้รวบรวมพันธุ์ว่านเพชรกลับไว้บางส่วน (ปลูกเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และพบว่า มีความแตกต่างด้านความสูงขนาดของต้น ใบ และความสามารถในการแตกกอ และได้ศึกษาศักยภาพ/ความเป็นไปได้ในการผลิตและพัฒนาเป็นเชิงการค้า เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางยา และคัดเลือกหาสายพันธุ์ว่านเพชรกลับ ที่เป็นพืชสมุนไพรใกล้สูญพันธุ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น สำหรับเผยแพร่และส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นการค้า และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสมุนไพรไทยไม่ให้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ **จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควบคู่ไปกับการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์**

สำหรับการศึกษาการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกี่ยวกับว่านเพชรกลับยังไม่มีรายงานวิจัย แต่พืชชนิดนี้เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE ซึ่งมีทั้งพืชชนิดที่เป็นการค้า ได้แก่ กล้วย หิง ขมิ้น ปทุมมาและดาหลา เป็นต้น (สถาบันวิจัยพืชสวน, ๒๕๔๖) และเป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองหายาก ได้แก่ ว่านเปราะทอง เป็นต้น (ปิยะพร, ๒๕๕๕) ปัจจุบันจึงได้นำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการค้าและการอนุรักษ์

๒. วิธีดำเนินการ :

การชักนำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง เหง้าของว่านเพชรกลับที่ ศวพ.น่าน รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แบบและวิธีการทดลอง สารกระตุ้นการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น ๖ ระดับ คือ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ppm วางแผนการทดลองแบบ CRD ๕ ซ้ำ แต่ละซ้ำคือชิ้นส่วนพืช ๒๐ ชิ้นต่อ ๑ สิ่งทดลอง (treatment)

ขั้นตอนการวิจัย

๑. นำเหง้าของว่านเพชรกลับที่ ศวพ.น่าน รวบรวมได้ มาล้างให้สะอาด ใส่ไว้ในตะกร้าโดยไม่ต้องนำลงปลูกในดิน ทิ้งไว้จนแตกหน่ออ่อน

๒. ตัดแยกหน่ออ่อนที่มีตา ขนาดยาวประมาณ ๕-๑๐ นิ้ว ออกจากเหง้า ล้างทำความสะอาด แล้วพอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอโรกซ์ ความเข้มข้น ๑๕ และ ๑๐ % นาน ๒๐ และ ๑๕ นาที ตามลำดับ

๓. ล้างสารละลายพอกฆ่าเชื้อออกด้วยน้ำกลั่น ที่นิ่งฆ่าเชื้อ ๓ ครั้ง

๔. นำหน่อที่พอกฆ่าเชื้อแล้ว มาตัดแต่งส่วนที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับสารเคมีพอกฆ่าเชื้อ และตัดส่วนกาบใบทิ้ง

๕. ตัดแบ่งโคนหน่ออ่อนเป็น ๔ ส่วน และนำไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่กำหนด เปลี่ยนอาหารใหม่โดยใช้สูตรเดิมทุก ๑ เดือน เป็นเวลา ๒-๓ เดือน

๖. เก็บข้อมูล การรอดชีวิตจากการพอกฆ่าเชื้อ การปนเปื้อนของเชื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการชักนำให้เกิดยอด จำนวนยอดที่ชักนำได้ต่อชิ้นส่วน

การเพิ่มปริมาณยอด

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง ส่วนยอดของต้นอ่อนของว่านเพชรกลับที่ ได้จากการทดลองย่อยที่ ๑ สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แบบและวิธีการทดลอง สารกระตุ้นการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น ๕ ระดับ คือ ๐ ๒ ๔ ๖ และ ๘ ppm วางแผนการทดลองแบบ CRD ๕ ซ้ำ แต่ละซ้ำคือชิ้นส่วนพืช ๒๐ ชิ้นต่อ ๑ สิ่งทดลอง (treatment)

ขั้นตอนการวิจัย

๑. นำส่วนยอดของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ ได้จากการทดลองย่อยที่ ๑ ขนาดประมาณ ๔-๕ ซม. ตัดแต่งชิ้นส่วนโดยตัดส่วนที่เป็นกาบใบและส่วนที่เป็นสีดาออก

๒. ตัดแบ่งโคนหน่ออ่อนเป็น ๒ ส่วน และนำไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่กำหนด เปลี่ยนอาหารใหม่โดยใช้สูตรเดิมทุก ๑ เดือน เป็นเวลา ๒-๓ เดือน

๖. เก็บข้อมูล การปนเปื้อนของเชื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการชักนำให้เกิดยอดใหม่ จำนวนยอดที่ชักนำได้ต่อชิ้นส่วน การเกิดราก

๗. การย้ายปลูกลงต้นกล้า นำขวดที่เพาะเลี้ยงว่านเพชรกลับ มาเลี้ยงให้ต้นอ่อนปรับสภาพในโรงเรือนเพาะชำ ๑ สัปดาห์ จึงนำออกจากขวด ล้างน้ำให้หมดวุ้นที่ติดมาที่ราก และชำในถุงพลาสติกดำที่มีวัสดุปลูก เลี้ยงในโรงเรือนนาน ๑-๒ เดือน เพื่อคัดอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายต้นกล้า

สถานที่ดำเนินงาน สวส ศวพ.น่าน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๗

๓. ผลการทดลองและวิจารณ์

การชักนำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น

เมื่อนำหน่ออ่อนขนาดยาวประมาณ ๕-๑๐ นิ้ว ออกจากเหง้า ล้างทำความสะอาด แล้วพอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอโรกซ์ ความเข้มข้น ๑๕ และ ๑๐ % นาน ๒๐ และ ๑๕ นาที ตามลำดับ และล้างด้วยน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อ ๓ ครั้ง ตัดแต่งส่วนที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับสารเคมีพอกฆ่าเชื้อ และตัดส่วนกาบใบทิ้ง ตัดแบ่งโคนหน่อออกเป็น ๒ ส่วน เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่กำหนด เป็นเวลา ๔๕ วัน พบว่า ทุกสูตรอาหารชักนำให้เกิดต้นจากหน่ออ่อนได้ไม่แตกต่างกัน และได้จำนวน ๑ ต้นต่อ ๑ ชิ้นส่วน (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ แสดงการปนเปื้อนเชื้อ การตายและการแตกตัวของวุ้นเพชกรลับในอาหารสูตร MS ที่เติม BA ระดับต่างๆ ภายหลังจากนำเห้งมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นเวลา ๔๕ วัน

สูตรอาหาร	จำนวนชิ้นส่วนเริ่มต้น (ขวด)	ปนเปื้อนเชื้อ(ขวด)	ตาย (ขวด)	จำนวนขวดที่ได้	จำนวนต้นที่ได้
MS ไม่เติม BA	๒๐	๓	๖	๑๑	๑๑
MS+๑ppm BA	๒๐	๒	๓	๑๕	๑๕
MS+๒ppm BA	๒๐	๕	๖	๙	๙
MS+๓ppm BA	๒๐	๕	๖	๙	๙
MS+๔ppm BA	๒๐	๑	๑๐	๙	๙
MS+๕ppm BA	๒๐	๑๐	๓	๗	๗

หมายเหตุ: จำนวนชิ้นส่วนเริ่มต้น คือ 1/2 หน่ออ่อนต่อ ๑ ขวด


การเพิ่มปริมาณยอด

นำส่วนยอดของต้นอ่อนวุ้นเพชกรลับที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ เลือกขนาดประมาณ ๒-๓ ซม. ตัดแต่งชิ้นส่วนโดยตัดส่วนที่เป็นกาบใบและส่วนที่เป็นสีดาออก เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่กำหนด เป็นเวลา ๔๕ วัน พบว่า ในทุกสูตรอาหาร MS ทั้งที่เติมและไม่เติม BA มีการเพิ่มปริมาณยอด/หน่อใหม่สูงประมาณ ๔-๖ ต้น และดีที่สุดในการสร้างเคราะห้สูตร MS ที่เติม ๖ppm BA (ตารางที่ ๒และกราฟที่ ๑) การเกิดรากสามารถเกิดได้ดีในทุกสูตรอาหาร

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนหน่อที่แตกใหม่ของวุ้นเพชกรลับที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ระดับต่างๆ ภายหลังจากเลี้ยงส่วนยอดเพื่อเพิ่มปริมาณ เป็นเวลา ๔๕ วัน

สูตรอาหาร	จำนวนหน่อที่แตกใหม่
MS ไม่เติม BA	๔.๑๔ ^c
MS+๒ppm BA	๕.๒๙ ^b
MS+๔ppm BA	๖.๒๒ ^a
MS+๖ppm BA	๖.๖๐ ^a
MS+๘ppm BA	๖.๐๕ ^{ab}

๑/ Different letter indicate significant within columns by Duncan's Multiple Range test at P< ๐.๐๕



กราฟที่ ๑

แสดง

จำนวนหน่อที่แตกใหม่ของวุ้นเพชกรลับที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ระดับต่างๆ ภายหลังจากเลี้ยงส่วนยอดเพื่อเพิ่มปริมาณ เป็นเวลา ๔๕ วัน

จะเห็นได้ว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวุ้นเพชกรลับ ทั้งในขั้นตอนการชักนำให้เกิดต้น การเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดราก เกิดขึ้นได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA แต่หากต้องการ

ให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการเพิ่มปริมาณยอด สามารถเติม BA ลงไปในอาหารสังเคราะห์ได้ ตั้งแต่ ๒-๘ ppm (๕-๗ ต้น/ชิ้นส่วน)

๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

ได้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านเพชรกลับ คือ

๑. ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดต้น

ใช้หน่ออ่อนขนาดยาวประมาณ ๕ นิ้ว ตัดออกจากหัวเหง้า ล้างทำความสะอาด แล้วฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอโรกซ์ ความเข้มข้น ๑๕ และ ๑๐ % นาน ๒๐ และ ๑๕ นาที ตามลำดับ และล้างด้วยน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อ ๓ ครั้ง ตัดแต่งส่วนที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับสารเคมีฟอกฆ่าเชื้อ และตัดส่วนกาบใบทิ้ง ตัดแบ่งโคนหน่อออกเป็น ๒ ส่วน เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติม BA สามารถชักนำให้เกิดต้นได้

๒. ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณยอด

นำต้นอ่อนที่แตกยอดใหม่ขนาด ๒-๓ เซนติเมตร จากขั้นตอนที่ ๑ เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ๖ppm และขยายเพิ่มปริมาณโดยเปลี่ยนอาหารใหม่สูตรเดิมทุก ๔๕ วัน จนได้ปริมาณต้นตามต้องการ

๑๐. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับพันธุ์คัดเลือกของคุณวิจัยพืชสวนสุโขทัย
- สามารถนำไปปรับใช้กับการขยายพันธุ์/การเพิ่มปริมาณโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรวงศ์ ZINGIBERACEAE ได้

๑๑. คำขอบคุณ (ไม่มี)

๑๒. เอกสารอ้างอิง


ปิยะพร แสนสุข. ๒๕๕๕. ว่านประทอง: พืชหายากกับการอนุรักษ์. ใน วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่มที่ ๔๐ (๑) หน้า ๓๔-๓๙.

สถาบันวิจัยพืชสวน. ๒๕๔๖. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. ๑๕๖ หน้า.

อรนุช เกษประเสริฐ. ๒๕๕๐. พืชสมุนไพรวงศ์ ZINGIBERACEAE สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. ๒๕๘ หน้า.

อรนุช เกษประเสริฐ มงคล เกษประเสริฐ และ วรภิจ ห่องแสง. ๒๕๔๘. รวบรวม ศีรษะลักษณะทางการเกษตร สารพฤกษเคมี และอนุรักษพืชสมุนไพรวงศ์ขิง รายงานความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ปี ๒๕๔๘ ไตรมาส ๓ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๔๘) โครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร พืชพื้นเมืองและพืชใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์. หน้า ๕๐๖.



๑๓. ภาคผนวก



ภาพ

ผนวนกที่ ๑-๒ แสดงหัว

ว่านเพชรกลับ



ภา

ผนวนกที่ ๓-๔ แสดง หน่ออ่อนที่ใช้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

๕-๖ แสดง ต้นอ่อนที่ได้จากการชักนำให้เกิดยอดและการเพิ่มปริมาณยอด