

ศึกษาการขยายพันธุ์กาแฟอาราบิกา โดยวิธี somatic embryogenesis และ micro-cutting
Study micropropagation protocol for Arabica coffee by somatic embryogenesis
and micro-cutting

นางสาวประภาพร ฉันทานุมัติ^{๑/} นายไพรัตน์ ช่วยเต็ม^{๑/} นางสาวอรทัย ธนัญชัย^{๑/}
นางสาวยุพิน กลิ่นเกษมพงษ์^{๒/} นางสาวฉัตรตัญญา ชม่อวู^{๓/}

บทคัดย่อ

การศึกษาการขยายพันธุ์กาแฟอาราบิกา โดยวิธี somatic embryogenesis และ micro-cutting วัตถุประสงค์เพื่อให้การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิกาสสามารถย่นระยะเวลาให้สั้นลง เพื่อผลิตพันธุ์กาแฟอาราบิกา ให้ได้ปริมาณมากและตรงตามพันธุ์ ดำเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร ใน กาแฟอาราบิกา ๓ สายพันธุ์ได้แก่ H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ (รหัส ๒/๘ SF H๕๒๘), H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๔๒๐) และ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๒๗ SF ๖๖๑-๓๖ และ รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖) ซึ่งจะเป็นพันธุ์ที่จะเสนอขอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร ผลการ ดำเนินงานพบว่า ได้วิธีการขยายพันธุ์โดยวิธี somatic embryogenesis ใน ๒ สายพันธุ์ คือ H.๔๒๐/๙ ML๒/๔- ๗๕-๖๒-๒๖ โดยใช้ส่วนใบอ่อน เพาะเลี้ยงเพื่อชักนำแคลลัสในอาหารแข็ง สูตรที่เหมาะสมคือ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร +TRIA ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร +๒,๔-D ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำตาล ๓๐ กรัมต่อลิตร pH๕.๖ ชักนำ แคลลัสให้เกิดขึ้นอ่อนรูปตอปีโต ในอาหารเหลวสูตร MS+BAP ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ และ เปลี่ยนเป็นอาหารเหลวสูตร MS เปลี่ยนอาหารทุกๆ ๒ สัปดาห์ เป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์ วางต้นอ่อนรูปตอปีโตบน กระดาษซับที่ฆ่าเชื้อแล้ว เป็นเวลา ๗ วัน ย้ายเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ๑/๒MS + BAP ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา ๒ เดือน เปลี่ยนอาหารกึ่งแข็งเป็นสูตร ๑/๒MS เป็นเวลา ๓ เดือน ได้ต้นอ่อนที่พร้อมย้ายไปอนุบาลใน เรือนเพาะชำ พบว่า มีต้นอ่อนรอดตาย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถพัฒนาเป็นต้นพันธุ์พร้อมปลูก ๖๓ เปอร์เซ็นต์ สำหรับ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ พบว่า ยังไม่สามารถชักนำใบอ่อนให้เกิดแคลลัสได้ แต่สามารถชักนำให้ เกิด direct embryo ในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS + Vitamin Gamborg + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำตาล ๓๐ กรัมต่อลิตร pH ๕.๖ เป็นเวลา ๑๑ เดือน จากนั้นย้าย direct embryo ลงเลี้ยงในอาหารสูตรอาหารกึ่งแข็งสูตร ๑/๒MS + BAP ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา ๒ เดือน เปลี่ยนอาหารกึ่งแข็งเป็นสูตร ๑/๒MS เป็นเวลา ๓ เดือน ได้ต้นอ่อนที่พร้อมย้ายไปอนุบาลในเรือนเพาะชำ ทั้งนี้ใน H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ พบว่า ยังอยู่ ในระหว่างดำเนินการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ : กาแฟอาราบิกา, การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ, สารควบคุมการเจริญเติบโต

^{๑/} ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

^{๒/} สถาบันวิจัยพืชสวน

^{๓/} ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

Abstract

Study micropropagation protocol for Arabica coffee by somatic embryogenesis and micro-cutting, aims to multiply and supply large numbers of Arabica coffee to farmers engaged in coffee production because the production and distribution of hybrid coffee is difficult due to the high costs required for manual crossing and maintenance. The use of somatic embryogenesis is an effective means of propagation. Research on ๒๐๑๒-๒๐๑๕ at Chumporn Horticulture Research Center, Chumporn, Thailand in ๓ cultivars of Arabica coffee; H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓, H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๓๕-๖๒-๒๖ and Catimor CIFC ๓๙๖๓-๖๖๑-๓๖. The result found the protocol by somatic embryogenesis only in H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๓๕-๖๒-๒๖ and Catimor CIFC ๓๙๖๓-๖๖๑-๓๖. The protocol for somatic embryogenesis of H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๓๕-๖๒-๒๖ from leaf explants is described here. The highest percentage of callus induction was observed from explants cultured on Solid MS medium (MS + Vitamin Gamborg) containing ๓๐ g/L sucrose supplemented with (๒ mg/L IAA + ๕ mg/L TRIA) or with (๒ mg/L IAA+ ๑ mg/L ๒,๔-D). When the embryogenic calli were transferred on Liquid MS medium (MS + Vitamin Gamborg) containing ๓๐ g/L sucrose supplemented with (๑ mg/L BAP), these further developed into torpedo embryo after ๓ week and subculture in ๑๐ week (๒ week/time). The torpedo embryo were keep on sterilize paper for ๗ days after that transfer on Semi-solid half-strength MS medium containing ๐.๕ mg/L BAP for ๒ months and obtain on Semi-solid half-strength MS medium for ๓ months, these further developed into plantlet which has ๒-๓ of true leaves (*in vitro* pregermination). Transplant *in vitro* pregermination in greenhouse, these were achieved with ๙๐% survival rate of *ex vitro* pregermination and ๖๐.๓% survival rate of plantlets. The protocol for somatic embryogenesis of H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๓๕-๖๒-๒๖ from leaf explants is described here. The highest percentage of direct embryo induction was observed from explants cultured on Semi-solid MS medium (MS + Vitamin Gamborg) containing ๓๐ g/L sucrose supplemented with (๒ mg/L IAA) after ๑๑ months. The direct embryo were transferred on Semi-solid half strength MS medium containing with ๐.๕ mg/L BAP for ๒ months, then transferred on Semi-solid half strength MS medium for ๓ months, these further developed into *in vitro* pregermination. For the protocol for somatic embryogenesis of H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ was in progress.

คำนำ

กาแฟ (*Coffea* spp.) ปัจจุบันพบว่ามียุคประมาณ ๑๒๐ ชนิด (species) (Jean Nicolas Wintgens, ๒๐๐๔) สำหรับประเทศไทยมีการปลูก ๒ พันธุ์หลักได้แก่ กาแฟโรบัสตา (ปลูกมากทางภาคใต้) และ กาแฟอะราบิกา (ปลูกมากทางภาคเหนือ) พันธุ์กาแฟเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญซึ่งมีข้อจำกัดทั้งในด้านการให้ผลผลิตและคุณภาพ โดยเฉพาะกาแฟอะราบิกาที่เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วไปมีความอ่อนแอต่อโรคราสนิม (*Hemileia vastatrix* B. & Br.) ทำให้ผลผลิตลดลงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต จากผลการดำเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์กาแฟในปี ๒๕๓๒-๒๕๕๓ วิจัยได้พันธุ์กาแฟอะราบิกา ได้พันธุ์รับรอง จำนวน ๑ พันธุ์ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ ๘๐ (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ๒๕๕๐) และได้คัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบिकासายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมลูกผสมชั่วที่ ๖ ในสภาพธรรมชาติ ได้จำนวน ๒ สายต้น ได้แก่ พันธุ์ H ๕๒๘/๔๖ ML ๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ และ H ๔๒๐/๙ ML ๒/๔-๗๘-๓๑-๓๔ (มานพ และคณะ, ๒๕๕๑; มานพ หาญเทวี๑, ๒๕๕๓) ซึ่งจะเสนอขอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเซลล์ร่างกายให้พัฒนาจนเป็นต้นอ่อนหรือตัวอ่อนโดยไม่มีเซลล์พันธุกรรมมาเกี่ยวข้อง (somatic embryogenesis) และ micro-cutting โดยเฉพาะ Somatic embryogenesis เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ต้นอ่อนที่ได้จะมีพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ทุกประการ และยังมีระบบรากที่เสมือนรากแก้ว ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเหมือนต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาวิธีการ Somatic embryogenesis ในกาแฟโรบัสตาจนกระทั่งสามารถผลิตกล้ากาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่ได้รับการคัดพันธุ์เพื่อกระจายกาแฟสู่เกษตรกร (ประภาพร และยุพิน, ๒๕๕๔) กาแฟอะราบิกาเป็นพืชที่มีการผสมเกสรแบบผสมตัวเอง ปกติขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเมล็ดแต่มีโอกาสที่ผสมข้ามได้ ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการขยายพันธุ์วิธีดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่ไม่มีความแปรปรวน ต้องใช้เวลาดำเนินการถึงเจ็ดรอบ (ลูกผสมชั่วที่ ๗) มากกว่า ๒๕ ปี จึงจะสามารถกระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ ประกอบกับต้องมีต้นแม่พันธุ์จำนวนมากเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ในปริมาณมาก ดังนั้นหากต้องการผลิตพันธุ์ปริมาณมากและตรงตามพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยวิธี somatic embryogenesis) และ micro-cutting จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการขยายพันธุ์กาแฟอะราบิกา เพื่อให้การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอะราบिकासารย่นระยะเวลาให้สั้นลง เพื่อให้การผลิตกาแฟอะราบิกาของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีดำเนินการ

อุปกรณ์

๑. ต้นพันธุ์กาแฟอะราบิกา จำนวน ๓ พันธุ์ ได้แก่ H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ (รหัส ๒/๘ SF H๕๒๘), H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๔๒๐) และ Catimor CIFIC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๒๗ SF ๖๖๑-๓๖ และ รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖)
๒. วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารควบคุมการเจริญเติบโต (indole-๓-acetic acid; IAA, ๖-Benzylaminopurine; BAP, Triacontanol; TRIA) และกระดาษกรอง น้ำตาลทรายขาว เป็นต้น

๓. วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ บัวรดน้ำ ปุ๋ยทางใบ สารเคมีกำจัดแมลงและโรคพืช ป้ายชื่อ วัสดุปลูก (พีทมอสขาว และพีทมอสดำ) ตะกร้า เป็นต้น

วิธีการ

๑. แบบการทดลอง : ไม่มีแบบแผนการทดลอง

๒. วิธีการทดลอง

๒.๑ การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อโดยวิธี somatic embryogenesis

๒.๑ การฟอกฆ่าเชื้อ

นำใบอ่อนกาแพะราบิกาที่ดูแลรักษาในเรือนเพาะชำไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ จากนั้นล้างในน้ำไหลให้สะอาด แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา ๓๐ นาที แล้วนำไปแช่ในแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๔๐ นาที แล้วล้างน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อแล้ว ๓ ครั้ง นำใบกาแพะมาตัดเป็นชิ้นขนาด ๓x๓ มิลลิเมตร

๒.๒ การชักนำให้เกิดแคลลัส (embryogenic callus induction)

อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, ๑๙๖๒) ที่เติม Vitamin Gamborg (Gamborg's, ๑๙๖๘) น้ำตาลซูโครส (sucrose) ๓๐ กรัมต่อลิตร pH๕.๖ ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตตามกรรมวิธี ๙ กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ ๑ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๒ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร + TRIA ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๓ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร+TRIA ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๔ MS (MS + Vitamin Gamborg) + TRIA ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๕ MS (MS + Vitamin Gamborg) + TRIA ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๖ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร + ๒,๔-D ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๗ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร + ๒,๔-D ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๘ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร + ๒,๔-D ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ ๙ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร + ๒,๔-D ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมน้ำตาลซูโครส (sucrose) ๓๐ กรัมต่อลิตร pH๕.๖ แล้วเก็บไว้ในที่มีด โดยเปลี่ยนอาหารทุก ๒ เดือน

๒.๓ การผลิตต้นอ่อนรูปตอปีโต (torpedo embryo production)

เมื่อได้แคลลัส ดำเนินการคัดเลือกแคลลัสภายใต้กล้องสเตอริโอ โดยคัดเลือกกลุ่มแคลลัสที่มีศักยภาพคือ มีการเกาะกลุ่มกัน มีความวาว สีขาวอมเหลือง และคัดต้นอ่อนโดยตรง (direct embryos) ออกจากกลุ่มแคลลัส ชั่งน้ำหนักแคลลัสที่ ๐.๐๕ กรัม นำแคลลัสไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS+BAP ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน ๑๐๐ มิลลิตร เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ และเปลี่ยนเป็นอาหารเหลว MS ปริมาณ ๕๐๐ มิลลิตร โดยทำการเปลี่ยนอาหารทุกๆ ๒ สัปดาห์ จนกระทั่งแคลลัสพัฒนาเป็นต้นอ่อนรูปตอปีโต พร้อมบันทึกระยะเวลาในการพัฒนาในขั้นตอนนี้ ให้เขียนบนเครื่องเขย่าแบบวนอนตลอดเวลา

๒.๔ การชักนำให้ต้นอ่อนรูปตอปีโตเป็นต้นอ่อนที่มีใบจริง (*In vitro* pregermination)

หลังจากได้ต้นอ่อนรูปตอปีโตแล้ว เก็บเกี่ยวต้นอ่อนรูปตอปีโตจากอาหารเหลว วางต้นอ่อนรูปตอปีโตบนกระดาษซับที่ฆ่าเชื้อแล้ว จำนวน ๗ วัน เพื่อทำลายการพักตัวของต้นอ่อน จากนั้นชั่งต้นอ่อนจำนวน ๑ กรัม

นำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ๑/๒MS +BAP ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้แสง ๑๔ ชมต่อวัน บันทึกระยะเวลาในการพัฒนา เปลี่ยนอาหารกึ่งแข็งเป็นสูตร ๑/๒MS บันทึกระยะเวลาในการพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่มีใบจริง ๒-๓ คู่

๒.๕ การอนุบาลในเรือนเพาะชำ (Ex vitro pregermination)

นำต้นอ่อนที่มีใบจริง ๒-๓ คู่ ย้ายอนุบาลในเรือนเพาะชำโดยแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนคือ (๑) อนุบาลในตระกร้า (๒) อนุบาลในถุงดำ ดังนี้

(๑) การอนุบาลในตระกร้า วัสดุปลูกคือ พีทมอส (peat moss) ขาวและดำ อัตราส่วน ๑:๑ ผสมให้ วัสดุปลูกมีความชื้นประมาณ ๘๕ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนให้แน่น ใช้ปากคีบคีบต้นอ่อนที่ละต้นจุ่มสารละลายกันราก่อนปลูกเรียงเป็นแถว นำตระกร้าใส่ในถุงพลาสติกใสมัดให้แน่น นำไปเก็บในอุโมงค์พลาสติกที่ควบคุมอุณหภูมิภายในไม่ให้เกิน ๓๕ องศาเซลเซียส และพรางแสงประมาณ ๔๐ - ๖๐ เปอร์เซ็นต์ จนได้ต้นกล้าขนาดใหญ่ (มีใบจริง ๕-๖ คู่) พร้อมบันทึกเวลาที่พัฒนาการและอัตราการรอดตาย

(๒) การอนุบาลในถุงดำ นำต้นกล้าที่รอดจากการอนุบาลในตระกร้า และมีใบจริงประมาณ ๕-๖ คู่ไปย้ายมาอนุบาลในถุงดำเพื่อให้เจริญเติบโตพร้อมที่จะย้ายปลูกในสภาพแปลงโดยทดลองย้ายปลูกในวัสดุปลูก ๒ ชนิดคือ วัสดุปลูกเก่า (ขุยมะพร้าว:หน้าดิน:ปุ๋ยคอก:ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๑:๑:๑) และวัสดุใหม่ (ขุยมะพร้าว:ทราย:ปุ๋ยหมัก:ใบก้ามปู อัตราส่วน ๑:๑:๑) และเก็บรักษาใน ๒ สภาวะคือ อุโมงค์ควบคุมอุณหภูมิ และนอกอุโมงค์ควบคุมอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาที่พัฒนาการและอัตราการรอดตาย

๒.๖ การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อโดยวิธี micro cutting

สำหรับกาแพะราบิก้าที่ไม่สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยวิธี Somatic embryogenesis ได้ จะทำการศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยวิธี micro cutting โดยการนำตาข้างมาฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS เพื่อศึกษาถึงอัตราการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้

๓. การบันทึกข้อมูล : เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัส (%) ระยะเวลาในการพัฒนาจนเกิดต้น ได้แก่ แคลลัส ต้นอ่อนรูปตอปีโต ต้นอ่อนที่มีใบจริง อัตราการรอดตาย

เวลาและสถานที่

ระยะเวลา : ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเรือนอนุบาลต้นกล้า ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

ผลการทดลองและวิจารณ์ (เป็นส่วนสำคัญของการทำงานวิจัย)

ดำเนินการในกาแพะราบิก้า ๓ สายพันธุ์ได้แก่ H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ (รหัส ๒/๘ SF H๕๒๘), H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๔๒๐) และ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๒๗ SF ๖๖๑-๓๖ และ รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖) ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยวิธี Somatic embryogenesis คือ

๘.๑ กาแพะราบิก้าสายพันธุ์ H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๔๒๐) ขั้นตอนคือ


๘.๑.๑ การฟอกฆ่าเชื้อ นำใบอ่อนกาแพะราบิก้าที่ดูแลรักษาในเรือนเพาะชำไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ จากนั้นล้างในน้ำไหลให้สะอาด แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา ๓๐ นาที แล้วนำไปแช่ในแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๔๐ นาที แล้วล้างน้ำกลั่นที่หนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ๓ ครั้ง นำใบกาแพะมาตัดเป็นชิ้นขนาด ๓x๓ มิลลิเมตร

๘.๑.๒ การชักนำให้เกิดแคลลัส (embryogenic callus induction) พบว่า ชิ้นส่วนใบเริ่มสร้างแคลลัส ในสูตรอาหารกรรมวิธี ๒ คือ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร และ TRIA ๕ มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อเพาะเลี้ยงได้ ๕ เดือน (ภาพที่ ๑ก ๑ข, ตารางที่ ๑) โดยอัตราการสร้างแคลลัสอยู่ที่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ ๗ คือ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร + ๒,๔-D ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนที่ ๑๑ แต่อัตราการสร้างแคลลัสคือ ๒ เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ ๑) แคลลัสจะมีลักษณะเป็นกลุ่มเซลล์ที่เกาะตัวกัน มีสีขาวอมเหลือง มีความมันวาวในตัวเอง โดยในส่วนของแคลลัสบางส่วนนั้น มีการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอโดยตรง (ภาพที่ ๑ค) เรียกว่า Direct embryos ซึ่งเป็นต้นอ่อนที่ได้จากกระบวนการ Somatic embryogenesis อีกแบบหนึ่งพบว่า การชักนำให้เกิดแคลลัสในกาแพะราบิกานั้น ใช้อาหารสูตร MS เป็นหลักเช่นเดียวกับกาแพะไรบัสต้า แต่ในกาแพะราบิกานั้นจะมีการเติมฮอร์โมนออกซิน ซึ่งในการทดลองนี้มีทั้งการใช้ TRIA (Gatica, ๒๐๐๘) และ ๒,๔-D ตารางที่ ๑ เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสของชิ้นส่วนใบอ่อนกาแพะราบิกาสายพันธุ์ H.๔๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๔๒๐) เมื่อเพาะเลี้ยงได้ ๑๒ เดือน

กรรมวิธีที่	จำนวนชิ้นส่วนใบ (ชิ้น)		เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัส (%)
	ทั้งหมด	สร้างแคลลัส	
๑:MS+IAA ๒ mg/L+TRIA ๐ mg/L	๕๐	๐	๐
๒:MS+IAA ๒ mg/L+TRIA ๕ mg/L	๕๐	๑๐	๒๐
๓:MS+IAA ๒ mg/L+TRIA ๑๐ mg/L	๕๐	๐	๐
๔:MS+IAA ๐ mg/L+TRIA ๕ mg/L	๕๐	๐	๐
๕:MS+IAA ๐ mg/L+TRIA ๑๐ mg/L	๕๐	๐	๐
๖:MS+IAA ๑ mg/L+๒,๔-D ๑ mg/L	๕๐	๐	๐
๗:MS+IAA ๒ mg/L+๒,๔-D ๑ mg/L	๕๐	๑	๒
๘:MS+IAA ๑ mg/L+๒,๔-D ๒ mg/L	๕๐	๐	๐
๙:MS+IAA ๒ mg/L+๒,๔-D ๒ mg/L	๕๐	๐	๐



(ก)




(ข)



(ค)

ภาพที่ ๑ ชิ้นส่วนใบที่เลี้ยงบนอาหาร MS (ก), embryogenic callus (ข), direct embryos (ค)

๘.๑.๓ การผลิตต้นอ่อนรูปตอปีโต (torpedo embryo production) บนเครื่องเขย่าแบบแนวนอนตลอดเวลา พบว่า เมื่อได้กลุ่มแคลลัสที่มีศักยภาพ คัดเลือกแคลลัสภายใต้กล้องสเตอริโอ ที่ยังเกาะกลุ่มกัน มีความมันวาว สีขาวอมเหลือง และคัดต้นอ่อนโดยตรง (direct embryos) ออกจากกลุ่มแคลลัส ชั่งน้ำหนักแคลลัสที่ ๐.๐๕ กรัม นำแคลลัสไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS+BAP ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน ๑๐๐ มิลลิตร เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ และเปลี่ยนเป็นอาหารเหลว MS จำนวน ๕๐๐ มิลลิตร เปลี่ยนอาหารทุกๆ ๒ สัปดาห์ พบว่า แคลลัสพัฒนาเป็นต้นอ่อนรูปตอปีโต ใช้เวลา ๑๐ สัปดาห์




(ก)




(ข)

ภาพที่ ๒ กลุ่มแคลลัสที่เลี้ยงในอาหารเหลว (ก) ต้นอ่อนรูปตอปีโตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแคลลัสในอาหารเหลว ๑๐ สัปดาห์ (ข)

๘.๑.๔ การชักนำให้ต้นอ่อนรูปตอปีโตเป็นต้นอ่อนที่มีใบจริง (*in vitro* pregermination) เมื่อเก็บเกี่ยวต้นอ่อนรูปตอปีโตจากอาหารเหลว วางต้นอ่อนรูปตอปีโตบนกระดาษซับที่ฆ่าเชื้อแล้ว จำนวน ๗ วัน เพื่อทำลายการพักตัวของต้นอ่อน จากนั้นชั่งต้นอ่อนจำนวน ๑ กรัมนำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ๑/๒MS +BAP ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้แสง ๑๔ ชั่วโมงต่อวัน พบว่าใช้เวลา ๒ เดือน เปลี่ยนอาหารกึ่งแข็งเป็นสูตร ๑/๒MS พบว่าใช้เวลา ๓ เดือน จะได้ต้นอ่อนที่พร้อมที่มีใบจริง ๒-๓ คู่ จึงจะย้ายไปอนุบาลในเรือนเพาะชำ (ภาพที่ ๓)



(ก)



(ข)

ภาพที่ ๓ ต้นอ่อนรูปตอปีโตที่เริ่มพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่มีใบเลี้ยง เมื่อเพาะเลี้ยงได้ ๒ เดือน (ก) ต้นอ่อนที่มีใบจริงที่พร้อมย้ายไปอนุบาลในเรือนเพาะชำ (ข)

๘.๑.๕ การอนุบาลในเรือนเพาะชำ (*Ex vitro* pregermination) เมื่อได้ต้นอ่อนที่มีใบจริง ๒-๓ คู่ (ภาพที่ ๓ข) ได้ย้ายไปอนุบาลในเรือนเพาะชำโดยแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนคือ

(๑) การอนุบาลในตระกร้า ผสมวัสดุปลูกโดยใช้พีทมอสขาวและดำ อัตราส่วน ๑:๑ ผสมให้วัสดุปลูกมีความชื้นประมาณ ๘๕ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อัดลงในตระกร้าให้แน่น นำต้นอ่อนจุ่มสารละลายกันราก่อนปลูกเรียงเป็นแถว (ภาพที่ ๔ก) นำตระกร้าใส่ในถุงพลาสติกใสมัดให้แน่น(ภาพที่ ๔ข) เก็บในอุโมงค์พลาสติกที่ควบคุมอุณหภูมิภายในไม่ให้เกิน ๓๕ องศาเซลเซียส และพรางแสงประมาณ ๔๐ - ๖๐ เปอร์เซ็นต์ พบว่า เมื่ออนุบาลเป็นเวลา ๔ เดือน ต้นกล้าขนาดใหญ่ (มีใบจริง ๕-๖ คู่) มีอัตราการรอดตายสูงกว่าต้นอ่อนที่มีขนาดเล็ก (มีใบจริงคู่เดียวหรือไม่มี) โดยมีอัตราการรอดตายถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ ผลของขนาดต้นต่อการอนุบาลต้นกล้ากาแพอราก้าในตระกร้า เมื่ออนุบาลเป็นเวลา ๔ เดือน

ขนาดต้น	จำนวนที่ปลูก (ต้น)	จำนวนต้นรอด (ต้น)	เปอร์เซ็นต์รอด (%)
ขนาดเล็ก	๑๓๔	๗๔	๕๕
ขนาดใหญ่	๓๐๓	๒๗๓	๙๐



(ก)



(ข)

ภาพที่ ๔ การย้ายปลูกลูกกล้าในตระกร้าอนุบาล (ก) รูปแบบการจัดการตระกร้าอนุบาลเพื่อนำไปเก็บในอุโมงค์เพาะเลี้ยง (ข)

(๒) การอนุบาลในถาดดำ เมื่อได้ต้นกล้าที่รอดจากการอนุบาลในตะกร้า และมีใบจริงประมาณ ๕-๖ คู่ใบ (ภาพที่ ๕) จะย้ายมาอนุบาลในถาดดำเพื่อให้เจริญเติบโตพร้อมที่จะย้ายปลูกในสภาพแปลงโดยทดลองย้ายปลูกในวัสดุปลูก ๒ ชนิดคือ วัสดุปลูกเก่า (ขุยมะพร้าว:หน้าดิน:ปุ๋ยคอก:ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๑:๑:๑) และวัสดุปลูกใหม่ (ขุยมะพร้าว:ทราย:ปุ๋ยหมักใบก้ามปู อัตราส่วน ๑:๑:๑) และเก็บรักษาใน ๒ สภาพาคือ อุโมงค์ควบคุมอุณหภูมิ และนอกอุโมงค์ควบคุมอุณหภูมิ พบว่า วัสดุใหม่ที่อนุบาลในอุโมงค์มีอัตราการรอดตายมากที่สุด แต่ต้นที่รอดตายและมีความแข็งแรงมีจำนวนคู่ใบและความสูงมากที่สุดคือ วัสดุเก่าที่อนุบาลในโรงเรือนปกติ (ตารางที่ ๓) จากการสังเกตต้นที่รอดตายใน ๔ กรรมวิธีนี้ จะพบว่าต้นกล้าที่อนุบาลในโรงเรือนปกติจะมีอัตราการตายในช่วงแรกสูงกว่าต้นที่อนุบาลในอุโมงค์ แต่เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นกล้าที่อนุบาลในอุโมงค์อนุบาล (ภาพที่ ๖)

ตารางที่ ๓ ผลของการอนุบาลต้นกล้าในถาดดำในวัสดุและสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นเวลา ๔ เดือน

กรรมวิธีที่	จำนวนต้นปลูก (ต้น)	จำนวนต้นรอดตาย (ต้น)	เปอร์เซ็นต์รอดตาย (%)	จำนวนใบจริง(คู่)	ความสูงต้น(ซม.)
๑:วัสดุปลูกเก่า+อุโมงค์	๓๓	๑๓	๓๙	๓.๓	๖.๘
๒:วัสดุปลูกใหม่+อุโมงค์	๓๓	๒๑	๖๓	๔.๐	๗.๒
๓:วัสดุปลูกเก่า+โรงเรือน	๓๓	๑๙	๕๗.๕	๑๑.๒	๗.๗
๔:วัสดุปลูกใหม่+โรงเรือน	๓๓	๑๑	๓๓.๓	๗.๗	๗.๕

หมายเหตุ วัสดุปลูกเก่า = ขุยมะพร้าว:หน้าดิน:ปุ๋ยคอก:ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๑:๑:๑ วัสดุปลูกเก่า = ขุยมะพร้าว:ทราย:ปุ๋ยหมักใบก้ามปู อัตราส่วน ๑:๑:๑



ภาพที่ ๕ ต้นกล้าเล็กที่พร้อมย้ายปลูกลงถาดดำ



ภาพที่ ๖ ต้นกล้าอายุ ๔ เดือนหลังย้ายปลูกลงถุงดำ

๘.๒ กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖) ขั้นตอนคือ

๘.๒.๑ การฟอกฆ่าเชื้อ นำใบอ่อนกาแฟอะราบิกาที่ดูแลรักษาในเรือนเพาะชำไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ จากนั้นล้างในน้ำไหลให้สะอาด แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา ๓๐ นาที แล้วนำไปแช่ในแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๔๐ นาที แล้วล้างน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อแล้ว ๓ ครั้ง นำใบกาแฟมาตัดเป็นชิ้นขนาด ๓x๓ มิลลิเมตร

๘.๒.๒ การชักนำให้เกิดแคลลัส (embryogenic callus induction) พบว่า ชิ้นส่วนใบเริ่มสร้างแคลลัส และมีการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอโดยตรง เรียกว่า Direct embryos ซึ่งเป็นต้นอ่อนที่ได้จากกระบวนการ Somatic embryogenesis อีกแบบหนึ่งในสูตรอาหารกรรมวิธี ๑ คือ MS (MS + Vitamin Gamborg) + IAA ๒ มิลลิกรัม ต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงได้ ๑๑ เดือน

๘.๒.๓ การชักนำให้ต้นอ่อนเป็นต้นอ่อนที่มีใบจริง (*in vitro* pregermination) เมื่อเก็บเกี่ยวต้นอ่อนที่เป็นเอ็มบริโอโดยตรง เรียกว่า Direct embryos จากอาหารเหลว วางต้นอ่อนบนกระดาษซับที่ฆ่าเชื้อแล้ว จำนวน ๗ วัน เพื่อทำลายการพักตัวของต้นอ่อน จากนั้นชั่งต้นอ่อนจำนวน ๑ กรัม นำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ให้แสง ๑๔ ชั่วโมงต่อวัน จะได้ต้นอ่อนที่พร้อมที่มีใบจริง ๒-๓ คู่ จึงจะย้ายไปอนุบาลในเรือนเพาะชำ ได้ต้นอ่อนที่มีใบจริง ๕-๖ คู่ ทั้งหมดประมาณ ๕๐ ต้นอ่อน



ภาพที่ ๗ Direct embryos ของกาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖)

๘.๓ กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ (รหัส ๒/๘ SF H๕๒๘) ขั้นตอนคือ

๘.๓.๑ การฟอกฆ่าเชื้อ นำใบอ่อนกาแฟอะราบิกาที่ดูแลรักษาในเรือนเพาะชำไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ จากนั้นล้างในน้ำไหลให้สะอาด แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา ๓๐ นาที แล้วนำไปแช่ในแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๔๐ นาที แล้วล้างน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อแล้ว ๓ ครั้ง นำใบกาแฟมาตัดเป็นชิ้นขนาด ๓x๓ มิลลิเมตร

๘.๓.๒ การชักนำให้เกิดแคลลัส (embryogenic callus induction) เมื่อนำชิ้นส่วนใบเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร ๙ กรรมวิธี เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) พบว่า ชิ้นส่วนใบยังไม่มีปฏิกิริยา

๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :

กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ H.๕๒๐/๙ ML๒/๔-๗๕-๖๒-๒๖ (รหัส ๓/๕ SF H๕๒๐) สามารถผลิตต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยวิธี somatic embryogenesis และได้ต้นกล้าที่พร้อมจะปลูกทดสอบในสภาพแปลง จำนวน ๑๐๐ ต้น กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ Catimor C1FC ๗๙๖๓-๖๖๑-๓๖ (รหัส ๒/๓๒ SF ๖๖๑-๓๖) สามารถผลิตต้นอ่อนที่ได้จาก Direct embryo จำนวน ๕๐ ต้น กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์ H.๕๒๘/๔๖ ML๒/๑๐-๒๙-๖๕-๒๓ (รหัส ๒/๘ SF H๕๒๘) กำลังดำเนินการทดลองหาวิธีการผลิตต้นกล้าจากวิธี somatic embryogenesis

๑๑. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :

ได้วิธีการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อโดยวิธี somatic embryogenesis เพื่อผลิตพันธุ์กาแฟอะราบิกาให้ได้ปริมาณมากและตรงตามพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ที่จะเสนอขอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

๑๒. คำขอขอบคุณ (ถ้ามี) :

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

๑๓. เอกสารอ้างอิง :

- Barry-Etienne, D., B. Bertrand, N. Vasquez and H. Etienne. ๒๐๐๒. Comparision of Somatic Embryogenesis-dirived Coffee (*Coffea arabica* L.) Plantlets Regenerated *in vitro* and *ex vitro*: Morphological, Mineral and Water Characteristics. *Annals of Botany* ๙๐: ๗๗ – ๘๕.
- Berthouly, M., M. Dufour, D. Alvard, C. Carasco, L. Alemana and C. Teisson. ๑๙๙๕. Coffee micropropagation in liquid medium using the temporary immersion technique. In: ASIC Publishers (eds.) ๑๖th International Scientific Colloquium on Coffee, Kyoto, Japon (pp. ๕๑๔-๕๑๙). Vevey, Switzerland.
- Gatica, Andres M., G. Arrieta and M. Espinoza. ๒๐๐๘. Direct somatic embryogenesis in *Coffea arabica* L. cas. Caturra and Catuai: effect of triacontanol, light condition, and medium consistency. *Agronomia Costarricense* ๓๒(๑): ๑๓๙-๑๔๗.