

แมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ

พืชตระกูลกะหล่ำ เป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการบริโภค และเป็นพืชที่มักพบการเข้าทำลายของทั้งโรคและแมลงศัตรูหลากหลายชนิด ศัตรูตัวหนึ่งที่กำลังระบาดและสร้างความเสียหายให้กับพืชดังกล่าว คือ **มวนปลักกาด** และ **มวนกะหล่ำ**

มวนปลักกาด (Bagrada bug/ Painted bug)

มวนกะหล่ำ (Ornata shieldbug/ Red cabbage bug)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bagrada hirsalis*

วงศ์ Pentatomidae

อันดับ Hemiptera



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eurydema ornata*

วงศ์ Pentatomidae

อันดับ Hemiptera



ทั้งตัวอ่อน และ ตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบพืชตระกูลกะหล่ำ เช่น ปลักกาดขาว ปลักกาดกวาดตุง กะหล่ำปลี เป็นต้น เมื่อดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วจะทำให้ใบพืชเป็นรูพรุน ใบซีดและไหม้ ผลผลิตและคุณภาพลดลงมาก เกษตรกรที่กำลังปลูกพืชตระกูลกะหล่ำอยู่ ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สักรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลาย ให้รีบหาแนวทางป้องกันกำจัดโดยด่วน



แนวทางป้องกันกำจัด

1. จับตัวเต็มวัยออกไปทำลายนอกแปลง
2. ปลูกพืชหมุนเวียน (ต้องไม่ใช่พืชตระกูลกะหล่ำ)
3. ใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราบีบเวอเรีย หรือ เชื้อราเมตาไรเซียม ฆ่าทุก 5-7 วัน หากพบการระบาดรุนแรง ฆ่าทุก 3 วัน
4. หากพบการระบาดรุนแรง ฆ่าด้วยสารฆ่าแมลง เช่น ไพเพอริล (กลุ่ม 2A) หรือ อิมิดาโคลพริด (กลุ่ม 4A)