


มาตรการป้องกันกำจัดโรค ใบด่างมันสำปะหลัง


มาตรการในการป้องกันกำจัด 3 ด้าน

2. มาตรการด้านวิชาการ

2.1 จัดทำคู่มือการสำรวจและเฝ้าระวัง
โรคใบด่างมันสำปะหลังตามมาตรฐาน ISPM 6



2.2 สำรวจ เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ในแหล่งปลูกทั่วประเทศ



● **พื้นที่เสี่ยงปานกลาง**
รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 0.9 ล้านไร่

● **พื้นที่เสี่ยงมาก**

ระยะทาง 798 กิโลเมตร ยึดตามแนว
ชายแดนลึกเข้ามาในประเทศไทย 20
กิโลเมตร

● **พื้นที่เสี่ยงน้อย**
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไป 31 จังหวัด
รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4.9 ล้านไร่

2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

มาตรการ กรณีตรวจพบอาการใบด่างมันสำปะหลัง

ระยะสั้น : เก็บตัวอย่างที่พบส่งห้องปฏิบัติการ บันทึก
รายละเอียด แจ้งผู้เกี่ยวข้อง จัดพ่นยาฆ่าแมลง สำรวจ
เฝ้าระวังต่อเนื่องจากจุดที่พบออกไป 5 กิโลเมตร ติดตาม
แปลงที่พบทุก 2 สัปดาห์

ระยะยาว : สำรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงพันธุ์
มันสำปะหลังให้ต้านทานโรค

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน : ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
เข้าพื้นที่ ทำการกำจัดให้หมดสิ้น

