ลงทะเบียนผู้ผลิตสับปะรดนางแล และสำรวจแหล่งผลิตสับปะรดนางแล

Registration and Survey of Plantation of 'Nang Lae' Pineaaple

ผู้ดำเนินงาน นิพัฒน์ สุขวิบูลย์[1/] นันทินี ศรีจุมปา[1/]
จันทนา ใจจิตร[2/]

บทคัดย่อ

การสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 83 รายในตำบลนางแล และตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลเป็นชายและหญิงใกล้เคียงกัน ศึกษาหาความรู้การทำสวนด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ 11-20 ปี เป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่เนิน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีแหล่งน้ำ และใช้น้ำฝนเป็นหลัก เตรียมพื้นที่โดยไถและตากดินไว้ 16-30 วันก่อนไถพรวน ไม่มีการยกแปลงหรือทำทางระบายน้ำระหว่างแถวปลูก ส่วนใหญ่เป็นสวนที่ปลูกพืชเดี่ยว หน่อพันธุ์ซื้อจากเพื่อนเกษตรกร และปลูก4000 หน่อ/ไร่ ปลูกเป็นแถวคู่ ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 100-120 กรัม/ต้น และใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 20-30 กรัม/ต้นที่โคนต้นหลังปลูกหรือหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่หยอดสารละลายเอทธีฟอนในเดือนตุลาคมเพื่อให้ออกดอกสม่ำเสมอในเดือนธันวาคม หลังดอกโรยก็จะหักจุกที่ผลออกเมื่อผลมีขนาดโตเต็มที่จึงมัดใบห่อผลป้องกันแสงแดด หนูคือศัตรูพืชที่สำคัญ และป้องกันกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษ เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง เก็บเกี่ยวผลเมื่อตาที่ผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองร้อยละ 10 โดยใช้มีดตัดให้มีก้านผลยาว 15-20 เซนติเมตร รวบรวมผลผลิตไว้ในที่ร่มในสวน พ่อค้ามารับซื้อผลผลิตที่สวนเป็นส่วนใหญ่ รองมาคือขนไปขายที่จุดรับซื้อเอง คัดเกรดผลโดยขนาดผล และความแน่นเนื้อ

[1/] ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-170100

[2/] สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต. บางหลวง อ.สรรพยา จ. ชัยนาท โทร. 056-405070