

การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิด
The Maternal Line Selection and Trails of Chinese Cabbage for Open-pollinated Varieties

อรทัย วงศ์เมฆา^{1/} กฤษณ์ สินวัฒนา^{2/} กิตติชัย แข็งย่าง^{1/} อรอนงค์ สร่างสุริยะวงศ์^{1/} วีรพรรรณ ตันเส้า^{1/}

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

สถาบันวิจัยพืชสวน

บทคัดย่อ

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทบทวน ได้ดำเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจาก Asian Vegetable Research and Development Center-The world vegetable center (AVRDC-The world vegetable center), ประเทศไทยจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ V10606461106, V90606441104 และ คู่ผสม E7xB18 ซึ่งดำเนินการคัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะการเข้าปลีแน่น โดยใช้ไม้หลักทำเครื่องหมายที่ดีที่สุด (D1) ปักไม้จำนวน 3 หลัก ที่ร่องลงมา (D2) ปักไม้ จำนวน 2 หลัก และที่ดีพอใช้ (D3) ปักไม้จำนวน 1 หลักย้ายต้นที่คัดเลือกไปปลูกรวมกันวงเป็นชั้น ชั้นนอกสุดคือดีพอใช้ (D3) ชั้นกลางคือดีร่องลงมา (D2) และชั้นในสุดคือดีที่สุด (D1) ห่างจากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร น้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) 251.8 กรัม น้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการเข้าปลีดีร่องลงมา (D2) 322.4 กรัม และน้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการเข้าปลีดีพอใช้ (D3) 534.2 กรัม จำนวนนำเมล็ดที่ได้จากการผสม เปิดด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ maternal line selection มาทำการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทบทวน โดยนำเมล็ดพันธุ์ D1 และ D2 จากการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทบทวนมาทดสอบกับพันธุ์การค้า ในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ปี 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ชั้น กรรมวิธีที่ 1 คือ พันธุ์ D1, กรรมวิธีที่ 2 คือพันธุ์ D2, กรรมวิธีที่ 3 คือ พันธุ์การค้า 1, กรรมวิธีที่ 4 คือพันธุ์การค้า 2 และกรรมวิธีที่ 5 คือพันธุ์การค้า 3 เตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2×5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25×25 เซนติเมตร ตามแต่ละกรรมวิธี พบร้า พันธุ์ D1 มีผลผลิตมากที่ 34.5 กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ์ D2, พันธุ์การค้า 2, พันธุ์การค้า 3 และพันธุ์การค้า 1 มีผลผลิตเฉลี่ย 28.5, 25, 24.8 และ 23.8 กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำหลัก: การคัดเลือกพันธุ์, การทดสอบพันธุ์, ทนร้อน, สายพันธุ์, ผักกาดขาวปลี

รหัสโครงการวิจัยที่ 01-102-58-01-00-00-02-58

ชื่อชุดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาพืชผัก ชื่อโครงการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)

*ทั้งหมด

^{1/}ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ (053) 114133-36,
114070-71 โทรสาร (053) 053-114072 E-mail: agriculture_24@hotmail.com

^{2/}สถาบันวิจัยพืชสวน 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 579-2759,
02-579-9545 โทรสาร (02) 561-4667 E-mail: linwattana@chaiyo.com

Abstract

The maternal line selection and traits of drought-tolerant Chinese cabbage for open-pollinated varieties was determined at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Mae-Win, Mae-Wang, Chiang Mai in 2015-2016. The three drought-tolerant varieties of Chinese cabbage seed from Asian Vegetable Research and Development Center-The world vegetable center (AVRDC-The world vegetable center), Taiwan such as V10606461106, V90606441104 and E7xB18 (hybrid variety) were planted and selected by the maternal line selection method. The physical characteristic of plant was selected from Crisp head, width stem and good shape that consist of D1 (head-forming leaf strong overlap at terminal region and head covered from subtending leaves), D2 (head-forming leaf slight overlap at terminal region and head intermediate from subtending leaves) and D3 (head-forming leaf curled overlap at terminal region and head exposed from subtending leaves). After that, the seed of D1 and D2 were planted and evaluated in the research field at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Mae-Win, Mae-Wang, Chiang Mai in 2016. The experiment was designed to RCBD with five treatments of Open-pollinated varieties and four replications of D1, D2, commercial variety No. 1, No. 2 and No. 3. The plot size was kept 1.2 m × 5 m for each treatment. The row to row and plant to plant spacing were 25 and 25 cm, respectively. The growth and yield of Chinese cabbage were evaluated. D1 was higher yield (34.5 kg) than D2 (28.5 kg), commercial variety No. 2 (25 kg), No. 3 (24.8 kg) and No.1 (23.8 kg), respectively but did not significant different in each commercial variety.

Keywords: The maternal line selection, trait, drought-tolerant, variety, Chinese cabbage.

คำนำ

ผักกาดขาวปลี (*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*) เป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย และนิยมปลูกกันมากในประเทศไทย จีนตอนใต้ ไต้หวัน และไทย ส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ ส่วนใบรับประทานเป็นผักสด หรือใช้ประกอบอาหารอื่นๆ ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ได้รับความนิยมบริโภคภายในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นผักที่สามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและจีน แหล่งปลูก

ผักกาดขาวปลีที่สำคัญอยู่ในพื้นที่รับ และพื้นที่ภูเขาและภาคเหนือของประเทศไทย โดยเกษตรกรนิยมใช้พันธุ์ผักกาดขาวปลีที่เป็นพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ พันธุ์ที่ใช้ปัจจุบันเป็นการค้าหรือปัจจุบันเพื่อส่งออกนิยมใช้พันธุ์ลูกผสม ซึ่งมาจากประเทศไทยญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี (ตระกูล และคณะ, 2540)

เนื่องจากผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดต่ำ (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอกาหนดประมาณ 6-6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 25-20 องศาเซลเซียส และควรได้รับแสงแดดตลอดวันส่วนพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบ่งตามลักษณะของปลีได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์ปลียาว, พันธุ์ปลีกลม และพันธุ์ปลีหวาน หรือไม่ห่อปลีและเป็นผักที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปี พ.ศ.2532 ได้มีการส่งนักวิจัยของประเทศไทยไปฝึกอบรม ณ AVRDC-The world vegetable center ประเทศไทยใต้หวัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเชือพันธุกรรมพิชรวมทั้งผักกาดขาวปลีพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะให้ลูกผสมที่สามารถปลูกได้ในเดือนเมษายน และสามารถเข้าปลีได้แน่น รูปทรงเป็นที่ต้องการของตลาด (ปลีรูปทรงกลมลักษณะทรงสันกว่าอ้วนกลมรี) แต่ยังมีปัญหาด้านการรักษาสายพันธุ์พ่อแม่ไว้ได้ค่อนข้างยากและปัญหาด้านนโยบายงานวิจัยที่ปรับเปลี่ยนของกรมวิชาการเกษตรจึงทำให้โครงการหยุดชะงักในช่วงเวลาที่ผ่านมา การนำพันธุ์ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดจากลูกผสม ชั้วที่ 1 โดยมุ่งการพัฒนาให้ได้พันธุ์ผสมเปิด โดยดำเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการไว้ จะทำให้เกษตรกรมีพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่สามารถปลูกและเก็บรักษาสายพันธุ์เองได้ จะช่วยเพิ่มรายได้จากการผลิตพืชผักชนิดนี้ให้ได้คุณภาพในช่วงฤดูที่ขาดแคลน ซึ่งโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554-2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 การทดลอง ได้แก่ 1) การศึกษาการรักษาสายพันธุ์พ่อและแม่ผักกาดขาวปลีลูกผสม 2) การศึกษาการผลิตผักกาดขาวปลีลูกผสม และ 3) การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ (Maternal line selection) เพื่อผลิตลูกผสมเปิด จากผลการดำเนินงานการรักษาสายพันธุ์พ่อและแม่ผักกาดขาวปลีลูกผสมที่ได้จาก AVRDC - The world Vegetable Center การผสมดอกอ่อนหลังจากการ Vernalization เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วนำไปปลูกในภาชนะมีการพัฒนาฝักและติดเมล็ด 70-80 % ในสายพันธุ์ E7 และสายพันธุ์ B18 มีการพัฒนาการติดฝักและติดเมล็ด 50-60 % ในขณะที่การผลิตลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ E7 และ B18 ผลลัพธ์พ่อแม่มีการพัฒนาของฝักและติดเมล็ดสูงมากกว่า 80 % พันธุ์ E7 มีลักษณะที่ผลผลิตสูงเข้าปลีแน่นลักษณะปลีกลมรี ส่วน B18 ลักษณะปลีกลมยาวสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน (รอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน) และ การทดลองการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ (Maternal line selection) เพื่อผลิตลูกผสมเปิดได้ลูกผสมเปิดในชั้วที่ 2 (F2) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิด เพื่อ

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตระหว่างพันธุ์สมเปิดของกรมวิชาการเกษตรกับของเกษตรกรใช้ในปัจจุบัน (พันธุ์การค้า) เพื่อแนะนำและศึกษาความเป็นไปได้ในแหล่งปลูกต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์สมเปิดที่ดีจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี
- เพื่อทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมที่ดีจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

อุปกรณ์

- วัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปากคีบ (forceps), ajan pale เชือ, บิกเกอร์, แอลกอฮอล์
- วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยมูลหมู-ไก่), ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, เกลือแกง, กระไรตัดแต่งกิ่ง, จบ, เสียม, ไม้ไผ่ปักหลัก, ถาดเพาะเมล็ด, มุ้งตาข่ายกันแมลง 32 mesh, ถุงกระดาษรีเมิร์, ตะกร้าพลาสติก, ชาแลนด์, พลาสติกใส, ป้าย Tag, ถุงพลาสติกซิปล็อก, ฟองกี้
- วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กกลม, เหล็กฉาก, สี
- วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ, ปากกาเมจิก, ปากกา, ดินสอ, กระไวร
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน้าจอพิมพ์, กระดาษปรินต์สี
- วัสดุโฆษณา แผ่นแพร์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

วิธีดำเนินการ

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์สมเปิดที่ดี

1. ระเบียบวิธีการวิจัย

ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์สมเปิดที่ดีในพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่สามารถปลูกได้ในช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ร่วบรวมได้ทั้งจากเกษตรกร และลูกผสมที่ดีจาก คู่ผู้สม พันธุ์ E7 และ B18 และลูกผสมเปิดจาก AVRDC-The world vegetable center

2. วิธีดำเนินการทดลอง ดังนี้

1. จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีสายพันธุ์ E7, B18 และลูกผสมเปิดจาก AVRDC-The world vegetable center
2. ดำเนินการเพาะเมล็ดผักกาดขาวปลีในถุงพลาสติกเพาะกล้าหลังเมล็ดผักกาดขาวปลีออกแล้วนำปลูกในถุงดำขนาด 14 นิ้วนำไปวางในแปลง จนกระทั่งเข้าปลี
3. คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะต้องการได้แก่ลักษณะเข้าปลีแน่น โดยใช้มือลักษณะเครื่องหมายที่ดีที่สุด ปักไม้จำนวน 3 หลัก ที่ดีรองลงมา ปักไม้ จำนวน 2 หลัก และที่ดีพอใช้ ปักไม้จำนวน 1 หลัก
4. ย้ายต้นที่คัดเลือกไปปลูกรวมกันห่างจากแปลงเดิม อย่างน้อย 1 กิโลเมตร ตามแผนผังที่แนบ
5. การเก็บเกี่ยวเมล็ดเมื่อผักกาดขาวปลีแห้งสนิท โดยหยุดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว
6. บันทึกข้อมูลได้แก่วันที่ปฏิบัติการเพาะกล้า ปลูกเก็บเกี่ยว และน้ำหนักเมล็ด

The diagram illustrates the flow of seed selection. On the left, a field plot is shown with a grid of 16x16 squares. Some squares contain symbols: a yellow 'S' at row 5, column 1; a red 'B' at row 7, column 1; and several red 'S' symbols at row 8, columns 1-4. An arrow points from this field plot to the right, leading to a breeding圃 (breeding圃) which is a grid of 8x8 squares. Each square in the breeding圃 contains either a 'F' (purple), 'G' (green), or 'B' (red).

F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	G	B	B	B	B	G	F
F	G	B	B	B	B	G	F
F	G	B	B	B	B	G	F
F	G	B	B	B	B	G	F
F	G	B	B	B	B	G	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	G	G	G	G	G	G	F
F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

ภาพที่ 1 แผนผังการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีแบบสายพันธุ์แม่ ด้านซ้ายมีคือการปลูกและคัดเลือก ด้านขวา มีคือแผนการนำต้นที่ได้คัดเลือก (ตามลักษณะที่ต้องการ) มาปลูกเพื่อผสมปล่อย โดยนำต้นดีที่สุด (เข้าเกณฑ์ที่สุด, B) ปลูกตรงกลาง รองลงมาโดยรอบ (G) และพอใช้ปลูกรอบนอก (F) ห่างจากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร (ป้องกันการผสมกับแปลงเดิม)

การทดลองที่ 2 การทดสอบพันธุ์พักการข้าวพันธุ์ผสมเปิดทึบห้อง

1. ระเบียบวิธีการวิจัย

ดำเนินการทดลองพันธุ์พักการข้าวปลีพันธุ์ผสมเปิดทึบห้องในพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยนำพันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิดที่ได้จากการคัดเลือกไปทดสอบกับสายพันธุ์จากร้านค้า วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 5 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ชั้า คือ

กรรมวิธีที่ 1 พันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิด สายพันธุ์ 55-1 (D1)

กรรมวิธีที่ 2 พันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิด สายพันธุ์ 55-2 (D2)

กรรมวิธีที่ 3 พันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1

กรรมวิธีที่ 4 พันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2

กรรมวิธีที่ 5 พันธุ์พักการข้าวปลีผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3

2. วิธีดำเนินการทดลอง ดังนี้

1. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2×5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25×25 เซนติเมตร ตามกรรมวิธี
2. การเพาะเมล็ดพันธุ์พักการข้าวปลีตามกรรมวิธีพันธุ์ต่างๆ ตามที่กำหนด
3. การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชตระกูลกะหลា
4. ดูแลให้น้ำ และพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชตามความจำเป็น
5. เก็บเกี่ยวในระยะที่ตลาดต้องการ
6. คำนวณผลผลิตต่อแปลง
7. สุ่มจำนวน 10 ต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
8. การเก็บข้อมูลได้แก่
 - 8.1 เก็บข้อมูลทางด้านการเกษตร (agronomic characteristics) เช่น ผลผลิตต่อไร่ การเจริญเติบโตก่อนการเข้าปลี การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช การออกดอก
 - 8.2 การเข้าปลี รูปทรง ความแน่นของปลี (GAP พักการข้าวปลี, 2550)
 $\text{head ratio} = \text{length of head}/\text{width of head}$
 $\text{Stem ratio} = \text{length of stem}/\text{width of stem}$

ระยะเวลา

เริ่มต้นตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต. แม่-win อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ผลการทดลองและวิจารณ์

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีผสมเปิดทนร้อน ได้ดำเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจาก Asian Vegetable Research and Development Center-The world vegetable center (AVRDC-The world vegetable center), ประเทศไทยจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์V10606461106, V90606441104 ที่สามารถปลูกได้ในช่วงเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม และ คุ่ผสม E7xB18 ซึ่งดำเนินการคัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะการเข้าปลีแน่น (ภาพที่ 3-ก) โดยใช้มือหลักทำเครื่องหมายที่ดีที่สุด (D1) ปักไม้จำนวน 3 หลัก ที่ดีรองลงมา (D2) ปักไม้จำนวน 2 หลัก และที่พอใช้ (D3) ปักไม้จำนวน 1 หลักย้ายต้นที่คัดเลือกไปปลูกรวมกันวางเป็นชั้น (ภาพที่ 3-ง) ชั้นนอกสุดคือดีพอใช้ (D3) ชั้นกลางคือดีรองลงมา (D2) และชั้นในสุดคือดีที่สุด (D1) ห่างจากแปลงเดิมอย่างน้อย 1 กิโลเมตร

1. น้ำหนักเมล็ด

น้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) จำนวนต้น 30 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 251.8 กรัม น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 8.4 กรัม/ต้น, น้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) จำนวนต้น 43 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 322.4 กรัม น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 7.5 กรัม/ต้น และน้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) มีจำนวนต้น 55 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 534.2 กรัม น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 9.7 กรัม/ต้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนต้น, น้ำหนักเมล็ด และค่าเฉลี่ยน้ำหนักเมล็ดต่อต้น ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี

2558-2559

พันธุ์	จำนวนต้น	น้ำหนักเมล็ด	น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย/ต้น
	(ต้น)	(กรัม)	(กรัม)
D1	30	251.8	8.4
D2	43	322.4	7.5
D3	55	534.2	9.7



(ก) เพาะเมล็ดผักกาดขาวปลี



(ข) ต้นกล้าอายุ 1 สัปดาห์



(ค) ปลูกลงถุงขนาด 14 นิ้ว



(ง) ต้นผักกาดขาวปลีหลังย้ายปุก 1 สัปดาห์



(จ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีอายุ 30 วัน



(ฉ) คัดเลือกต้นผักกาดขาวปลี

ภาพที่ 2 เพาะเมล็ด ดูแลรักษา และคัดลักษณะต้นผักกาดขาวปลี (ก-ฉ)



(ก) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1)



(ข) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2)



(ค) ลักษณะต้นพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3)



(ง) การปลูกรวมกันวางแผนเป็นชั้น

ภาพที่ 3 ลักษณะต้นพันธุ์ผักกาดขาวปลีที่เข้าปลีดีที่ ถึงดีพอใช้ และนำไปวางเป็นชั้น (ก-ง)



(ก) ฝักที่แก่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยว



(ข) ลักษณะฝักที่แก่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยว



(ค) ตัดต้นผักกาดขาวปลีที่แก่แห้งตากแฉกก่อนเก็บเมล็ด



(ง) เอาฝักผักกาดขาวปลีออก



(จ) ลักษณะเมล็ดผักกาดขาวปลี



(ฉ) ลักษณะเมล็ดผักกาดขาวปลี



(ช) บรรจุเมล็ดพันธุ์ใส่ถุง



(ซ) ทดสอบความอกรของเมล็ด

ภาพที่ 4 ดูแล และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ก-ช)

การทดลองที่ 2 การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน

1. การเจริญเติบโตด้านความกว้าง

การเจริญเติบโตด้านความกว้างของผักกาดขาวปลีทำการวัดการเจริญเติบโตหลัง芽ปลูก 30 วัน และ 45 วันก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ความกว้างที่อายุ 30 วัน ความกว้างผักกาดขาวปลีหลัง芽ปลูก 30 วัน พบร้า พันธุ์ผักกาดขาวปลีผสม เปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความกว้างมากที่สุด 33.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้า พันธุ์ที่ 1 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีความกว้างเฉลี่ย 32.2 และ 30.8 เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีความกว้างเฉลี่ย 27.5 และ 27 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ความกว้างที่อายุ 45 วัน พบร้า พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 มีความกว้างเฉลี่ยมากที่สุด 43.8 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 38.8 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1), พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) และพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 41.4, 41.4 และ 40.5 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

2. การเจริญเติบโตด้านความยาว

ความยาวที่อายุ 30 วัน พบร้า พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด 32.4 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีค่าเฉลี่ย 32.2 และ 30 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้า พันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 26.1 และ 25.7 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ความยาวที่อายุ 45 วัน พบร้า พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด 44.5 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1), พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 41.9, 41.4, 41 และ 38.9 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

3. การเจริญเติบโตด้านความสูง

ความสูงที่อายุ 30 วัน พบร้า พันธุ์พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 7.1 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1, พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) และพันธุ์ผสมเปิด จากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 6.8, 5.3 และ 4.9 เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

ความสูงที่อายุ 45 วัน พบร้าพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 29.6 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1, พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 26.2, 26, 25.6 และ 24.7 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

4. ผลผลิต

4.1 ผลผลิตต่อต้น

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 45 วัน หรือเข้าปลีพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 5-ช) พบร้าพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีผลผลิตต่อต้นมากที่สุด 1,300 กรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีค่าเฉลี่ย 1,113 กรัม แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2, พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1,050, 975 และ 837.5 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

4.2 ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 45 วัน พบร้า พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) มีเฉลี่ยผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกมากที่สุด 34.5 กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2), พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2, พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 และพันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 28.5, 25, 24.8 และ 23.8 กิโลกรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีด้านความกว้าง, ความยาว, ความสูง, ผลผลิต/ต้น และผลผลิต/พื้นที่ปลูก ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 2559

กรรมวิธี	การเจริญเติบโต (ซม.)						ผลผลิตต่อต้น (กรัม)	ผลผลิตต่อแปลง (กิโลกรัม)
	30 วัน		45 วัน		ความกว้าง	ความยาว		
	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง		
D1	30.8 ab	30 ab	5.3 ab	41.4 ab	41.2	24.7 b	1,300 a	34.5
D2	33.6 a	32.4 a	7.1 a	41.4 ab	41.9	26.2 b	1,113 ab	28.5
การค้า 1	32.3 ab	32.2 a	6.8 a	43.8 a	44.5	26 b	837.5 c	23.8
การค้า 2	27.5 b	25.7 b	4 b	40.5 ab	41	25.6 b	1,050 bc	25
การค้า 3	27 b	26.1 b	4.9 ab	38.8 b	38.9	29.6 a	975 bc	24.8
F-test	*	*	*	*	ns	*	*	ns
cv	11.1	11.3	25	6.9	8.2	7.6	12.5	27.5

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



(ก) เตรียมพื้นที่ปลูก



(ข) เพาะเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลี



(ค) ต้นกล้าผักกาดขาวปลีอายุ 1 สัปดาห์



(ง) ปลูกลงแปลงขนาด 1.2×5 เมตร



(จ) ลักษณะแปลงผักกาดขาวปลีที่อายุ 30 วัน



(ฉ) เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อตัน



(ช) เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อแปลง

ภาพที่ 5 การปลูกและดูแลรักษาแปลงทดลองพันธุ์ผักกาดขาวแบบผสมเปิด (ก-ช)



(ก) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์ D1



(ข) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์ D2



(ค) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 1



(ก) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 2



(จ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีพันธุ์การค้า 1



(ฉ) ลักษณะต้นผักกาดขาวปลีทั้ง 5 พันธุ์

ภาพที่ 6 ลักษณะประจำพันธุ์ของผักกาดขาวปลีทั้ง 5 สายพันธุ์ (ก-ฉ)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน พบร่วมน้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ 251.8 กรัม, พันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) ได้ 322.4 กรัม และน้ำหนักเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) ได้ 534.2 กรัม

การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ผสมเปิดทนร้อนไปทดสอบกับพันธุ์การค้า การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ได้แก่ ด้านความกว้าง ความยาว ความสูง ผลผลิตต่อต้น และผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกขนาด 1.2×5 เมตร พบร่วมน้ำหนักพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2) มีการเจริญเติบโตด้านความกว้าง, ความยาว และความสูงมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) และ พันธุ์ผสมเปิดจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D1) ให้ผลผลิตต่อต้น และผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกมากที่สุด 1,300 กรัม และ 34.5 กิโลกรัม ตามลำดับ รองลงมาคือ พันธุ์ผสมเปิดทนร้อน 55-1 (D2)

อย่างไรก็ตามการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน เป็นการทดสอบในช่วงฤดูฝน จึงเกิดการเข้าทำลายของเชื้อโรค ทำให้ลดต้นเน่าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์

นำเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีจากการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน พันธุ์ที่เข้าปลีดีที่สุด (D1) และ พันธุ์ที่เข้าปลีดีรองลงมา (D2) ไปทดสอบกับพันธุ์การค้า เพื่อให้ได้พันธุ์ผักกาดขาวพันธุ์ผสมเปิดทนร้อน ที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และนำเมล็ดพันธุ์ที่เข้าปลีดีพอใช้ (D3) ส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกต่อไป

คำขอบคุณ

การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมสำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของทีมงานวิจัยผัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศกล.ชม ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยตั้งกล่าวจนสำเร็จลงได้ด้วยดี

บรรณานุกรม

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับกล้าปลีและผักกาดขาวปลี. กรมวิชาการการเกษตร.

12 หน้า.

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2555. คำนิยามอากาศ. เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ <https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=1> 30 มี.ค. 2560.

โชคชัย ไชยมงคล, มนีฉัตร นิกรพันธุ์ และตระกูล ตันสุวรรณ. 2538. การเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดขาวปลีเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั้นที่ 1. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11 หน้า.

ดนัย บุญยะเกียรติ. 2539. สรีริวิทยาของพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 216 หน้า.

ตระกูล ตันสุวรรณ, โชคชัย ไชยมงคล และมนีฉัตร นิกรพันธุ์. 2540. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 8 หน้า.

นิรนาม. 2552. ผักคะน้าพันธุ์แม่โจ้ 1. เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ <http://210.246.186.28/hort/new/breeding/pakadhu.htm>. 30 มี.ค. 2560.

มนีฉัตร นิกรพันธุ์, สุรพน ธนากรกิจกุล, มาโนช ทองเจียม, ตระกูล ตันสุวรรณ และคณะ. 2545. การปรับปรุงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า S1-S22.

Graebe, J.E. 1987. Gibberelline biosynthesis and control. Ann. Rev. Plant Physiol. 38: 416-465.

Linwattana, G., C. M. Protacio and R.C. Mabesa. 1997. Tropical lowlands seed production of Non-heading Chinese cabbage (*BrasicarapaL.pekinesis* Group) Using Vernalization and Gibberellic acid: Philipp.J.cropSci. 23 (3): 161-166

Shinohara, S. and M. Suyano. 1958. Effect of maternal line selection method on improvement of cruciferous crop. 1. On case of Shonai No. 1 Chinese cabbage. Shizuoka Pref. Expt. Sta. Rpt. 3:85-93.

Wiebe, H.J. 1990. Vernalization of vegetable crops; a review. *Acta Hortc.* 267: 323-328.