

แผนงานวิจัย แผนงานวิจัยและพัฒนากาแฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การเพิ่มคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโดยเน้นกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Quality Improvement of Arabica Coffee Focus on Post

Harvest Technology

คณะผู้ดำเนินงาน

นัด ไชยมงคล^{1/}

ประสงค์ มั่นสุจง

วิมล แก้วสีดา

วิภาสลักษณ์ วงศ์ไว

nanop หาญเทวี

บทคัดย่อ

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟ เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ ปัจจุบันคุณภาพผลผลิตบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง เป็นผลให้กาแฟมีความชื้นสูง เกิดเชื้อรา ໄใจง่าย กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว นับเป็นจุดวิกฤตของกระบวนการพัฒนากาแฟคั่วพร้อมจำหน่าย ซึ่งสามารถเพิ่มนูลค่าการจำหน่ายได้ เทคโนโลยีที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร

จากการทดลองพบว่าการแปรรูปผลกาแฟสด (Cherry) เป็นกาแฟกลา (Partment coffee) โดยมีกรรมวิธี 6 กรรมวิธี พนว่ากรรมวิธีที่ 2,3,4,5,6 ได้กาแฟกลาที่มีสีขาวนวล ไม่มีแตกต่างกัน สำหรับกรรมวิธีที่ 1 จะได้กาแฟกลาที่มีคราบสีเหลืองติดอยู่ เมื่อนำกาแฟกลาที่ได้จากการทดลองที่ 1 นำมาเก็บรักษาไว้ 9 เดือน สีเป็นกาแฟสาร (Green Coffee bean) แล้วนำมาคั่วอ่อน (Light roast) แล้วทดสอบคุณภาพการชิมพบว่ากรรมวิธีที่ 2 ได้รับคะแนนคุณภาพสูงสุด 5.61 รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที่ 6 ได้รับคะแนน 5.60 สำหรับกรรมวิธีที่ 3 และ 4 ได้รับคะแนน 5.9 และ กรรมวิธีที่ 5 และ 1 ได้รับคะแนน 5.58 และ 5.5 ตามลำดับ

^{1/} ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย โทร. (053) 605-955, 081-7465387

คำนำ

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากปีโตรเลียม กาแฟในเชิงการค้าที่สำคัญมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้า โดยปริมาณการผลิตกาแฟของโลกจะมีสัดส่วนของอาราบิก้า : โรบัสต้า ประมาณ 70 : 30 และปริมาณการค้ามีสัดส่วน 65 : 35 ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยผลิตกาแฟได้เพียงร้อยละ 1 ของโลก เป็นกาแฟโรบัสต้าลีบีร้อยละ 97 และอาราบิก้าเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น เนื่องจากกาแฟอาราบิก้ามีรสชาดไม่เหมือนรุนแรง และกลิ่นหอมนุ่มนวล จึงถือเป็นกาแฟคุณภาพดี ตลาดโลกมีความต้องการสูง ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าปีหนึ่งๆ ในปริมาณและมูลค่าสูง หากมีการพัฒนาการผลิตกาแฟดังกล่าว เพื่อทดแทนการนำเข้า จะเป็นการประหยัดเงินตราได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกาแฟกับเครื่องดื่มที่ทำจากพืชอื่นๆ เช่น ชา โกโก้ น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม ถือได้ว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนนิยมบริโภคมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยประชากรทั่วโลกจะบริโภคกาแฟไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 ล้านถ้วย สำหรับคนไทยนั้นมีการดื่มกาแฟก่อนเข้าสู่น้ำยาม เกือบประมาณ 90 ถ้วยต่อคนต่อปี อัตราการขยายตัวของตลาดกาแฟไทยประมาณร้อยละ 5-7 ต่อปี วิธีการตลาดกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย เกษตรราษฎรผลิตให้พ่อค้าห้องถิน โครงการหลวง โครงการพระราชดำริต่างๆ และพ่อค้าในส่วนกลาง ผู้ผลิตจำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคที่นิยมดื่มต่อกาแฟอาราบิก้าในร้านกาแฟสด ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กาแฟอย่างมากกว่ากาแฟสำเร็จรูป

กาแฟอาราบิก้า มีพื้นที่ปลูก ร้อยละ 7 ของการปลูกกาแฟทั่วประเทศ (อีกร้อยละ 93 เป็นพันธุ์โรบัสต้า) แหล่งผลิตสำคัญอยู่ทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เมืองส่องสอน ตาก น่าน ลำปาง เป็นต้น เป็นพันธุ์ที่ชอบอากาศเย็น จึงมักปลูกบนเขตที่สูงไม่ต้านทานต่อโรคราษฎร เมล็ดกาแฟมีกลิ่นหอม รสсладкое นีบปริมาณ caffeine อย่างกว่าพันธุ์โรบัสต้า นิยมนำมาทำกาแฟคั่วสด ส่วนใหญ่ผลผลิตใช้ภายในประเทศ แนวโน้มพื้นที่ปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ และราคารับซื้อกาแฟในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี จากผลกระทบและความนิยมบริโภคกาแฟสดที่ขยายตัวในระยะหลัง ส่งผลให้ราคากาแฟได้สูงขึ้น ประกอบกับมีบริษัทเอกชน สร้างเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟ เพื่อผลิตเป็นแบรนด์ของตนเองจำหน่าย

เกษตรกรภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัด ที่ปลูกกาแฟที่เป็นกุ่มตัวอย่างในการสำรวจจำนวน 100 ราย (จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ พบร่วมมือช่วยเหลือ 31-60 ปี ร้อยละ 53 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 82 เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น สมาคมสหกรณ์การเกษตร ชกส. เป็นต้น ส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 2-3 คน มีประสบการณ์ในการทำสวนกาแฟ 1-10 ปี ร้อยละ 42 มีพื้นที่ปลูกกาแฟน้อยกว่า 10 ไร่ ต่อครัวเรือน โดยร้อยละ 81 เป็นเจ้าของที่ดิน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียงตามแนวเขา ใช้หัวฟันและแหล่งน้ำธรรมชาติ ร้อยละ 43 มีน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตกาแฟ ส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ ให้กับชาวนา ขนาดการปลูกต่ำกว่า 10 ไร่ ต่อครัวเรือน โดยร้อยละ 81 ไม่ถูกวิธีในประเทศ การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ระยะปลูก และการตัดแต่งกิ่ง (สาลีและคน, 2551) กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาค้นคว้าปรับปรุงจนได้พันธุ์กาแฟอาราบิก้าพันธุ์ใหม่ ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 80 ด้านท่านโครงการสนับสนุน เห็นชอบที่จะใช้ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กาแฟที่พื้นที่ปลูกเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ หรือสีเหลือง-เหลืองเข้ม เดือกดิบเฉพาะผลสุก นำเข้าเครื่องลอกเปลือกนอกออกแล้วนำมหัคในบ่อคายน้ำสะอาดประมาณ 24-48 ชั่วโมง ขัดเมือกและล้างคายน้ำสะอาดจากน้ำตามเดือนนานาชาติเดือนนานาชาติ หรือบันแควร์ไม่ไฝ่องคายตากเขย่า ประมาณ 7-10 วัน เมื่อเมล็ดแห้งดีแล้ว สามารถเก็บไว้รอจำหน่ายได้ ถึงขั้นตอนนี้เรียกว่ากาแฟคั่ว หากจะคั่ว นำกาแฟมาสีอากาศลาอก โดยใช้เครื่องสีคั่ว ซึ่งหลังจากสีแล้วจะได้สารกาแฟที่มีสีเขียวอมเทาหรือเขียวอมฟ้า กาแฟจะพร้อมดื่มต้องผ่านการคั่วและบดมาก่อน บางครั้งต้องผ่านกระบวนการบ่มก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคั่วและบด กาแฟบางชนิดอาจใช้เวลาบ่มถึง 3 ปี กระบวนการบ่มทำให้รสเบร์ยวนของกาแฟลดลง และรสชาติกลมกล่อมมากขึ้น จานนี้นำกาแฟมาคั่วโดยทั่วไประดับการคั่วกาแฟเบร์ยวนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คั่วอ่อน คั่วปานกลางและคั่วเข้ม ซึ่งปริมาณกาแฟอินและความเป็นกรดจะลดลงตามลำดับขั้นตอนสุดท้ายต้องผ่านกระบวนการบดก่อนนำไปชงคั่ว ผู้ที่ชงกาแฟหรือผู้ชงกาแฟ เรียกว่า Barista มีวิธีการชงให้ได้รสชาดแบบต่างๆ ได้แก่ เอสเพรสโซ่ อเมริกาโน่ ลาเต้ คาปูชิโน่ และมอคค่า เป็นต้น

วิธีดำเนินการและอุปกรณ์

การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการผลิตกาแฟคั่ว (กรรมวิธี)

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ชั้น กรรมวิธี ชั้นละ 50 ก.ก.

กรรมวิธีที่ 1 ผลสด – ลอกเปลือก – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก

กรรมวิธีที่ 2 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก

กรรมวิธีที่ 3 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 48 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก

กรรมวิธีที่ 4 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม.(กลุ่มด้วยผ้าพลาสติก) – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก

กรรมวิธีที่ 5 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 24 ชม. – เปลี่ยนน้ำ – หมักต่อ 24 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก

กรรมวิธีที่ 6 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม. – เปลี่ยนน้ำ – หมักต่อ 24 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก



การบันทึกข้อมูล

1. อุณหภูมิของน้ำ ขณะหมัก pH ของน้ำ
2. ลักษณะของน้ำ เช่น สี ความชุ่น ตะกอน
3. วิเคราะห์น้ำหมัก : เจื้อชุลินทรี ชาตุอาหาร
4. สีของกาแฟคั่ว
5. นำเมล็ดมาตรวจสอบหาเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนของเชื้อรา และสิ่งเจือปนอื่นๆ ของแต่ละกรรมวิธี
6. คุณภาพของเมล็ด : สีของเมล็ด กัดแยกเกรดเมล็ดกาแฟ
7. ทดสอบคุณภาพการซิม (Cup test)

การทดลองที่ 2 ทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอาราบิก้า

(ปี 2555-2556)

เป็นการทดลองเพื่อศึกษา ผลของการเก็บรักษาหรือบ่มเมล็ดกาแฟในระยะเวลาต่างๆ ต่อคุณภาพสารกาแฟ และคุณภาพกาแฟคั่ว ทำการบรรจุกาแฟใส่กระสอบปาน (ปอ) วางบนชั้นวางพลาสติกที่ใช้วางผลิตภัณฑ์ โดยเก็บแยก ระยะห่าง 20 กิโลกรัม วางกระสอบบนชั้นวางสูงจากพื้น 2 เซนติเมตร ห่างจากผนัง โรงเก็บ 50 เซนติเมตร บันทึก วัน เดือน ปี ที่บรรจุและทดสอบ เก็บรักษาตามระยะเวลา ตามกรรมวิธี เมื่อครบกำหนดนำกาแฟไปสืบให้ได้สารกาแฟก่อนการคั่ว วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธี จำนวน 2 ชั้น จำนวนสารกาแฟที่นำไปคั่ว หน่วยการทดลอง ละ 10 กิโลกรัม กรรมวิธีทดลองได้แก่ระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 4 กรรมวิธี ดังนี้ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

วัดผลโดยพิจารณาจาก อุณหภูมิห้องในห้องเก็บรักษา ลักษณะสารกาแฟที่ได้จากการสีกาแฟกล่าก่อนนำไปคั่ว บันทึก ข้อมูล สีของสารกาแฟ น้ำหนักสารกาแฟ กลิ่น การมีเชื้อรา คุณภาพของกาแฟคั่ว และคุณภาพการชงคั่มรสชาติ ความพึงพอใจ (ข้อมูลตัวแปรเชิงคุณภาพ ใช้วิธีให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด : ranking)

การวัดคุณภาพการชงคั่ม (Cup test) ใช้วิธีการให้คะแนนของผู้ชิม ซึ่งเป็นผู้มีทักษะเฉพาะจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร หรือจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วว)

สถานที่ทำการวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 รวม 2 ปี

ผลการทดลองและวิจารณ์

การทดลองที่ 1 การศึกษาการแปรรูปกาแฟกลาดอยช้าง

การศึกษาการแปรรูปกาแฟกลาดอยช้าง โดยการนำผลกาแฟสด (Cherry) ที่ผ่านการแห้งน้ำ ได้ผลกาแฟที่สมบูรณ์มากประกอบด้วยลักษณะเมล็ดกาแฟที่ได้มามากในปอชิเมนต์ มีกรรมวิธีการทำ 6 วิธี การพับว่าการกระทำตามกรรมวิธีที่ 2,3,4,5,6 ได้กาแฟกลา (parchment coffee) ได้ผลดีที่สุด คือ เมื่อนำกาแฟกลาดอยช้างที่ผ่านตามกรรมวิธีที่ 2,3,4,5,6 มาตากแดดให้เหลือความชื้นกาแฟกลา (parchment coffee) 7% จะได้ที่มีสีขาวนวลซึ่งเป็นสีที่ยอมรับของตลาด สำหรับกรรมวิธีที่ 1 จะได้กาแฟกลาที่มีสีครามเหลืองดินอยู่ (อุณหภูมิช่วงเวลาการทดลอง ต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส สูงสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส

กรรมวิธีที่ 1 ผลสด – ลอกเปลือก – ขัดเมื่อก – ล้าง – ตาก



กรรมวิธีที่ 2 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม. – ขัดเมื่อง – ล้าง – ตาก




กรรมวิธีที่ 3 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 48 ชม. – ขัดเมื่อง – ล้าง – ตาก



กรรมวิธีที่ 4 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม.(กลุ่มด้วยผ้าพลาสติก) – ขัดเมื่อก – ล้าง – ตาก



กรรมวิธีที่ 5 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 24 ชม. – เปลี่ยนน้ำ – หมักต่อ 24 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก



กรรมวิธีที่ 6 ผลสด – ลอกเปลือก - หมัก 36 ชม. – เปลี่ยนน้ำ – หมักต่อ 24 ชม. – ขัดเมือก – ล้าง – ตาก



การตาก



การเก็บรักษา



การเก็บรักษา



สีกาแฟกลาและกัดเกรด





เครื่องมีสารกาแฟทดสอบคุณภาพ



ทดสอบคุณภาพการชิม



การทดลองที่ 2 การศึกษาการเก็บรักษากาแฟ

จากการศึกษาการเก็บรักษาโดยนำกาแฟมาเผา (parchment coffee) ที่มีความชื้น 7% ที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาเก็บรักษาไว้ในโรงเรือน เก็บรักษากาแฟได้ช่วงระยะเวลา 9 เดือน เมื่อถึงระยะเวลา 9 เดือน แล้วนำมาสีเป็นสารกาแฟ (**Green coffee Bean**) และนำมาราดสอบคุณภาพการซึมที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยมีวิธีการตั้งนี้

นำสารกาแฟในแต่ละกรรมวิธีละ ประมาณ 1 กิโลกรัม มาทำการคั่วในระดับการคั่วอ่อน (Light Roast) นำกาแฟที่คั่วแล้ว กรรมวิธีละ 10 กรัม มาบดใส่ภาชนะ แล้วเริ่มทำการทดสอบจากการดมกลิ่นกาแฟเบื้องต้นแล้วทำการจดบันทึกคะแนนลงตาราง จากนั้นrinน้ำร้อนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสลงในการไฟฟ้าดีปิดภาชนะไว้ประมาณ 3 นาที สังเกตการณ์ตักษะกอนของกาแฟ เปิดภาชนะที่ปิดไว้ออกดมกลิ่นอีกครั้งแล้วประเมินค่าติดของกาแฟและบันทึกคะแนน โดยมีนักการงานจำนวน 6 ท่านทำการทดสอบ

จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาตามระยะเวลา 9 เดือน โดยพบว่ากรรมวิธีที่ 2 ได้รับคะแนนคุณภาพสูงสุด 5.61 รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 6 ได้รับคะแนน 5.60 สำหรับกรรมวิธีที่ 3 และ 4 ได้รับคะแนน 5.9 และกรรมวิธีที่ 5 และ 1 ได้รับคะแนน 5.58 และ 5.5 ตามลำดับ

ตารางแสดงการให้คะแนนการทดสอบคุณภาพการซึมกาแฟของคณะกรรมการ 6 ท่าน

	R1	R2	R3	รวมคะแนน	ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้
T1	31.9	32.65	34.20	98.75	5.5
T2	30	36.7	34.20	100.90	5.61
T3	37.20	32.6	35.1	104.90	5.9
T4	35.75	36.85	32.80	105.40	5.9
T5	32.60	33.9	34	100.50	5.58
T6	33.2	32.4	34.8	100.40	5.60

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการแปรรูปผลกาแฟสดเป็นกาแฟคั่วโดยมีวิธีการ 6 กรรมวิธี พบร่วมกันที่ 2,3,4,5,6 ได้กาแฟคั่วที่มีสีขาวนวลไม่แตกต่างกัน สำหรับกรรมวิธีที่ 1 จะได้กาแฟคั่วที่มีคราบสีเหลืองติดอยู่ เมื่อนำมาแฟกคลองที่ 1 นานเกินรักษาไว้ 9 เดือน นำมายังเป็นกาแฟสาร(Green Coffee bean)แล้วนำมาคั่วอ่อน นำมาทดสอบคุณภาพการชิมพบว่ากรรมวิธีที่ 2 ได้รับคะแนนคุณภาพสูงสุด 5.61 รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 6 ได้รับคะแนน 5.60 สำหรับกรรมวิธีที่ 3 และ 4 ได้รับคะแนน 5.9 และกรรมวิธีที่ 5 และ 1 ได้รับคะแนน 5.58 และ 5.5 ตามลำดับ

การให้คะแนนการทดสอบคุณภาพการชิมกาแฟในครั้งนี้ เป็นการให้คะแนนในการเก็บรักษาระยะ 9 เดือน เป็นการแปรรูปในเบื้องต้นก่อน และต้องทดสอบคุณภาพการชิมในรอบ 12 เดือน ข้อมูลจึงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในภาวะปัจจุบันกาแฟนับว่าเป็นเครื่องดื่มที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเดินทางไปตามถนนที่มีชุมชนหนาแน่น จะมีร้านกาแฟตลอดเส้นทาง ซึ่งอาจจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เช่น Starbucks, Costa, Caffe Nero ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ผู้ขายจะตั้งขึ้น เพื่อโฆษณา ร้านกาแฟของตัวเอง

การศึกษาการแปรรูปและการเก็บรักษากาแฟคั่วอย่างดี จึงมีประโยชน์อย่างมากที่จะใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนากาแฟของเกษตรกรเพื่อที่จะให้ได้กาแฟมีคุณภาพที่ดี รสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และยังกว่าหนึ่งตันต้องปลดออกหัว การแปรรูปไม่ถูกต้อง การเก็บรักษากาแฟที่มีความชื้นสูง กาแฟก็อาจเกิดเชื้อราออกราดออกซิน ชนิด เอ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในคน ซึ่ง การศึกษาการแปรรูปและการเก็บรักษากาแฟคั่วอย่างดีในครั้งนี้ ได้ทำการบันทึกข้อมูลในด้านการแปรรูปจากผลกาแฟสด (Cherry) ในกรรมวิธีต่างๆ จนพบว่าการแปรรูปในกรรมวิธีที่ 2,3,4,5,6 ได้ให้ผลดีที่สุด คือ เมื่อนำมาแฟกคลา คัฟลา (parchment coffee) ข้อมูลในการศึกษาระบบที่มีความชื้น 7% จะได้กาแฟที่มีสีขาวนวลไม่แตกต่างกัน สำหรับกรรมวิธีที่ 1 กาแฟคั่วจะมีสีเหลืองติดคลา คัฟลา ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ovarian ก้าว คือเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ไว้ใช้เป็นแนวทางการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อไป

คำขอบคุณ

ในการศึกษาการแปรรูปกาแฟคั่วอย่างดีในครั้งนี้ทางคณะผู้ทำการศึกษาขอขอบคุณคณะผู้ทำการทดสอบคุณภาพกาแฟ จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาตลอดจนทดสอบคุณภาพของกาแฟ นอกจากนี้การศึกษาการแปรรูปกาแฟคั่วอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย โดยเฉพาะคุณเสงี่ยม ไฝล้อม ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในการศึกษาการแปรรูปกาแฟคั่วอย่างดี ได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

- กรมวิชาการเกษตร.2548. ระบบการจัดการคุณภาพ GAP : กาแฟ . กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- สาลี ชินสกิต พุฒนา รุ่งระวี ศรีนณา ชูธรรมรัชช วิลาศลักษณ์ วงศ์ไวยา สุพร มังคลานี เยาวภา เด็กขัยภูมิ และสุนันท์ อีราภูมิ. 2551. ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร. การประชุมวิชาการประจำปี 2551 กรมวิชาการเกษตร. ผลงานวิจัยใช้ได้จริงจากที่สู่ห้อง ครั้งที่ 2. วันที่ 16-17 กันยายน 2551.
- โรงเรียนมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
- อังคณา สุวรรณภูมิ. 2552. กาแฟเครื่องคั่มปีศาจ. จดหมายข่าวผลไม้ . ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เมษายน 2552.
- Joseph S.G. .2546. กาแฟ ชงให้เป็น ดื่มให้อร่อย เชียงใหม่ : The Knowledge Center.