



รายงานโครงการวิจัย

วิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเชิงพาณิชย์

Research and Development for Expanding from Natural
Substances product to Commercial product

หัวหน้าโครงการวิจัย

นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม
Miss Charuwan Rattanasakultham

ปี พ.ศ. 2564



รายงานโครงการวิจัย

วิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเชิงพาณิชย์

Research and Development for Expanding from Natural
Substances product to Commercial product

หัวหน้าโครงการวิจัย

นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม
Miss Charuwan Rattanasakultham

ปี พ.ศ. 2564

คำปรารภ

โครงการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑจากสารธรรมชาติเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑจากมะนาวเชิงพาณิชย์ และการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑจากสืตอกอัญชันเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปสู่ระดับสากลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ด้วยการใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืชในการผลิตผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาผลผลิตตกต่ำได้ในอนาคต คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยที่สำเร็จลุล่วงนี้ จะมีผู้นำไปใช้ประโยชน์ และคณะผู้วิจัยมีความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากโครงการนี้ให้แก่ผู้สนใจเพื่อนำไปต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์

กรมวิชาการเกษตร

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	1
ผู้วิจัย	2
บทนำ	3
บทคัดย่อ	5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ	29
บรรณานุกรม	30
ภาคผนวก ก	32
ภาคผนวก ข	37

กรมวิชาการเกษตร

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564 สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรที่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โครงการนี้ได้ดำเนินการ

ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้มะนาวผงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสีผงดอกอัญชัน

ขอขอบคุณ คุณปานิตล นียมคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ที่ช่วยติดต่อประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ ของกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ ให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กรมวิชาการเกษตร

ผู้วิจัย

จารุวรรณ รัตนสกุลธรรม นภััสสร เลียบวัน
ศิริพร เต็งรัง และวิมลวรรณ วัฒนวิจิตร

Charuwan Rattanasakultham, Napatsorn Leabwan
Siriporn Tengrung and Wimonwan Wattanawichit

คำสำคัญ

มะนาวผง โลชั่นบำรุงผิว สบู่ก้อน
สีผงดอกอัญชัน เยลลี่อัญชัน น้ำอัญชันพร้อมดื่ม

Keywords

Lime powder, body lotion, soap bar
butterfly pea powder, butterfly pea jelly, ready to drink butterfly pea juice

กรมวิชาการเกษตร

บทนำ

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง ผลผลิตทางเกษตรหลายชนิดสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ทดแทนสารสังเคราะห์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะนาวใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดอกอัญชันใช้เป็นสารให้สีในการผลิตอาหารและเครื่องสำอาง

มะนาว (*Citrus aurantifolia*) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กตระกูลส้มที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ผลของมะนาวมีลักษณะกลม ฉ่ำน้ำ น้ำให้รสเปรี้ยว นิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องสำอาง มะนาวเป็นพืชอีกชนิดที่มีการออกผลตามฤดูกาล จึงมักประสบปัญหาการราคาตกต่ำและผลิตผลล้นตลาด มะนาวสดมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 2 สัปดาห์ ผลจะเริ่มเหี่ยว สีเปลือกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล (นิภา, 2541) ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่การเก็บในรูปแบบน้ำคั้นสดต้องใช้อุณหภูมิต่ำในการเก็บรักษาเนื่องจากเกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายจากจุลินทรีย์และเคมี (จารุวรรณ, 2543) การแปรรูปน้ำมะนาวให้อยู่ในลักษณะผงแห้งจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความยุ่งยากในการเก็บรักษาน้ำมะนาว โดยในการศึกษาของวิไลศรีและคณะ (2562) พบว่าการผสมน้ำมะนาวกับมอลโทเดกซ์ทริน DE10 และนำไปทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้อุณหภูมิเข้า 150 °C จะสามารถผลิตมะนาวผงที่มีความหอม และมีรสเปรี้ยวเหมือนน้ำมะนาวสด โดยมะนาวผงที่ได้มีความชื้นต่ำเพียง 3.12% นอกจากนี้ยังมีปริมาณกรด 20.58 mg/100 g และวิตามิน 40.54 mg/100 g ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลายประเภททั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่างเครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันนิยมนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ (active ingredient) โดยน้ำมะนาวมีองค์ประกอบทางพฤกษเคมีหลายชนิด เช่น กรดซิตริกซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ในกลุ่มแอลฟาไฮดรอกซี (alpha hydroxy acid, AHAs) มีฤทธิ์ในด้านการผลัดเซลล์ผิว กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ยับยั้งความชราของผิวหนัง (Babilas *et al.*, 2012) กรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซี มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ สาเหตุของความชรา อีกทั้งมีผลในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน สาเหตุของความหมองคล้ำ ฝ้า กระ และจุดด่างดำ (ประไพพิศ, 2561) ทำให้มีความน่าสนใจสำหรับนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งในงานวิจัยของวิไลศรีและคณะ (2562) ได้มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารออกฤทธิ์จากมะนาวไว้หลายสูตร และได้มีการรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่เรื่อง การแปรรูปมะนาวอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่า (วิไลศรี, 2562) การนำสูตรเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอด และศึกษาด้านสมบัติเพิ่มเติม น่าจะสามารถเพิ่มแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปมักมีการเติมแต่งสีเพื่อให้ชวนรับประทาน ซึ่งผู้ผลิตมักใช้สีสังเคราะห์เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง เนื่องจากสีสังเคราะห์ใช้ในปริมาณที่แน่นอนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้อาหารและเครื่องสำอางมีสีสดใสสวยงาม น่ารับประทาน ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติในการเติมแต่งสี เช่น สารสีจากดอกอัญชัน

ดอกอัญชันจัดเป็นสมุนไพร มีสีน้ำเงินเข้มหรือน้ำเงินอมม่วง สารสีจากดอกอัญชันคือสารแอนโทไซยานิน จัดเป็นสารประกอบฟีนอลิกมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น แก้อาการตาฟาง ตามัว ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก ดอกอัญชันนั้นยังช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด ช่วยขับปัสสาวะ และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ นอกจากนี้แอนโทไซยานินยังมีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันของไขมัน ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, ม.ป.ป.) การใช้ประโยชน์ของดอกอัญชัน เช่น ใช้สีจากกลีบดอกเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องสำอาง

ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เช่น ใช้ทำยาสระผมแก้ผมร่วง ดอกอัญชันกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับฮ่องกง ชาวฮ่องกงรู้จักเป็นอย่างดี เรียกดอกอัญชันว่า Blue Magic Water นำมาปรุงอาหารผสมกับ ข้าวเหนียวให้มีสีน้ำเงิน ทำเป็นเครื่องดื่ม เช่น ชาดอกอัญชัน หรือผสมกับมะนาวแล้วได้เป็นสีม่วง และนำมาผสมกับเค้กชนิดต่างๆ ดังนั้น ดอกอัญชันและผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชันจึงเป็นสินค้าจากประเทศไทยที่สามารถทำการขยายตลาดในต่างประเทศได้ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฮ่องกง, 2560)

ดอกอัญชันถูกนำมาใช้เป็นสีผสมอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด ด้วยคุณประโยชน์ของดอกอัญชันที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินประกอบกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมักใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ผสมลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจากรายงานของสยามรัฐออนไลน์ (2562) พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกอัญชันประสบปัญหาราคาดอกอัญชันแห้งตกต่ำในช่วงเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการแปรรูปดอกอัญชันให้อยู่ในรูปผงแห้งจะช่วยลดปริมาณผลผลิตล้นตลาดและสามารถเก็บรักษาได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกอัญชัน โดย Angkana et al. (2008) ศึกษาความคงตัวของสีจากดอกอัญชันโดยใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอย สกัดสีจากดอกอัญชันด้วยด้วยน้ำและปรับค่า pH เป็น 4 และ 7 และศึกษาสารห่อหุ้ม 2 ชนิด คือ ไฮดรอกซิล-โพรพิลเมทิล เซลลูโลส (hydroxylpropylmethyl cellulose) และเจลาตินโดยควบคุมให้มีปริมาณของแข็งในสารละลายเท่ากับ 5% จากนั้นนำไปทำแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิของลมร้อนเข้า 130 °C พบว่าสีจากดอกอัญชันที่มีเจลาตินเป็นสารห่อหุ้มมีความคงตัวมากกว่าการใช้ ไฮดรอกซิลโพรพิลเมทิล เซลลูโลสเป็นสารห่อหุ้ม

โดยในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติ จารุวรรณ และคณะ (2563) ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยการทำให้แห้งแบบพ่นฝอยเพื่อใช้แทนสีสังเคราะห์ สีผงที่ได้สามารถเก็บรักษาได้นาน นำไปใช้ผสมอาหารได้อย่างปลอดภัย มีขั้นตอนการผลิตสีผงจากดอกอัญชันเริ่มจากการสกัดสารสีจากดอกอัญชันสายพันธุ์ 7-1-16 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ ทำการสกัดด้วยสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 0.15 M สกัดที่อุณหภูมิ 60 °C นาน 30 นาที อัตราส่วนดอกอัญชันแห้ง:ตัวทำละลาย 1:50 (w/v) นำสารสกัดที่ได้ระเหยน้ำออกเพื่อให้สารสกัดมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้เท่ากับ 8 °B จากนั้นผสมมอลโทเดกซ์ทริน 20% โดยน้ำหนัก นำไปทำแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิลมร้อนเข้า 160 °C ได้สีผงเป็นสีชมพู มีความชื้น 4.31% ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี 0.255 ค่าสี $L^* a^*$ และ b^* เท่ากับ 57.36, 16.02 และ -2.69 ตามลำดับ ค่าการละลาย 98.71% ปริมาณแอนโทไซยานิน 40.02 mg cyanidin-3-glucoside/100 g สีผงที่ได้มีรสเปรี้ยวจึงเหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการรสเปรี้ยว

ดังนั้นการผลิตมะนาวผงสำหรับใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการผลิตสีผงจากดอกอัญชันสำหรับใช้เป็นสีผสมอาหาร เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเพื่อสุขภาพในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปใช้ทดแทนสารสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางได้หลากหลาย ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดปริมาณผลผลิตล้นตลาดในช่วงที่มีราคาตกต่ำ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การใช้มะนาวผงและสีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์อาหารนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคแล้ว คุณประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในมะนาวผงและสีผงจากดอกอัญชันมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งไม่มีในสารสังเคราะห์ สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษจากสารสังเคราะห์ลดลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวผงและสีผงจากดอกอัญชันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการวิจัย ณ กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากมะนาวเชิงพาณิชย์ และการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสืตอกอัญชันเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 4 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและโลชั่นผสมมะนาวผง ผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน โดยผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนมีส่วนประกอบของมะนาวผง 1.4% มีค่า pH 9.21 มีปริมาณจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก.เอส 13-2561 ผลิตภัณฑ์โลชั่นผสมมะนาวผง มีส่วนประกอบของมะนาวผง 1.5% ค่า pH 5.22 มีปริมาณจุลินทรีย์และความคงสภาพตามมาตรฐาน มอก.เอส 15-2561 โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ในกลุ่มอาสาสมัครผิวปกติจำนวน 22 คน ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีส่วนผสมคือ น้ำ 81.5% น้ำตาล 16% และสีผง 2.5% น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีปริมาณแอนโทไซยานิน 0.89 mg cyanidin-3-glucoside/100ml ผลิตภัณฑ์เยลลี่อัญชันมีส่วนผสมคือน้ำ 70.6% น้ำตาล 25.0% คาราจีแนน 1.9% และสีผง 2.5% เยลลี่อัญชันมีปริมาณแอนโทไซยานิน 1.16 mg cyanidin-3-glucoside/100g เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันที่อุณหภูมิ 4-8 °C เป็นเวลา 14 วัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีคุณภาพด้านจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้นำองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไปโดยบรรยายผ่าน Facebook live ในวันที่ 7 กันยายน 2564 และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังซิง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยจัดส่งชุดทดลองผลิตพร้อมคลิปวิดีโอขั้นตอนการผลิตไปให้ทดลองฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์

Abstract

Nowadays, consumer interest in healthy products has increased. This research project, therefore, studies the application of natural extracts in food and cosmetics and transfer knowledge to the general public and community enterprises for commercial production. The experiments were conducted at the Postharvest and Processing Research and Development Division between October 2020 to September 2021. This research project consists of 2 experiments, which are research and development to expand commercial lime products and research and development to expand products from commercial butterfly pea flowers. There are four products applied to the technology transfer, which are two types of cosmetic products, namely, soap bar and body lotion with lime powder. And, Two types of food products are ready-to-drink butterfly pea juice and butterfly pea jelly. The product of the soap bar contains 1.4% lime powder had a pH value of 9.21. the microbial qualities were in an acceptance of TISI 13-2561 standard. The body lotion contains 1.5% lime powder had pH 5.22, microbial counts, and stability were in an acceptance of TISI 15-2561 standards. Both products did not irritate the 22 normal-skin volunteers. The ready-to-drink butterfly pea juice had the optimized formula was, drinking water 81.5%, sugar 16.0%, and powder color from butterfly pea flowers 2.5%. There was a total anthocyanin content of 0.89 mg equivalent of cyanidin-3-glucoside /100 ml. The optimal formula to produce the jelly product was drinking water 70.6%, sugar 25.0%, carrageenan 1.9%, and powder color from butterfly pea flowers 2.5%. Jelly product expressed as total anthocyanin content 1.16 mg equivalent of cyanidin-3-glucoside/100 g. After both products storage at 4-8 degrees Celsius for 14 days, the microbial qualities of both products were in acceptance standard. The knowledge from two experiments that had conveyed to the general public by giving a lecture via Facebook live on September 7, 2021, and transferring technology to Ban Kanom Pang Khing community enterprises Ban Laem District, Phetchaburi province by delivering a production trial kit with Video clips of the production process to try and practice making products.

ระเบียบวิธีการวิจัย

การทดลองที่ 1 การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากมะนาวเชิงพาณิชย์

1. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะนาวหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ

2. ทดลองทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะนาวผง และวิเคราะห์คุณภาพ

2.1 เตรียมมะนาวผงและทดสอบคุณสมบัติของมะนาวผง

เตรียมมะนาวผง โดยตัดแปลงจากวิธีของวิไลศรี และคณะ (2562) โดยนำมะนาวพันธุ์แป้นล้างทำความสะอาด ผ่าแยกส่วนแกนและเมล็ด จากนั้นบีบน้ำเฉพาะส่วนน้ำมาเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงแยกกาก เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำน้ำมะนาวที่ได้ผสมกับมอลโทเดกซ์ตริน (DE 10-12) ในอัตราส่วน 80:20 โดยน้ำหนัก กวนให้เข้ากัน ด้วยเครื่องปั่นชนิดมือจับ จากนั้นนำมาทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบฉีดพ่นฝอย อุณหภูมิขาเข้า (Inlet temperature) 150 ± 2 °C อุณหภูมิขาออก (Outlet temperature) 80 ± 2 °C pump 7.75 mL/min air flow 3.9 m/s นำมะนาวผงทดสอบคุณสมบัติ ดังนี้

- ร้อยละของผลได้ (% yield)
- ปริมาณความชื้น ตามวิธีของ AOAC 984.25 (2012)
- ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี (water activity, a_w) ด้วยเครื่องวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตี
- ค่า pH ตามวิธีของ Suravanichnirachorn *et al.* (2018)
- นำตัวอย่างมะนาวผง 5 g ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 25 ml จากนั้นวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids) ด้วยเครื่อง hand refractometer
- ค่าสี ระบบ CIE ($L^* a^* b^*$) ด้วยเครื่องวัดสี
- ดัชนีการละลายน้ำ (water soluble index) ตามวิธีของ Jafari *et al.* (2017)

ตัวอย่างมะนาวผง 2.5 g ละลายน้ำกลั่น 30 ml vortex เป็นเวลา 1 นาที และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นไป centrifuge ที่ 3,500 rpm เป็นเวลา 20 นาที นำเฉพาะส่วนใสอบที่อุณหภูมิ 105 °C ชั่งน้ำหนักคงที่หลังอบ แล้วนำมาคำนวณค่าดัชนีการละลายน้ำ ดังสมการ

$$WSI = \frac{\text{Dried supernactant weight}}{\text{Initial weight}} \times 100$$

- ปริมาณกรดทั้งหมด ตามวิธีของ AOAC 942.15 (2012)
- ปริมาณวิตามินซี ด้วยวิธีการไทเทรตกับ 2,6-ไดคลอโรอินโดฟีโนล ตามวิธีของ AOAC 967.21 (2012) คำนวณเป็น mg/ 100g DW
- ปริมาณฟีนอลทั้งหมด สกัดตัวอย่างจากมะนาวผง ตัดแปลงจากวิธีของ Kim *et al.* (2016) และ Muthukumarasamy *et al.* (2018) โดยนำมะนาวผงสกัดด้วยเมทานอลความเข้มข้น 80% ในอัตราส่วน 1:10 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำส่วนใสมาวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-ciocalteu ตามวิธีของ Beato *et al.* (2010) คำนวณเป็น mg GAE/ 100g DW โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 0-100 mg/l
- ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ Saikia *et al.* (2014) คำนวณเป็น mg VCEAC/100g DW โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานวิตามินซี (L-ascorbic acid) ที่ความเข้มข้น 0-100 mg/l

- ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยวิธี Dopachrome โดยศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเช่ จำกัด คำนวณเป็นค่า IC₅₀ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก (kojic acid)
- ฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงเมลานิน (B16F10) โดยศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเช่ จำกัด

2.2 ทดลองการผลิตสบู่ก้อนผสมมะนาวผง

เตรียมสบู่ก้อนผสมมะนาวผง โดยนำเบสสบู่ใส 960 g หลอมให้ละลายที่อุณหภูมิ 75-80 °C โดยการให้ความร้อนผ่านน้ำ ทิ้งให้อุณหภูมิลดลงที่อุณหภูมิห้อง เมื่ออุณหภูมิเหลือประมาณ 60-65 °C เติมน้ำมันมะนาว 15 g ที่ละลายในน้ำกลั่น 15 ml คนให้เข้ากัน แล้วเติมสารกันเสีย Microcare PHC 6 g น้ำมันหอมระเหยผสมมะนาวเขียว และโรสแมรี่ในอัตราส่วน 3:2 ปริมาณ 5 g คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาเทลงแม่พิมพ์ซิลิโคน โดยคอยฉีดเอทานอลเพื่อไล่ฟอง ทิ้งให้แข็งตัวที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำมาห่อด้วยฟิล์มยึด จากนั้นนำมาวิเคราะห์คุณภาพดังนี้

- ค่าสี ในระบบ CIE Lab (L*a*b*)
- ค่า pH ตามวิธีของ Setiadi and Anindia (2018)
 - สบู่ 1 g ละลายในน้ำกลั่น 10 ml นำไปวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter
- ความคงตัวของฟอง (foam stability) ตามวิธีของ Setiadi and Anindia (2018)
 - สบู่ 1 g ละลายในน้ำ 5 ml จากนั้นเติมลงในกระบอกตัว 10 ml เขย่าด้วยเครื่องเขย่า (vortex) เป็นเวลา 1 นาที วัดความสูงของฟอง ณ เวลาที่ 30 วินาที และ 5 นาที นำมาคำนวณค่าความคงตัว (%) ดังสมการ

$$foam\ stability\ (\%) = \frac{foam\ height\ (mm)_{5\ min}}{foam\ height\ (mm)_{30s}} \times 100$$

- ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate count) ปริมาณยีสต์และราทั้งหมด (total yeast and mold count) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) แคนดิดา อัลบิแคนส์ (*Candida albicans*) และคลอสทริเดียม (*Clostridium* spp.)
- การระคายเคืองต่อผิวหนังด้วยวิธี single patch test ทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครผิวหนังปกติ (non sensitive skin) จำนวน 22 คน โดยนำแผ่นทดสอบที่มีตัวอย่างสบู่ความเข้มข้น 0.2% (w/v) แปะบริเวณแผ่นหลังของอาสาสมัครเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากแกะแผ่นทดสอบออก อ่านผลที่เวลา 30 นาที และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ ทำการทดสอบโดยบริษัทเดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด
- การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ด้วยวิธี 7 point hedonic scale จำนวนผู้ทดสอบ 30 คน

2.3 ทดลองการผลิตโลชั่นบำรุงผิวผสมมะนาวผง

ซึ่งส่วนผสมโลชั่นโดยแบ่งออกส่วนผสมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

เฟส A

น้ำกลั่น	71.4 %
กลีเซอรีน	4.0 %
แซนแทนกัม	0.4 %
EDTA2Na	0.2 %

เฟส B

น้ำมันรำข้าว	4.0 %
สเตียเรท-21	3.5 %
อัลคิลเบนโซเอต (C12-15)	3.0 %
ไอโซพarafilไมริสเตท	3.0 %
กลีเซอรอลมอนอสเตียเรท	2.0 %
เพนตะอิริทริทิล ไดสเตียเรท	1.0 %
เซเทอร์ล แอลกอฮอล์	0.5 %

เฟส C

น้ำกลั่น	3.0 %
มะนาวผง	1.5 %
พอฟิลินไกลคอล	1.0 %
สารกันเสีย (ไมโครแคร์ พีเอชซี)	0.8 %
ไตรเอทิลามีน	0.5 %
น้ำมันหอมระเหย	0.2 %

เตรียมส่วนผสมแต่ละเฟสแยกกัน ดังนี้

ส่วนผสมเฟส A เตรียมโดยผสมแซนแทนกัม และ EDTA2Na ลงในกลีเซอรีน คนให้ส่วนผสมกระจายตัว จากนั้นผสมน้ำกลั่นลงไป นำไปให้ความร้อนพร้อมคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

ส่วนผสมเฟส B เตรียมโดยนำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันแล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 °C จนส่วนผสมทั้งหมดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

ส่วนผสมเฟส C เตรียมโดย นำมะนาวผงผสมในน้ำกลั่น คนจนมะนาวผงละลาย จากนั้นเติม ไตรเอทิลามีนลงไป คนจนสารละลายทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับส่วนน้ำหอม เตรียมโดยนำน้ำมันหอมระเหย ผสมกับพอฟิลินไกลคอลคนให้เข้ากัน จากนั้นเก็บในภาชนะแก้วปิดสนิทจนกว่านำมาใช้งาน

การเตรียมโลชั่นผสมมะนาวผง ทำโดยนำส่วนผสมเฟส A และ เฟส B มาให้ความร้อนจนส่วนผสมเฟส A มีอุณหภูมิประมาณ 75 °C และส่วนผสมเฟส B มีอุณหภูมิประมาณ 70 °C จากนั้นผสมส่วนผสมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยนำส่วนผสมเฟส B ค่อย ๆ เทลงในส่วนผสมเฟส A พร้อมปั่นด้วยเครื่องปั่นชนิดมือถือจับ จนส่วนผสมทั้ง 2 ส่วนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งให้ส่วนผสมทั้งหมดอุณหภูมิลดลงที่อุณหภูมิห้อง จนส่วนผสมมีอุณหภูมิ 45 °C นำส่วนผสมเฟส C ได้แก่ ส่วนมะนาวผง ส่วนน้ำมันหอมระเหย และสารกันเสีย (Microcare PHC) ผสมลงไป คนให้เข้ากัน ทิ้งให้เซตตัวประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นบรรจุในภาชนะบรรจุ และนำไปวิเคราะห์คุณภาพดังนี้

- ค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter
- ค่าสี ในระบบ CIE Lab ($L^*a^*b^*$)
- ความคงสภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส ผลิตภัณฑ์ทำบำรุงผิว (มอก. เอส 15-2561) โดยนำตัวอย่างโลชั่นที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เก็บที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บที่อุณหภูมิ 45 ± 2 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำซ้ำจนกว่าจะครบ 4 รอบ นำตัวอย่างทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำไปตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ ค่าสี และ pH เปรียบเทียบกับคุณภาพเดิมของผลิตภัณฑ์
- ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate count) ปริมาณยีสต์และราทั้งหมด (total yeast and mold count) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) แคนดิดา อัลบิแคนส์ (*Candida albicans*) และคลอสทริเดียม (*Clostridium* spp.)
- การระคายเคืองต่อผิวหนังด้วยวิธี single patch test ทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครผิวปกติ จำนวน 22 คน โดยนำแผ่นทดสอบที่มีตัวอย่างโลชั่นแปลงบริเวณแผ่นหลังของอาสาสมัครเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากแกะแผ่นทดสอบออก อ่านผลที่เวลา 30 นาที และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ ทำการทดสอบโดยบริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด
- การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ด้วยวิธี 7-point hedonic scale จำนวนผู้ทดสอบ 30 คน

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3.1 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จัดเตรียมสื่อวีดีโอแสดงกระบวนการผลิต ข้อมูลวิธีการผลิต และส่วนผสมสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่อ่อนผสมมะนาวผง และโลชั่นผสมมะนาวผง ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี เพื่อทดลองผลิตจริง และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทดลองผลิตมาวิเคราะห์คุณภาพ ดังต่อไปนี้

- สบู่อ่อนผสมมะนาวผง : pH ความคงตัวของฟอง และค่าสี
- โลชั่นผสมมะนาวผง : pH ค่าสี ความคงสภาพ

4. ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รับการถ่ายทอด

ทำแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 7-point hedonic scale ผู้ทดสอบเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง จำนวน 10 คน

5. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์สบู่อ่อนและโลชั่นผสมมะนาวผงในระดับห้องปฏิบัติการ

การทดลองที่ 2 การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสีดอกอัญชันเชิงพาณิชย์

1. การผลิตสีผงจากดอกอัญชัน

ทำการสกัดสารสีจากดอกอัญชันแห้งด้วยสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 0.15 M สกัดที่อุณหภูมิ 60 °C นาน 30 นาที อัตราส่วนดอกอัญชันแห้ง:ตัวทำละลาย 1:50 (w/v) นำสารสกัดที่ได้ระเหยน้ำออกเพื่อให้สารสกัดมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้เท่ากับ 8 °B จากนั้นผสมมอลโทเดกซ์ทริน 20% โดยน้ำหนัก นำไปทำแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิม้วนเข้า 160 °C

2. ศึกษาการประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน

2.1 ศึกษาการประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม โดยแปรระดับปริมาณสีผงจากดอกอัญชัน 6 ระดับ วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ มี 6 กรรมวิธี ได้แก่

- กรรมวิธีที่ 1 ปริมาณสีผง 0.5%
- กรรมวิธีที่ 2 ปริมาณสีผง 1.0%
- กรรมวิธีที่ 3 ปริมาณสีผง 1.5%
- กรรมวิธีที่ 4 ปริมาณสีผง 2.0%
- กรรมวิธีที่ 5 ปริมาณสีผง 2.5%
- กรรมวิธีที่ 6 ปริมาณสีผง 3.0%

มีขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผสมน้ำตาลและสีผงให้เข้ากัน ตั้งน้ำโดยใช้ไฟปานกลาง เมื่อน้ำอุ่นใส่ส่วนผสมลงไป คนให้ละลาย ฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 85 °C นาน 3 นาที บรรจุขวดขณะร้อน ทำการหล่อเย็นด้วยน้ำสะอาด ตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่

- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ วัดด้วยเครื่อง hand refractometer
- ค่าสี วัดด้วยระบบ CIE L*a*b* ด้วยเครื่องเครื่องวัดสี (Minolta CR 400)
- ค่า pH วัดด้วย pH-meter
- ปริมาณแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH-differential (Giusti and Wrolstad, 2005)
- สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ด้วยวิธี total phenols assay (Kim *et al*, 2003)
- ความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Kim *et al*, 2002)
- ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี hedonic scale (7 point) กำหนดคะแนน 1= ไม่ชอบมาก

2 = ไม่ชอบปานกลาง 3 = ไม่ชอบเล็กน้อย 4 = เฉยๆ 5 = ชอบเล็กน้อย 6 = ชอบปานกลาง และ 7 = ชอบมาก โดยใช้จำนวนผู้ทดสอบ 20 คน เพื่อคัดเลือกสูตรน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่เหมาะสม

ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ มี 8 กรรมวิธี ได้แก่

- กรรมวิธีที่ 1 อายุการเก็บรักษา 0 วัน
- กรรมวิธีที่ 2 อายุการเก็บรักษา 2 วัน
- กรรมวิธีที่ 3 อายุการเก็บรักษา 4 วัน
- กรรมวิธีที่ 4 อายุการเก็บรักษา 6 วัน
- กรรมวิธีที่ 5 อายุการเก็บรักษา 8 วัน
- กรรมวิธีที่ 6 อายุการเก็บรักษา 10 วัน
- กรรมวิธีที่ 7 อายุการเก็บรักษา 12 วัน
- กรรมวิธีที่ 8 อายุการเก็บรักษา 14 วัน

ทำการผลิตน้ำอัญชันพร้อมดื่มตามสูตรที่เหมาะสม เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4-8 °C เป็นระยะเวลา 14 วัน สุ่มตัวอย่างทุก 2 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่

- ค่าสี
- ค่า pH
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ
- ปริมาณแอนโทไซยานิน
- สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

- ความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
- คุณภาพด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate count, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, Coliforms, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp. และ Yeasts and Molds ทำการทดสอบโดยบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด

2.2 ศึกษาการประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์เยลลี่ ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่ ตามสูตรของ จารุวรรณ และคณะ (2563) โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย น้ำ 70.6% น้ำตาล 25.0% คาราจีแนน 1.9% และสีผง 2.5% โดยน้ำหนัก ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผสมน้ำตาล สีผง และคาราจีแนน ให้เข้ากันเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน ตั้งน้ำโดยใช้ไฟปานกลาง พอน้ำอุ่นให้ใส่ส่วนผสมลงไป คนตลอดเวลา โดยใช้ไฟปานกลางฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 85 °C นาน 3 นาที เทใส่ภาชนะ

ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เยลลี่ วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ มี 8 กรรมวิธี ได้แก่

- กรรมวิธีที่ 1 อายุการเก็บรักษา 0 วัน
- กรรมวิธีที่ 2 อายุการเก็บรักษา 2 วัน
- กรรมวิธีที่ 3 อายุการเก็บรักษา 4 วัน
- กรรมวิธีที่ 4 อายุการเก็บรักษา 6 วัน
- กรรมวิธีที่ 5 อายุการเก็บรักษา 8 วัน
- กรรมวิธีที่ 6 อายุการเก็บรักษา 10 วัน
- กรรมวิธีที่ 7 อายุการเก็บรักษา 12 วัน
- กรรมวิธีที่ 8 อายุการเก็บรักษา 14 วัน

ทำการผลิตเยลลี่อัญชัน เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4-8 °C เป็นระยะเวลา 14 วัน สุ่มตัวอย่างทุก 2 วัน เพื่อตรวจคุณภาพ ได้แก่

- ค่าสี
- ค่า pH
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ
- ปริมาณแอนโทไซยานิน
- สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
- ความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
- คุณภาพด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate count, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* และ Yeasts and Molds ทำการทดสอบโดยบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด

2.3 คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันในระดับห้องปฏิบัติการ

3. ทำการขยายผลผลิตภัณฑ์จากสีดอกอัญชันเชิงพาณิชย์

3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสีดอกอัญชัน

3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง จ. เพชรบุรี โดยจัดทำคลิปวิดีโอขั้นตอนการผลิตรวมทั้งข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมชุดทดลองผลิต จัดส่งไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อทดลองผลิตจริง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การทดลองที่ 1 การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากมะนาวเชิงพาณิชย์

1. การติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นผู้มีความสนใจเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะนาวผง

2. การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะนาวผง และวิเคราะห์คุณภาพ

2.1 การเตรียมมะนาวผงและทดสอบคุณภาพ

การผลิตมะนาวผงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยจากน้ำมะนาวพันธุ์แป้นมีผลผลิตที่ได้ 13.27% ลักษณะปรากฏเป็นผงแห้ง สีขาวครีม ดัง Figure 1 มีสมบัติทางกายภาพดังแสดงใน Table 1 คือ มีค่าสี $L^* 50.3$ $a^* -0.2$ และ $b^* 4.6$ ความชื้น 2.5% ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี 0.15 และค่า pH 2.50



Figure 1 The appearance of lime powder

Table 1 Physical properties of lime powder

Properties	Results
Yield	13.27 ±0.14 %
Moisture	2.97 ±0.40 %
aw	0.15 ±0.02
pH	2.50 ±0.01
Total soluble solids	16.52 ±0.27 °Brix
Water-soluble index	89.95 ±0.56
Color	
L^*	50.3 ±0.3
a^*	-0.2 ±0.1
b^*	4.6 ±0.4

สำหรับสารสำคัญและสมบัติทางเคมีของมะนาวผง จากการศึกษพบว่ามะนาวผงมีองค์ประกอบของกรดทั้งหมด 20.32% ของมะนาวผง มีปริมาณวิตามินซีทั้งหมด 19.25 mg/100gDW และมีปริมาณฟีนอลทั้งหมด 82.26 mg GAE/100gDW ดังแสดงใน Table 2 สำหรับสมบัติของมะนาวผง จากการศึกษพบว่ามะนาวผงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 31.74 mgVCEAC/ 100gDW และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์

ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกลไกการสร้างเม็ดสีเมลานินของผิวหนัง (ประไพพิศ, 2561) โดยมีค่าความเข้มข้นที่ทำให้การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง 50% (IC_{50}) เท่ากับ 3.52 mg/ml คิดเป็น 0.037 เท่าของค่า IC_{50} ของกรดโคจิก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.02 mg/ml สอดคล้องกับผลการทดสอบฤทธิ์ของมะนาวผงต่อเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงเมลาโนมา (B16F10) ซึ่งพบว่ามะนาวผงที่ความเข้มข้น 1 mg/ml สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ 32.91% และการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ 45.45% น้อยกว่าสารมาตรฐานกรดโคจิกซึ่งสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงเมลาโนมาเท่ากับ 82.30 และ 76.91% ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml (Table 2) โดยสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของมะนาวผงและสมบัติในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินนั้น น่าจะเป็นผลมาจากองค์ประกอบของวิตามินซีและสารประกอบฟีนอลของมะนาวผง ซึ่งสารทั้งสองกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ในการดักจับอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการดักจับโลหะทำให้สามารถจับกับหมู่คอปเปอร์ภายในเอนไซม์ไทโรซิเนสทำให้เอนไซม์เกิดความเสถียร แรงปฏิกิริยาในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินไม่ได้ (ประไพพิศ, 2561) นอกจากนี้มะนาวผงยังมีองค์ประกอบของกรดซิตริก ซึ่งเป็นกรดในกลุ่มของแอลฟาไฮดรอกซีซึ่งมีฤทธิ์ในการเร่งผลัดเซลล์ผิวหนัง ส่งผลให้ สิวมีแนวโน้มลดลง รอยดำและสีผิวส่วนที่เข้มจากเม็ดสีเมลานินจางลง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่อีกด้วย (Babilas *et al.*, 2012) มะนาวผงจึงมีความน่าสนใจสำหรับนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางกลุ่มช่วยปรับปรุงสีผิว

Table 2 Phytochemical and chemical properties of lime powder

Properties		Results
Total acid	20.32 ±163	%
Total vitamin C	19.25 ±2.05	mg/100 g DW
Total phenol compound	82.26 ±4.19	mgGAE/ 100 g DW
Antiradical scavenging DPPH	31.74 ±3.18	mgVCEAC/ 100 g DW
Antityrosinase activity	3.52 ±0.02	mg/ml
	(IC_{50} of kojic acid =0.02	mg/ml)
Biological activities on B16F10 melanoma cells		
- Tyrosinase inhibition	32.91 ±7.59	% at 1 mg/ml
	(Kojic acid =82.30 ±8.52	% at 1 mg/ml)
- Melanosis inhibition	45.45 ±5.78	% at 1 mg/ml
	(Kojic acid =77.91±0.05	% at 1 mg/ml)

2.2 การทดลองผลิตสบู่อ่อนผสมมะนาวผง

สบู่อ่อนผสมมะนาวผงปริมาณ 1.4% ซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของค่า IC_{50} ของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของมะนาวผง โดยสบู่อ่อนผสมมะนาวผงที่ได้มีลักษณะก้อนใส สีเหลืองอ่อน ดัง Figure 2



Figure 2 Soap bars containing lime powder

สบู่ก้อนที่ได้มีค่าสี $L^* 41.88$ $a^* -1.11$ $b^* 9.54$ ความคงตัวของฟองในเวลา 5 นาที เท่ากับ 97.11% และมีค่า pH 9.21 อยู่ในช่วง pH 8-10 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับสบู่ (พิมพร, 2544) สำหรับปริมาณจุลินทรีย์ของสบู่ก้อนผสมมะนาวพบว่ามีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสมสมุนไพร คือ ปริมาณแบคทีเรีย ยีสต์ และราทั้งหมด ไม่เกิน 10^3 CFU/g (ค่าทดสอบมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 10 CFU/g และปริมาณยีสต์และราทั้งหมด น้อยกว่า 10 CFU/g) และไม่พบเชื้อ ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส แคนดิดา อัลบิแคนส์ และคลอสตริเดียม (มอก. เอส 13-2561) ดังแสดงใน Table 3 และจากการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัครกลุ่มผิวปกติ จำนวน 22 คน ด้วยวิธี single patch test พบว่าไม่เกิดการระคายเคืองในกลุ่มอาสาสมัคร

Table 3 Properties of soap bar with lime powder

Properties	Results	Limitation following TISI-S 13-2561
pH	9.21 ± 0.02	-
Foam ability	97.11 ± 2.46 %	-
Color		
L^*	41.88 ± 1.37	-
a^*	-1.11 ± 0.07	-
b^*	9.54 ± 0.64	-
Microbiology		
Total plate count	<10	< 10^3 CFU/g
Yeast and mold count	<10	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Candida albicans</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Clostridium</i> spp.	Not Detected	Not Detected

สำหรับการยอมรับของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมมะนาวพบว่ามีกลุ่มผู้ทดสอบจำนวน 30 คน มีความชอบเล็กน้อยต่อกลิ่น สี ปริมาณฟอง และความชุ่มชื้นต่อผิว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.33 5.80 5.63 และ 5.77 คะแนนตามลำดับ ขณะที่มีความชอบปานกลางต่อความรู้สึกสะอาด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.03 คะแนน ดังแสดงใน Table 4

Table 4 Acceptance scores of soap bar with lime powder

Characteristic	Scores
Color	5.80 ±1.00
Scent	5.33 ±1.12
Foam	5.63 ±0.93
Clean feeling after use	6.03 ±0.85
Moisturizing after use	5.77 ±0.97

2.3 การทดลองผลิตโลชั่นผสมมะนาวผง

โลชั่นผสมมะนาวผงปริมาณ 1.5% ซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของค่า IC_{50} ของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ไทโรซิเนสของมะนาวผง โดยโลชั่นผสมมะนาวผงที่ได้มีลักษณะเป็นอิมัลชันสีขาวครีม ดังแสดงใน Figure 3



Figure 3 Body lotion containing lime powder

โดยโลชั่นผสมมะนาวผงมีค่าสี $L^* 44.43$ $a^* -0.58$ $b^* 1.47$ มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพรกำหนด คือ มีค่า pH เฉลี่ยที่ 5.22 อยู่ในช่วงที่มาตรฐานกำหนด คือ 3.5-7.5 และมีความคงสภาพไม่เกิดการแยกชั้นเมื่อทดสอบที่สภาวะอุณหภูมิ 4 °C สลับกับอุณหภูมิ 45 °C เป็นเวลา 4 รอบ รวมถึงมีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ปริมาณแบคทีเรีย ยีสต์ และราทั้งหมด ไม่เกิน 10^3 CFU/g (ค่าทดสอบมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 10 CFU/g และปริมาณยีสต์และราทั้งหมด น้อยกว่า 10 CFU/g) และไม่พบเชื้อ ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส แคนดิดา อัลบิแคนส์ และคลอสทริเดียม (มอก. เอส 15-2561) ดังแสดงใน Table 5 และจากการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัครกลุ่มผิวปกติ จำนวน 22 คน ด้วยวิธี single patch test พบว่าไม่เกิดการระคายเคืองในกลุ่มอาสาสมัคร

Table 5 Properties of body lotion with lime powder

Properties	Results	Limitation following TISI-S 15-2561
pH	5.22 ±0.03	5.0-8.0
Color		
L*	44.43 ±0.09	-
a*	-0.58 ±0.03	-
b*	1.47 ±0.04	-
Freeze and Thaw (4 cycles)	homogeneous	homogeneous
Microbiology		
Total plate count	<10 CFU/g	< 10 ³ CFU/g
Yeast and mold count	<10 CFU/g	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Candida albicans</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Not Detected	Not Detected
<i>Clostridium</i> spp.	Not Detected	Not Detected

สำหรับการยอมรับของผลิตภัณฑ์โลชั่นผสมมะนาวผง พบว่ากลุ่มผู้ทดสอบจำนวน 30 คน มีความชอบเล็กน้อยต่อความหนืด ความเหนอะหนะ กลิ่นหลังทา การซึมสูผิว และความชุ่มชื้นหลังทา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.13 5.04 5.42 5.83 และ 5.79 คะแนน ตามลำดับ ขณะที่มีความชอบปานกลางต่อสีของโลชั่น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.29 คะแนน ดังแสดงใน Table 6

Table 6 Acceptance scores of body lotion with lime powder

Characteristic	Scores
Color	6.29 ±0.69
Consistency	5.13 ±0.97
Absorption into skin	5.83 ±1.07
Stickiness	5.04±1.40
Skin scent after use	5.42 ±1.27
Moisturizing after use	5.79 ±0.74

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไป และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ได้มีการบรรยายผ่านทาง Facebook live ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้มะนาวผงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (เอกสารประกอบการบรรยายตามภาคผนวก ก) มีผู้เข้าร่วมฟังจำนวน 20 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกลับมาจำนวน 16 คน คิดเป็น 80% ของผู้เข้าฟังบรรยายทั้งหมด จากแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 93.75% พอใจมาก และ 6.25% พอใจ ต่อการบรรยายในครั้งนี้

สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้จัดส่งชุดทดลองผลิตสบู่ก้อนผสมมะนาวผงและโลชั่นผสมมะนาวผง พร้อมคลิปวิดีโอขั้นตอนการผลิต ไปให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ทดลองผลิตจริง โดยโลชั่นผสมมะนาวผงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผสมเฟส A (ส่วนน้ำ) และเฟส B (ส่วนน้ำมัน) เข้าด้วยกัน จากเดิมใช้เครื่องปั่นชนิดมือจับตีผสม 2 นาที เป็นการใช้ไม้พายกวนผสมเป็นเวลา 20 นาทีแทน ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปังขิง สามารถผลิตสบู่ก้อนผสมมะนาวผงและโลชั่นผสมมะนาวผงได้ ดังแสดงใน Figure 4



Figure 4 Production of soap bars (A) and body lotion (B) with lime powder by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

โดยสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีครั้งนี้มีจำนวน 10 คน มีความพึงพอใจมาก 70% และมีความพึงพอใจ 30% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจผลิตได้ มีสมบัติแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบเล็กน้อย ดังแสดงใน Table 7 และ Table 8 ในส่วนของโลชั่นพบว่าไม่เกิดการแยกชั้น เมื่อทดสอบความคงสภาพที่สภาวะอุณหภูมิต่ำสลับสูงเป็นเวลา 4 รอบ ตามเกณฑ์ที่ มอก. เอส 15-2561 กำหนด

Table 7 Properties of soap bar with lime powder produced by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

Properties	Results
pH	9.37 ± 0.03
Foam ability	99.09 ± 1.29
Color	
L*	37.60 ± 0.46
a*	0.10 ± 0.1
b*	9.03 ± 0.40

Table 8 Properties of body lotion with lime powder produced by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

Properties	Results
pH	4.87 ± 0.06
Color	
L*	42.20 ± 0.06
a*	-0.60 ± 0.10
b*	1.50 ± 0.26
Freeze and Thaw (4 cycles)	homogeneous

4. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รับการถ่ายทอด

ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมมะนาวผงและโลชั่นผสมมะนาวผง แสดงใน Table 9 และ Table 10 โดยพบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบึงซึ่งมีความชอบปานกลางต่อสี กลิ่น ปริมาณฟอง ความรู้สึกสะอาด และความชุ่มชื้นต่อผิวของสบู่ผสมมะนาวผง โดยให้คะแนน 6.20 6.40 6.30 6.40 และ 6.40 คะแนน ตามลำดับ สำหรับโลชั่นผสมมะนาวผง สมาชิกของกลุ่มมีความรู้สึกชอบเล็กน้อยต่อสี ความหนืด และการซึ่มสูผิว โดยให้คะแนน 5.70 5.10 และ 5.20 คะแนน ตามลำดับ และมีความรู้สึกชอบปานกลางต่อกลิ่นหลังทา และความชุ่มชื้นหลังทา โดยให้คะแนน 6.10 และ 6.00 ขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆ ต่อความเหนอะหนะของเนื้อโลชั่น โดยให้คะแนน 4.90 คะแนน

Table 9 Acceptance scores of soap bar with lime powder after production by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

Characteristic	Scores
Color	6.20 ± 1.42
Scent	6.40 ± 1.32
Foam	6.30 ± 1.40
Clean feeling after use	6.40 ± 1.33
Moisturizing after use	6.40 ± 1.38

Table 10 Acceptance scores of body lotion with lime powder after production by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

Characteristic	Scores
Color	5.70 ±1.52
Consistency	5.10 ±1.35
Absorption into skin	5.20 ±1.52
Stickiness	4.90 ±1.56
Skin scent after use	6.10 ±1.52
Moisturizing after use	6.00 ±1.34

5. ต้นทุนการผลิต

มะนาวผง มีต้นทุนวัตถุดิบ 680.77 บาทต่อกิโลกรัม โดยคิดจากมะนาวพันธุ์แป้นราคา กิโลกรัมละ 25 บาท (เมื่อนำมาคั้นน้ำจะได้น้ำมะนาวประมาณ 270 g) และมอลโทเดกซ์ทรีน ราคา กิโลกรัมละ 70 บาท เมื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมมะนาวผงจะมีต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่รวมต้นทุนบรรจุภัณฑ์และพลังงานการผลิตดังนี้

5.1 สบู่ก้อนผสมมะนาวผง มีต้นทุนการผลิตก้อนละ 7.78 บาท ต่อสบู่ขนาด 50 g โดยคำนวณจากต้นทุนวัตถุดิบ ดังนี้

	ราคาต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)	ปริมาณที่ใช้ (g) (ผลิตได้ 18 ก้อน)	ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท)
เบสสบู่สำเร็จรูป	125	960	120
น้ำกลั่น	18	15	0.27
มะนาวผง	680.77	14	6.15
ไมโครแคร์ พีเอชซี	1025	6	9.53
น้ำมันหอมระเหย	800	5	4.00

5.2 โลชันผสมมะนาวผง มีต้นทุนการผลิต 87 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถบรรจุขวด 120 ml ได้ 8 ขวด หรือบรรจุขวด 250 ml ได้ 4 ขวด โดยคำนวณจากต้นทุนวัตถุดิบ ดังนี้

ส่วนผสม	ราคาต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)	ปริมาณที่ใช้ (g)	ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท)
น้ำกลั่น	18	714	12.65
กลีเซอรีน	74	40	2.92
แซนแทนกัม	156	40	0.62
EDTA2Na	340	2	0.67
น้ำมันรำข้าว	68	40	2.7
สเตียเรท-21	350	35	12.01
อัลคิลเบนโซเอต (C12-15)	370	30	11.07
ไอโซพริลไมริสเทท	270	30	8.10
กลีเซอรอลมอนอสเตียเรท	140	20	2.76
เพนตะอริทริทอล ไดสเตียเรท	990	10	9.90
เซเทอริล แอลกอฮอล์	105	5	0.52
มะนาวผง	680.77	15	10.21
พอร์พิลีนไกลคอล	140	10	1.39
ไมโครแคร์ พีเอชซี	1025	8	8.19
ไตรเอทิลามีน	100	5	0.50
น้ำมันหอมระเหย	800	2	1.60

การทดลองที่ 2 การวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสีดอกอัญชันเชิงพาณิชย์

1. การผลิตสีผงจากดอกอัญชัน

สีผงจากดอกอัญชันที่ผลิตได้มีคุณภาพดังนี้ ความชื้น 4.31% ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี 0.22 ค่า pH 2.26 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 10.3 °B ค่าการละลาย 98.71 % ค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 57.36, 16.02 และ -2.69 ตามลำดับ ปริมาณแอนโทไซยานิน 40.20 mg cyanidin-3-glucoside/100g สีผงที่ได้มีลักษณะเป็นผงสีชมพู มีรสเปรี้ยว ดัง Figure 5



Figure 5 The appearance of butterfly pea powder

2. การประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน

2.1 การประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ได้มีสีม่วง (Figure 6) มีคุณภาพดัง Table 11 พบว่า การใส่สีผงปริมาณมากขึ้นมีผลทำให้น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีสีเข้มขึ้นสังเกตได้จากค่า C* (ความสด) มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าสี L* (ความสว่าง) มีค่าลดลง ในขณะที่การใส่สีผงปริมาณมากขึ้น มีผลทำให้ pH มีค่าลดลงเนื่องจากในสีผงมีกรดซิตริกเป็นส่วนประกอบเพราะสกัดด้วยสารละลายกรดซิตริก สำหรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของน้ำอัญชันพร้อมดื่มมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 24.03 ถึง 25.40 นอกจากนี้การใส่สีผงปริมาณมากขึ้นยังมีผลให้น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีปริมาณสารสำคัญเพิ่มขึ้น โดยน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 3.0% มีปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุดแต่ไม่แตกต่าง ($p>0.05$) กับน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 2.5 และ 2.0% นอกจากนี้ น้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 3.0% มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ มากที่สุด ($p\leq 0.05$)



Figure 6 The appearance of ready to drink juice products in different butterfly pea powder (0.0-3.0%)

Table 11 Quality of ready to drink juice products in different butterfly pea powder (0.5-3.0%)

Qualities	Butterfly pea powder (%)					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
total soluble solid (°B)	24.03	24.10	24.73	24.50	25.40	25.20
pH	3.19	2.95	2.90	2.83	2.77	2.75
color value L*	28.32	27.31	26.59	25.81	25.49	25.18
a*	5.15	6.15	6.66	6.77	6.76	6.84
b*	-4.94	-5.04	-5.04	-5.03	-4.99	-5.04
C*	7.13	7.95	8.35	8.43	8.40	8.50
h*	316.18	320.69	322.86	323.42	323.59	323.58
anthocyanin content (mg cyanidin-3-glucoside/100 g)	0.07 c	0.22 bc	0.31 b	0.56 a	0.54 a	0.66 a
total phenolic compound (mg GAE/100 g)	3.59 f	6.40 e	9.09 d	11.14 c	13.94 b	16.41 a
antioxidant capacity by DPPH (mg VCEAC/100 g)	1.97 f	3.15 e	4.16 d	4.98 c	5.84 b	6.16 a

In a row, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level

การทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม (Table 12) พบว่าน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 2.5 และ 3.0% มีคะแนนความชอบในทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาคะแนนความชอบด้านรสชาติและความชอบโดยรวม พบว่า น้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 2.5% มีคะแนนมากกว่าน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่ใส่สีผง 3.0% และผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะว่าการใส่สีผง 3.0% มีรสชาติเปรี้ยวมากเกินไป ดังนั้นจึงเลือกสูตรที่ใส่สีผง 2.5% เป็นสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม

Table 12 Sensory evaluation of ready to drink juice products in different butterfly pea powder (0.5-3.0%)

Butterfly pea powder (%)	Sensory evaluation				
	appearance	color	flavor	taste	overall
0.5	3.15 d	2.90 d	4.05 c	3.50 c	3.35 e
1.0	4.10 c	3.95 c	4.10 c	4.05 c	4.00 d
1.5	5.00 b	5.00 b	4.45 bc	4.80 b	4.55 cd
2.0	5.40 b	5.70 a	4.65 b	5.10 b	5.15 bc
2.5	6.05 a	6.10 a	5.20 a	5.70 a	5.85 a
3.0	6.00 a	6.15 a	5.35 a	5.25 ab	5.30 ab

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม (สีผง 2.5%) มีลักษณะปรากฏดัง Figure 7 และมีคุณภาพดัง Table 13 กล่าวคือ น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านสี เมื่อพิจารณาจากค่าความแตกต่างของสีโดยรวมระหว่างตัวอย่างกับตัวอย่างมาตรฐาน (ΔE) ถ้า ΔE มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 2.3 ถือว่าตัวอย่างมีความแตกต่างกับตัวอย่างมาตรฐาน (Sharma, 2003) พบว่า ที่อายุการเก็บรักษา 2-10 วัน มีค่า ΔE น้อยกว่า 2.3 แสดงว่าสีของน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่อายุการเก็บรักษา 2-10 วัน ไม่แตกต่างกับน้ำอัญชันพร้อมดื่มเริ่มต้น (0 วัน) เมื่อเก็บรักษานานตั้งแต่ 12 วัน ขึ้นไป พบว่า ΔE มีค่ามากกว่า 2.3 แสดงว่าสีของน้ำอัญชันพร้อมดื่มมีค่าแตกต่างกับสีของน้ำอัญชันพร้อมดื่มเริ่มต้น ค่า pH ของน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่อายุการเก็บรักษา 0-14 วัน มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 2.98 ถึง 3.05 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำอยู่ในช่วง 19.47 ถึง 20.50 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารสำคัญ พบว่าน้ำอัญชันพร้อมดื่มที่เก็บรักษา 2-14 วัน มีปริมาณแอนโทไซยานิน ลดลงแตกต่าง ($p \leq 0.05$) กับน้ำอัญชันพร้อมดื่มเริ่มต้น น้ำอัญชันพร้อมดื่มที่เก็บรักษา 4-14 วัน มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถต้านอนุมูลอิสระแตกต่าง ($p \leq 0.05$) กับน้ำอัญชันพร้อมดื่มเริ่มต้น สำหรับคุณภาพด้านจุลินทรีย์ พบว่าการเก็บรักษา น้ำอัญชันพร้อมดื่มที่อุณหภูมิ 4-8 °C เป็นเวลา 14 วัน มีปริมาณจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มพช. 533/2554 น้ำดอกอัญชัน



Figure 7 The appearance of ready to drink juice product was kept at 4-8 °C for 14 days

Table 13 The quality of ready to drink butterfly pea juice product was kept at 4-8 °C for 14 days

Qualities	Shelf life (Day)								Reference standard*	
	0	2	4	6	8	10	12	14		
Color	L*	25.49	25.99	25.85	25.80	25.70	25.84	24.58	24.57	
	a*	6.64	6.96	6.40	6.17	6.80	6.70	5.53	5.46	
	b*	-7.34	-7.63	-7.40	-7.52	-7.63	-7.81	-4.16	-4.10	
	Δ E	0.00	0.67	0.44	0.59	0.39	0.58	3.49	3.57	
	pH	3.05	2.99	2.99	3.00	3.02	3.00	2.95	2.98	
	total soluble solid (°B)	19.47	20.00	20.20	20.17	20.50	20.30	20.13	20.03	
	anthocyanin content (mg cyanidin-3-glucoside/100 g)	0.89 a	0.72 b	0.73 b	0.74 b	0.68 b	0.68 b	0.68 b	0.68 b	
	total phenolic compound (mg GAE/100 g)	23.46 a	22.99 ab	22.73 bc	22.35 cd	21.93 de	21.61 eg	21.18 f	16.37 g	
	antioxidant capacity by DPPH (mg VCEAC/100 g)	8.46 a	8.08 ab	7.96 bc	7.62 cd	7.47 d	7.28 de	7.05 e	6.33 f	
	Total Plate count (CFU/ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤1 × 10 ⁴
	<i>Bacillus cereus</i> (CFU/ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤100
	<i>Clostridium perfringens</i> (CFU/ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤100
	Coliforms (MPN/100 ml)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<2.2
	<i>Escherichia coli</i> (per 100 ml)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Listeria monocytogenes</i> (per 25 ml)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<10
	<i>Salmonella</i> spp. (per 25g)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Yeasts and Molds (CFU/ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤100

In a row, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT

ND = Not Detected

* Thai community product standard 533/2554 butterfly pea drink

2.2 การประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์เยลลี่ ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่และตรวจคุณภาพระหว่างเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์เยลลี่มีลักษณะเป็นเจลกึ่งแข็งสีม่วง มีลักษณะปรากฏดัง Figure 8 และมีคุณภาพดัง Table 14 พบว่า เยลลี่อัญชันที่เก็บรักษา 2-14 วัน มีค่า ΔE น้อยกว่า 2.3 แสดงว่าสีของเยลลี่อัญชันที่เก็บรักษา 2-14 วันไม่แตกต่างกับสีของเยลลี่อัญชันเริ่มต้น (0 วัน) ค่า pH ของเยลลี่อัญชันที่อายุการเก็บรักษา 0-14 วัน มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 3.07 ถึง 3.14 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำอยู่ในช่วง 31.30 ถึง 31.87 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารสำคัญ พบว่า เยลลี่อัญชันที่เก็บรักษา 10-14 วัน มีปริมาณแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลงแตกต่าง ($p \leq 0.05$) กับเยลลี่อัญชันเริ่มต้น เยลลี่อัญชันที่เก็บรักษา 4-14 วัน มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระแตกต่าง ($p \leq 0.05$) กับเยลลี่อัญชันเริ่มต้น สำหรับคุณภาพด้านจุลินทรีย์ พบว่าการเก็บรักษาเยลลี่อัญชันที่อุณหภูมิ 4-8 °C เป็นเวลา 14 วัน มีปริมาณจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มพช. 519/2547 เยลลี่อ่อน




Figure 8 The appearance of butterfly pea jelly product was kept at 4-8 °C for 14 days

2.3 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม 1 กิโลกรัม ได้น้ำอัญชันพร้อมดื่ม 7 ขวด (ขนาด 130 ml) มีต้นทุนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการคิดเป็น 5.43 บาท/ขวด และการผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่อัญชัน 1 กิโลกรัม ได้เยลลี่อัญชัน 10 ถ้วย (ขนาด 80 g) มีต้นทุนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการคิดเป็น 5.40 บาท/ถ้วย (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ราคา	น้ำอัญชัน 1 กิโลกรัม		เยลลี่อัญชัน 1 กิโลกรัม	
		ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	ราคา
น้ำบริโภค	3 บาท/กิโลกรัม	815 g	3 บาท	706 g	3 บาท
น้ำตาล	25 บาท/กิโลกรัม	160 g	4 บาท	250 g	7 บาท
สีผงอัญชัน	680 บาท/กิโลกรัม	25 g	17 บาท	25 g	17 บาท
คาราจีแนน	600 บาท/กิโลกรัม	-	-	19 g	12 บาท
ขวด	2 บาท/ขวด	7 ขวด	14 บาท	-	-
ถ้วย	1.5 บาท/ถ้วย	-	-	10 ถ้วย	15 บาท
รวม		-	38 บาท	-	54 บาท
			(5.43 บาท/ขวด)		(5.40 บาท/ถ้วย)

Table 14 The quality of butterfly pea jelly product was kept at 4-8 °C for 14 days

Qualities	Shelf life (Day)								Reference standard*	
	0	2	4	6	8	10	12	14		
Color	L*	25.66	25.68	26.13	26.27	26.06	25.89	26.73	26.17	
	a*	5.91	5.85	5.70	5.67	5.70	5.62	5.67	5.97	
	b*	-7.53	-7.43	-7.07	-7.24	-7.50	-7.44	-7.39	-7.54	
	Δ E	0.00	0.12	0.69	0.72	0.45	0.38	1.11	0.51	
	pH	3.10	3.07	3.13	3.11	3.14	3.11	3.11	3.09	
	total soluble solid (°B)	31.87	31.30	31.60	31.40	31.37	31.53	31.37	31.43	
	anthocyanin content (mg cyanidin-3-glucoside/100 g)	1.16 a	1.13 a	1.10 ab	1.08 abc	1.09 abc	1.00 bc	0.98 bc	0.97 c	
	total phenolic compound (mg GAE/100 g)	25.26 a	25.18 a	24.58 ab	24.20 ab	24.21 ab	23.20 bc	23.09 bc	21.98 c	
	antioxidant capacity by DPPH (mg VCEAC/100 g)	17.08 a	16.87 a	15.58 b	13.40 c	11.68 d	11.80 d	11.22 d	10.35 e	
	Total Plate count (CFU/g)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤1 × 10 ⁴
	<i>Staphylococcus aureus</i> (per gram)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Escherichia coli</i> (MPN/g)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	Yeasts and Molds (CFU/g)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤100

In a row, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT

ND = Not Detected

* Thai community product standard 519/2547 soft jelly

3 การขยายผลผลิตภัณฑ์จากสีดอกอัญชันเชิงพาณิชย์

3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในรูปแบบการบรรยายผ่าน Facebook live ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ในหัวข้อ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสีผงดอกอัญชัน (เอกสารประกอบการบรรยายตามภาคผนวก ข) มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 20 ท่าน จากการบรรยายครั้งนี้ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน 16 ท่าน (คิดเป็น 80%) โดยมีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก (4.51-5.00) คิดเป็น 93.75% และพอใจ (3.51-4.50) คิดเป็น 6.25%

3.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนบ้านขนมปังขิง อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี โดยจัดส่งชุดทดลองผลิตผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน พร้อมคลิปวิดีโอขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ไปให้ทางกลุ่มฯ ได้ทดลองผลิตจริง ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถผลิตได้ดัง Figure 9 นอกจากนี้ได้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแบบทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันให้แก่กลุ่มฯ

- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 10 ท่าน มีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมากคิดเป็น 70% และพอใจคิดเป็น 30%

- แบบทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน จำนวน 10 ท่าน พบว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบของทุกด้าน (ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม) อยู่ในระดับชอบปานกลาง (คะแนนอยู่ในช่วง 6.00-6.40) (Table 15) โดยมี 1 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะว่า ชอบหวานมากกว่านี้ ต้องเติมน้ำตาลเพิ่ม




Figure 9 Production of ready to drink juice (A) and soft jelly (B) with butterfly pea powder by Ban Khanom Pang Khing community enterprise group

Table 15 Sensory evaluation of ready to drink butterfly pea juice product and butterfly pea jelly product by Ban Kanom Pang Khing community enterprises group

Product	Sensory evaluation				
	appearance	color	flavor	taste	overall
ready to drink butterfly pea juice	6.00±0.67	6.20±0.63	6.40±0.70	6.40±0.70	6.40±0.70
butterfly pea jelly	6.00±0.67	6.30±0.67	6.10±0.88	6.20±0.92	6.20±0.79

สำหรับข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตได้นั้น ไม่ได้ทำการตรวจคุณภาพ เนื่องจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุนระหว่างจังหวัดเพชรบุรี ถึงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กวป. กรมวิชาการเกษตร ต้องใช้ระยะเวลา 3 วัน ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-8 °C ในขณะที่ระหว่างการขนส่งไม่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้ทำการตรวจคุณภาพ

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

มะนาวผงที่ได้จากการทำแห้งแบบพ่นฝอย มีสมบัติในการยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน โดยมีความเข้มข้นที่ทำให้การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสลดลง 50% (IC₅₀) เท่ากับ 3.52 mg/ml คิดเป็น 0.037 เท่าของค่า IC₅₀ ของกรดโคจิก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.02 mg/ml เมื่อนำมะนาวผง 1.4% ผสมในสบู่อ่อนและมะนาวผง 1.5% ผสมลงในโลชั่นบำรุงผิว ซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของค่า IC₅₀ ของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของมะนาวผง พบว่าสบู่อ่อนและโลชั่นมีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่อ่อนผสมสมุนไพร มอก.เอส 13-2561 และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร มอก.เอส 15-2561 กำหนด อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดการแพ้ในกลุ่มอาสาสมัครผิวปกติจำนวน 22 คน

การประยุกต์ใช้สีผงจากดอกอัญชันในผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน ปริมาณที่เหมาะสมของสีผงดอกอัญชันคือ 2.5% (โดยน้ำหนัก) โดยผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มมีปริมาณแอนโทไซยานิน 0.89 mg cyanidin-3-glucoside/100 ml การเก็บรักษา น้ำอัญชันพร้อมดื่มเป็นเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 °C มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 533/2554 น้ำดอกอัญชัน ส่วนผลิตภัณฑ์เยลลี่มีปริมาณแอนโทไซยานิน 1.16 mg cyanidin-3-glucoside/100 g ผลิตภัณฑ์เยลลี่อัญชันที่เก็บรักษาเป็นเวลา 14 วัน (อุณหภูมิ 4-8 °C) มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 519/2547 เยลลี่อ่อน

สำหรับการขยายผลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวผงและสีผงดอกอัญชัน โดยการจัดส่งชุดทดลองผลิตผลิตภัณฑ์สบู่อ่อนผสมมะนาวผง โลชั่นผสมมะนาวผง น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชัน พร้อมคู่มือวิดีโอขั้นตอนการผลิตไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชนมบังชิง ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ทดลองผลิตจริง ซึ่งพบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถทำการผลิตได้จริง และผลิตภัณฑ์สบู่อ่อนและโลชั่นผสมมะนาวผงที่ผลิตได้มีค่าทดสอบเป็นไปตามที่ มอก.เอส 13-2561 และ มอก.เอส 15-2561 กำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันที่ผลิตได้ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลาง นอกจากนี้ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปโดยการบรรยายผ่าน Facebook live ในวันที่ 7 กันยายน 2564

ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้มะนาวผงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสีผงดอกอัญชัน โดยผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 93.75% และระดับพึงพอใจ 6.25%

จากผลงานวิจัยนี้ มะนาวผงและสีผงดอกอัญชันเป็นผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มะนาวผงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยกรดซิตริก วิตามินซีและมิรสเปรี้ยว นอกจากนี้จะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้ว ยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารได้อีกด้วย ส่วนสีผงจากดอกอัญชันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สี มีรสเปรี้ยว และมีสารแอนโทไซยานิน สีผงจากดอกอัญชันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่ต้องการสีและรสเปรี้ยวได้เช่นเดียวกัน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่ต่อยอดงานวิจัยที่สำเร็จแล้วเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดให้แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดและผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2 ผลิตภัณฑ์ (สบู่มาก่อนและโลชั่นผสมมะนาวผง) และผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ผลิตภัณฑ์ (น้ำอัญชันพร้อมดื่มและเยลลี่อัญชันผสมสีผงจากดอกอัญชัน) โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดนี้ จัดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กล่าวคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมมะนาวผงจะช่วยในด้านปรับปรุงสีผิวเนื่องจากมะนาวผง มีองค์ประกอบของกรดซิตริก มีฤทธิ์ในด้านการผลัดเซลล์ผิวและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ กรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซีมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นสาเหตุของความหมองคล้ำ ฝ้า กระและจุดด่างดำ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผสมสีผงดอกอัญชันจะมีสารประกอบฟีนอลิกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของไขมัน ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากมะนาวผงและสีผงจากดอกอัญชันผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกในกลุ่มสามารถผลิตได้จริงและมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลาง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด สามารถนำไปต่อยอดและผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถนำสูตรและวิธีการผลิตไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวผงและสีผงดอกอัญชัน

บรรณานุกรม

- จารุวรรณ รัตนสกุลธรรม ศุภมาศ กลิ่นขจร ศิริพร เต็งรัง และสุปรียา สุขเกษม. 2563. การผลิตสีผงจากพืชทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์อาหาร, น. 560-578. ใน รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มประจำปี 2563 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร.
- จารุวรรณ ศิริพรรณพร. 2543. มะนาวและเทคโนโลยีการเก็บรักษา. อาหาร 30(1): 1-16.
- นิภา คุณทรงเกียรติ. 2541. การเก็บรักษามะนาว. เกษตรก้าวหน้า 13(1) :38-44.
- ประไพพิศ อินเสน. 2561. การยับยั้งกระบวนการสร้างไลม์ดีสีเมลานินจากพืชกลุ่มเบอร์รี่ไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 (2): 69-82.
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป. ดอกอัญชัน. สืบค้นจาก:
<http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2975/butterfly-pea> [11 กรกฎาคม 2562].
- พิมพ์พร สีลาพรพิสิฐ. 2544. เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด. โอ.เอส. พรินต์ติ้ง เฮ้าส์. กรุงเทพฯ.
- วิไลศรี ลิ้มปวยออม, วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร และอกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์. 2562. การผลิตมะนาวผง น้ามนหอมระเหย และเพคตินจากมะนาวในรูปไมโคร-นาโนแคปซูล, น. 320-335. ใน รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มประจำปี 2562 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร.
- สยามรัฐออนไลน์. 2562. พ่อเมืองลำปางแก้ปัญหาเกษตรกรถูกราคาดอกอัญชันตกต่ำ. สืบค้นจาก:
<https://siamrath.co.th/n/61969> [11 พฤศจิกายน 2562].
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2561. มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร. มอก. เอส 15-2561. 15 หน้า.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2561. มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสมสมุนไพร. มอก. เอส 13-2561. 16 หน้า.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่อ่อน. มผช.519/2547. 5 หน้า.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2554. มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำดอกอัญชัน. มผช.533/2554. 6 หน้า.
- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฮ่องกง. ม.ป.ป. รายงานการตลาด: โอกาสของสินค้าสมุนไพรในฮ่องกง. สืบค้นจาก: https://www.ditp.go.th/contents_attach/160350/160350.pdf [11 พฤศจิกายน 2562].
- Angkana, T., W. Pornpen, J. Pacharaporn and M. Kasorn. 2008. Preparation and stability of butterfly pea color extract loaded in microparticles prepared by spray drying. Thai J. Pharm. Sci. 32: 59-69.
- AOAC. 2012. Association of Official Chemists, Official Methods of Analysis. 15th ed. Washington, D.C.
- Babilas, P. U. Knie and C. Abels. 2012. Cosmetic and dermatologic use of alpha hydroxy acids. JDDG 10: 488-491.
- Beato, V.M., F. Orgaz, F. Mansilla and A. Montañó. 2011. Changes in Phenolic Compounds in Garlic (*Allium sativum* L.) Owing to the Cultivar and Location of Growth. Plant Food Hum Nutr 66:218-223.
- Giusti, M.M. and R. E. Wrolstad. 2005. Characterization and measurement of anthocyanins by UV-Visible spectroscopy, pp. 19-31. In R.E. Wrolstad, T.E. Acree, E.A. Decker, M. H. Penner, D.S. Reid, S.J. Schwartz, C.F. Shoemaker, D. Smith and P. Sporns, eds. Handbook of Food Analytical Chemistry. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey.

- Jafari, S.M., M.G. Ghalehnoei and D. Dehnad. 2017. Influence of spray drying on water solubility index, apparent density, and anthocyanin content of pomegranate juice powder. *Powder Technology* 311: 59-65.
- Kim, D.-O., K. W. Lee, H.J. Lee and C.H. Lee. 2002. Vitamin C equivalent antioxidant capacity (VCEAC) of phenolic phytochemicals. *J. Agric. Food Chem.* 50(13): 3713-3717.
- Kim, D.-O., S. W. Jeong, and C.Y. Lee. 2003. Antioxidant capacity of phenolic phytochemicals from various cultivars of plums. *Food Chemistry.* 81: 321-326.
- Kim, M.B., J.Y. Ko and S.B. Lim. 2016. Formulation optimization of antioxidant-rich juice powders based on experimental mixture design. *Journal of Food Processing and Preservation* ISSN 1745-4549: 1-10.
- Muthukumarasamy, R., A. Kamaruddin, S. Radhakrishnan. 2018. Comparative evaluation of different extraction methods for antioxidant activity of *Citrus hystrix* peels. *Drug Invention Today* 10(8): 1458-1462.
- Saikia, S., N.K. Mahnot and C.L. Mahanta. 2014. Effect of spray drying of four fruit juices on physicochemical, phytochemical and antioxidant properties. *Journal of Food Processing and Preservation* ISSN 1745-4549: 1-9.
- Setiadi, P. and F. Anindia. 2018. Manufacture of solid soap based on crude papain enzyme and antioxidant from papaya. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 105 (012048): 1-7.
- Sharma, G. 2003. *Digital color imaging*. CRC Press, New York.
- Suravanichnirachorn, W., V. Haruthaithanasan, S. Suwonsichon, U. Sukatta, T. Maneeboon and W. Chantrapornchai. 2018. Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [*Antidesma bunius* (L.) Spreng] powders. *Agriculture and natural resources* 52: 354-360.

ภาคผนวก ก

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้มะนาวผงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

กรมวิชาการเกษตร

การประยุกต์ใช้ มะนาว ใน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

ดร. นทีเศรษฐ์ เรียบวัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภาควิชาเคมีและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องสำอาง (cosmetics)

■ เครื่องสำอาง คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งนำมาใช้กับผิวหน้า (Body) (Body) หรือ ครอบงำด้วย 5% โดยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อเพิ่มความสวยงาม ความอ่อนงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู สบู่ แป้ง คุกกี้ครีม

■ ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ พ.ศ. 2560 ของเครื่องสำอางประเภทต่างๆ (ที่มา: Euromonitor)

1	ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	46.8%
2	ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม	18.3%
3	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย	16.3%
4	ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า	13.5%
5	น้ำหอม	5.1%

องค์ประกอบของเครื่องสำอาง

- สูตรพื้น (Base)** --- สารที่ทำหน้าที่สร้างเนื้อของเครื่องสำอาง แตกต่างตามเครื่องสำอางแต่ละชนิด
- สารออกฤทธิ์ (Active ingredient)** --- สารที่เติมเพื่อเพิ่มสมบัติให้กับเครื่องสำอาง เช่น ชะลอวัย ทำให้ผิวขาวใส ลดการอักเสบ
- สารกันเสีย (Preservative)** --- สารที่เติมเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ทำให้เครื่องสำอาง ไม่เกิดการเสื่อมเสียก่อนเวลาที่กำหนด
- สารปรุงแต่ง** --- สารที่เติมแต่งเพื่อเพิ่มความพึงพอใจผู้บริโภค เช่น สี และน้ำหอม

การใช้สารธรรมชาติของเครื่องสำอาง

สารช่วยทำหน้าที่

- ให้ความชุ่มชื้น เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว
- เพิ่มความยืดหยุ่น เช่น แชนแทนกับ กัวกีน
- สารแต่งสี เช่น สีสังเคราะห์ สีธรรมชาติ
- สารแต่งกลิ่น เช่น น้ำมันหอมระเหย

สารออกฤทธิ์ (Active ingredient)

- สารออกฤทธิ์ชะลอวัย
- สารออกฤทธิ์ทำให้ผิวขาว
- สารลดการอักเสบ

สารออกฤทธิ์ชะลอวัย (Antiaging)

- สารที่ลดการเสื่อม หรือชะลอความชราของร่างกาย
- ผลของความชรา (aging) ต่อผิวหนัง
 - ความแข็งแรงของเซลล์ ↓
 - เกิดการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลาเจน และกรดไฮยาลูรอนิก
 - การจับตัวของเซลล์ผิว ↓ ความยืดหยุ่น ↓ → เกิดความเหี่ยวย่น
- สาเหตุของความชรา
 - อายุ → อายุ ↑ ทำให้เซลล์ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงาน ↓
 - ความเครียด แสงแดด มลภาวะ → ทำให้ร่างกายสร้างอนุมูลอิสระขึ้น สารอนุมูลอิสระนี้ จะเข้าไปทำลายเซลล์ของร่างกาย รวมทั้งผิวหนัง ทำให้เกิดความแก่ก่อนวัย

สารธรรมชาติที่ฤทธิ์การเป็น Antiaging

- วิตามิน
 - วิตามินซี และ วิตามินอี
- แคโรทีนอยด์
 - เบต้าแคโรทีน (เบต้าแคโรทีน)
 - ไลโคปีน (เบต้าแคโรทีน)
- ฟลาโวนอยด์
 - ควอร์เซติน (ควินอน ควอนซัน)
 - แอนโทไซยานิน (แอนโทไซยานิน)
- สารประกอบฟีนอลิก
 - เรสเวอราทรอล (โพลีฟีนอล)

(ที่มา: ข้อมูลจาก สวรส) (ฉบับแก้ไข 2560)

สารออกฤทธิ์ทำให้ผิวขาว (Whitening)

- เป็นสารออกฤทธิ์ต่อการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (Melanin) เป็นสารที่สังเคราะห์โดยเซลล์เมลาโนไซท์ในผิวหนังชั้นกำพร้า
- มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สำคัญ คือ **ไทโรซิเนส (Tyrosinase)** เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เปลี่ยนสารตั้งต้นไทโรซินเป็นเมลานิน
- เมื่อผิวหมองมีเมลานินมากเกินไปจะเกิดความหมองคล้ำ ผา กระ จุดด่างดำได้

สารธรรมชาติและการออกฤทธิ์ต่อความขาวใส

- ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน
 - เรสเวอราทรอล (โพลีฟีนอล)
- ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
 - เรสเวอราทรอล, กรดโคจิก, วิตามินซี
- การเร่งผลิตเซลล์ผิว
 - กรดผลไม้ (AHAs)
- การยับยั้งอนุมูลอิสระ
 - วิตามินซี วิตามินอี

มะนาว

- สำคัญ
- การผลิตเป็นมะนาวผง

มะนาว

- มะนาว (*Citrus aurantifolia*) เป็นพืชที่อุดมไปด้วยประโยชน์
 - เปลือกมะนาว สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมระเหย และแพคติน เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางได้
 - น้ำมะนาว ธรรมชาติของพืชช่วย ไซ้บำรุงสุขภาพ ผสมน้ำเป็นเครื่องดื่ม
- น้ำมะนาว ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด ได้แก่
 - สารประกอบฟีนอลิก
 - วิตามินซี
 - กรดซิตริก
 - กรดแอลฟาไฮดรอกซี (Alpha hydroxy acid) หรือ AHAs

การผลิตมะนาวผง

ด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย

การผลิตมะนาวผงด้วยวิธี การทำแห้งแบบพ่นฝอย

สมบัติมะนาวผง

สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ	ผลการทดลอง
ผลได้	13.27 ± 0.14 %
ความชื้น	2.97 ± 0.40 %
ρ_w	0.15 ± 0.02 g/cm ³
ความหนาแน่น	0.49 ± 0.02 g/cm ³
pH	2.50 ± 0.01
ของแข็งละลายได้	16.52 ± 0.27 %Brix
ดัชนีการหักเหของน้ำ	89.95 ± 0.56
ค่าสี	
L*	50.3 ± 0.3
a*	-0.2 ± 0.1
b*	4.6 ± 0.4

ลักษณะปรากฏ

ลักษณะปรากฏมะนาวผง

สมบัติมะนาวผง

สมบัติทางเคมี

สมบัติ	ผลการทดลอง
ปริมาณกรดทั้งหมด	20.32 ± 1.63 %
ปริมาณวิตามินซี	19.25 ± 2.05 mg/100gDW
ปริมาณฟีนอลิก	82.26 ± 4.19 mgGAE/100gDW
ฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH	31.74 ± 3.18 mg/CEAC/100gDW
ฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระในโรซิงเงิน (IC50 kojic acid ± 0.02)	45.45 ± 5.78 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/mL (Kojic acid = 77.91 ± 0.05%)
ค่าดัชนีการหักเหของแสงในน้ำ	49.97 ± 2.62 % ที่ความเข้มข้น 1 mg/mL
ฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญของเซลล์เนื้อเยื่อในรกของหนู (Mfibroblast)	Vitamin C = 62.28 ± 4.98% ที่ 0.1 mg/mL

ฤทธิ์เพิ่มความขาวใส

ฤทธิ์ในการชะลอวัย

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

พรมมะนาวผง

- ☑️ โลชั่นบำรุงผิว
- ☑️ สบู่ก้อน

ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิว (Body lotion)

โลชั่น (Lotion)

- ☑️ โลชั่น เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท บำรุงผิว
- ☑️ เกิดจากสารที่ไม่ละลายกับและกับน้ำผสมกัน คือ น้ำและน้ำมัน นพผสมกับโดยมีตัวผสม หรืออิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ทำหน้าที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- ☑️ จัดเป็น สารประเภทอิมัลชันประเภท **น้ำมันในน้ำ** (Oil in Water, O/W) มีความหนืดต่ำ (เหลว)

ความสำคัญขอลอชั่น

- ☑️ ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง
- ☑️ ลดความแห้งกร้าน จากการชำระล้างผิว ความสะอาดของผิว
- ☑️ ระวังอาการคัน จากอาการ ผิวแห้ง

โลชั่น (Lotion)

☑️ โลชั่นจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส

เฟส น้ำ

เฟส น้ำมัน

☑️ การผลิตโลชั่นจะอาศัยแรงกล เช่น การใช้เครื่องปั่น ในการทำให้ส่วนผสมเกิดการแตกเป็นหยดขนาดเล็ก และกระจายตัวใน **เฟสน้ำ** โดยมี emulsifier เป็นตัวช่วยผสม

ส่วนผสมขอลอชั่น

- น้ำมัน ไขมัน แวกซ์**
 - ☑️ สารกลุ่มนี้เป็นอิมัลชัน (emollient) จะทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว โดยเมื่อสัมผัสผิวจะทำหน้าที่เป็นฟิล์มกคลุมผิว ที่การระเหยน้ำ ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้น

แว็กซ์ (Waxes)

เป็นของแข็ง หรือกึ่งของแข็ง ช่วยเพิ่มความเหนียว และทำให้ผิวชุ่มชื้น

น้ำมัน (Oil)

เป็นของเหลวช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มให้กับผิว ทำให้ผิวลื่นนุ่ม

ไขมัน (Fats)

มีทั้ง ของแข็ง และของเหลว ช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มให้กับผิว เช่น Fatty acid, Fatty acid ester, Fatty alcohol เป็นต้น

ส่วนผสมขอลอชั่น


- อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier)**
 - ☑️ เป็นตัวที่ทำให้ น้ำ และ น้ำมัน ผสมผสานเข้าด้วยกัน
 - ☑️ **ทำหน้าที** การลดแรงตึงผิวของอินทรีย์ และอินทรีย์ ทำให้อนุภาคไขมันสามารถกระจายอยู่ในน้ำเสมอพวมน้ำ โดยไม่เกิดการแยกชั้น
- สารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว (Humectant)**
 - ☑️ ทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว โดยการดูดน้ำจากอากาศ โดยตรงเข้าสู่ผิว
 - ☑️ สารที่มีโมเลกุลต่ำ ได้แก่ กลีเซอรอล พวอฟีนอลไกลคอล

ส่วนผสมของโลชั่น

4 สารเพิ่มความข้นเหนียว (Thickening agent)

- ทำหน้าที่เพิ่มความข้นเหนียว และรักษาความคงตัวทางกายภาพ
 - สารสังเคราะห์** เช่น คาร์โบพอล (Carbopol) อะคริลาต โพลีเมอร์ (Acrylate copolymer) ต้องปรับ pH 6.5-7.5 จึงจะเกิดเจลได้
 - สารจากธรรมชาติ** เช่น แซลมอนกับ การบดขี้นกพิราบผสมสุกใส ไม่ต้องอาศัยค่า pH ในการเกิดเจล แต่ต้องเติมโซเดียมคาร์บอเนตสังเคราะห์

5 สารออกฤทธิ์
6 สารกันเสีย
7 สารปรุงแต่ง เช่น น้ำหอมและสี



ที่มา: Heitenbach et al. (2013)


มาตรฐานของผลิตภัณฑ์โลชั่น

มอก. เส 15/2561 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร

- pH 3.5-7.5
- จุลินทรีย์
 - แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ไม่เกิน 1000 CFU/g
 - ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่
 - สเตรปโตคอคคัส ออเรียส (*Streptococcus aureus*)
 - สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*)
 - แคนดิดา แอลบิคานส์ (*Candida albicans*)
 - คลอสทริเดียม (*Clostridium spp.*)
- ความคงสภาพ
 - กำหนดให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต้องคงสภาพไม่เกิดการแยกชั้น จากการทดสอบที่สภาวะอุณหภูมิ 4 ± 2 °C 24 ชั่วโมง สลับอุณหภูมิสูง (45 ± 2 °C) 24 ชั่วโมง เป็นจำนวน 4 รอบ

การผลิตโลชั่นผสมมะนาว

วิธีการผลิตโลชั่นผสมมะนาว



PHASE	ส่วนผสม	%
Phase A (ส่วนน้ำ)	น้ำร้อน	71.4
	กัสนอร์น	4.0
	ผสมกัน	0.4
Phase B (ส่วนน้ำส้ม)	น้ำส้มซ่า	4.0
	สตีเฟน-21	3.5
	เอสทีเอ	0.2
	เอสทีเอ	3.0
	โพลีเพอร์ออกไซด์	3.0
	กัสนอร์น	2.0
Phase C (ส่วนน้ำมัน)	พาราดีน	1.0
	โกลด์วอลล์	0.5
	น้ำร้อน	3.0
	เบนพวง	1.5
	โกลด์วอลล์	0.5
รวม	น้ำร้อน	1
	โกลด์วอลล์ (LEA)	1
	น้ำร้อน	0.2

การผลิตโลชั่นผสมมะนาว



สมบัติของโลชั่นผสมมะนาว

สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ	ผลการทดลอง
pH	5.22 ± 0.03
ค่าสี	
L*	44.43 ± 0.09
a*	-0.58 ± 0.03
b*	1.47 ± 0.04
ความคงสภาพต่ออุณหภูมิ 4 °C → 45 °C (4 Cycles)	ไม่เกิดการแยกชั้น
ความคงสภาพต่อการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge test 3750 rpm 20 นาที)	ไม่เกิดการแยกชั้น

รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของโลชั่นผสมมะนาว



คุณภาพและความปลอดภัย

คุณภาพทางจุลชีววิทยา


รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
Total Plate Count	<10	CFU/g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Not Detected	Per 10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Not Detected	Per 10 g
<i>Candida albicans</i>	Not Detected	Per 10 g
Yeast and Molds	<10	CFU/g

การกระจายของตัวอย่าง

ดินทุบวัดจุดดิน 87 บาท ต่อลิตร 1 กิโลกรัม บรรจุขวด 120 กรัม 8 ขวด/ 250 กรัม 12 ขวด (ไม่รวมภาษีขนส่ง)

ไม่พบการกระจายของตัวอย่าง จากการทดสอบด้วยวิธี closed pad test ในอาสาสมัครผู้บริโภคนาน 20 คน

ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน (Soap Bar)



สบู่ก้อน (Soap Bar)

- เป็นเครื่องสำอางประเภท ทำความสะอาด
- เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง ไขมันจากพืชหรือสัตว์ และด่างที่เรียกว่า * กระบวนการ Saponification * ได้ผลผลิตเป็นสบู่ก้อนและกลีเซอริน
- ผลิตได้ทั้งวิธีกดเย็น (Cold pressed) ใช้เวลานาน 3-4 สัปดาห์ 5°C ควบคุมเย็น (Hot pressed) ใช้ความร้อนเร่งปฏิกิริยา ใช้เวลา 1-2 วัน แต่สบู่เนื้อจะไม่เรียบเนียน Cold pressed
- ปัจจุบันมีการผลิตสบู่ด้วย 3วิธีคือแบบแฉก (melt and pour) โดยวิธีนี้จะนำไขมันสบู่สำเร็จรูปมาหลอม แล้วผสมสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ
- สบู่ก้อนไม่ยุ่งยาก ปรุงแบบให้หลากหลาย หลอดจืดจางจากธรรมชาติ



มาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

มอก. เส 13/2561 ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมสมุนไพร

- จุลินทรีย์
 - แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ไม่เกิน 1000 CFU/g
 - ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่
 - สเตรปโตคอคคัส ออเรียส (*Streptococcus aureus*)
 - สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*)
 - แคนดิดา แอลบิคานส์ (*Candida albicans*)
 - คลอสทริเดียม (*Clostridium spp.*)
- ความคงสภาพ
 - ทดสอบความคงสภาพ 12 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 42 ± 2 °C (ใช้ดินตัวอย่างเตรียมเทียบ) อุณหภูมิห้อง และ 45 ± 2 °C โดยกันและสลับกันในแต่ละสัปดาห์จากตัวอย่างเปรียบเทียบ

การผลิต สบู่ก้อนผสมมะนาว



วิธีการผลิตสบู่ก้อนผสมมะนาว

PHASE	ส่วนผสม	%
A	แอสยูไล	96.1
B	น้ำส้ม	1.4
	มะนาว	1.4
	ไทรโคเทรล ฟอสฟอรัส	0.6
	น้ำหอม	0.5

สมบัติของสบู่ก้อนผสมมะนาว

สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ	ผลการทดลอง
pH	9.21 ±0.02
ความคงตัวของฟอง	97.11 ±2.46
ค่าสี	
L*	41.88 ±1.37
a*	-1.11 ±0.07
b*	9.54 ±0.64

รูปที่ 2 ลักษณะปรากฏของสบู่ก้อนผสมมะนาว

คุณภาพและความปลอดภัย

คุณภาพทางจุลชีววิทยา

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
Total Plate Count	<10	CFU/g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Not Detected	Per 10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Not Detected	Per 10 g
<i>Candida albicans</i>	Not Detected	Per 10 g
Yeast and Molds	<10	CFU/g

ดินกุนวัดกุดจับ 7.16 บาท ต่อสบู่ก้อนขนาด 50 กรัม (ไม่รวมส่วนผสมสำหรับห่อ)

การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่พบการระคายเคืองต่อผิวหนังจากการทดสอบด้วยวิธี closed pad test ในอาสาสมัครผิวหนังจำนวน 20 คน

ขอบคุณค่ะ



- ### OUTLINE
- 1 เครื่องสำอาง
 - ชนิดของเครื่องสำอาง และการใช้สารธรรมชาติในเครื่องสำอาง
 - 2 มะนาว
 - สารสำคัญ
 - การผลิตมะนาว
 - 3 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมมะนาว
 - ไล่ยุงน้ำขมิ้น
 - สบู่ก้อน

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสีผงดอกอัญชัน

กรมวิชาเกษตรศาสตร์



การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

จาก สีม่วงดอกอัญชัน

.....

จารุวรรณ รัตนสุภาสสม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตอาหาร
จากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากพืชและสมุนไพรสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสำหรับสารสกัดให้สี จากส่วนของพืชหรือสัตว์

สารสกัดให้สีจากส่วนของพืชหรือสัตว์ หมายถึง สารให้สีที่ได้จาก ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก ใบ ผล เปลือก ดอก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ ซึ่งมีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร และได้จากวิธีทางกายภาพหรือสกัดด้วยน้ำเท่านั้น ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตจะต้องไม่มีขั้นตอนใดๆ ที่ทำให้สารที่ให้สีดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ขึ้นจากที่มีในธรรมชาติ โดยอาจอยู่ในรูปของเหลวเข้มข้น หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือผง หรือของแข็ง และอาจมีการเติมส่วนประกอบอื่น เช่น วัตถุเจือปนอาหาร หรือวัตถุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต

3

มาตรฐานด้านสารปนเปื้อน

- ไม่มีสารปนเปื้อน เว้นแต่ดังต่อไปนี้
- สารหนู ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม
- ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

5

มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนอาหาร

- อนุญาตการใช้วัตถุกันเสียบางชนิดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสกัดภัณฑ์ (ต่อกรดซอร์บิก โซเดียมซอร์เบต โพแทสเซียมซอร์เบต แคลเซียมซอร์เบต ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต คือ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (คำนวณเป็นกรดซอร์บิก) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต คือ 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (คำนวณเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
- อนุญาตการใช้มอลโตเดกซ์ทรีน (maltodextrin) เป็นสารช่วยห่อหุ้มหรือช่วยพา (carriers) กรณีผลิตภัณฑ์เป็นผง ในปริมาณที่เหมาะสม


17

สารแอนโทไซยานิน

- สามารถละลายน้ำได้
- มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
 - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ลดการเกิดโรคเกี่ยวกับตา โรคต้อหิน โรคต้อกระจก
 - ช่วยควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ช่วยลดการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว
- แหล่งของแอนโทไซยานิน
 - ผักและผลไม้ต่างๆ เช่น ดอกอัญชัน กระจับปี่ ผักกาดแดง องุ่น พลัม ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

9

ประโยชน์ของดอกอัญชัน



11

ผลิตภัณฑ์อาหาร



2

มาตรฐานด้านจุลินทรีย์

- ตรวจไม่พบเซลล์โมแนลลา ใน 25 กรัม
- ตรวจไม่พบ อลอสตริคัม เพอร์ฟิงเรเนส ใน 0.01 กรัม
- ตรวจพบ แบคทีเรียชนิด อี.โคไล น้อยกว่า 3 ต่อ 1 กรัม (โดยวิธีเอ็ม พี เอ็ม)
- ตรวจพบ สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส น้อยกว่า 100 ต่อ 1 กรัม

14

มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนอาหาร

- อนุญาตการใช้กรดและเกลือของกรดบางชนิดเพื่อรักษาความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความคงตัวของสี ดังนี้
 - กรดแอสคอร์บิก แคลเซียมแอสคอร์เบต โซเดียมแอสคอร์เบต กรดซิตริก กรดดีแอล-มาลิก (ปริมาณที่เหมาะสม)
- อนุญาตการใช้วัตถุกันเสียบางชนิดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสกัดภัณฑ์
 - กรดเบนโซอิก โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียมเบนโซเอต แคลเซียมเบนโซเอต ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต คือ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)

6

ดอกอัญชัน




- อัญชันจัดเป็นสมุนไพร มีทั้งชนิดดอกสีขาวและดอกสีน้ำเงิน
- รงควัตถุของดอกอัญชันคือ สารแอนโทไซยานิน



รูปที่ 1 ดอกอัญชันสีต่างๆ
ที่มา: ดิฉันไปจาก Hazuma et al., (2003)

8

คุณสมบัติเด่น



สีของสารสกัดดอกอัญชันที่ความเข้มข้นต่างกัน 1-14

10

กรดซิตริก


- กรดซิตริก เป็นกรดอ่อน พบได้ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ในผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว
- หน้าที่ของกรดซิตริก คือ
 - ปรับค่า pH ของอาหารให้เป็นอาหารปรับกรด
 - ปรับแต่ง กลิ่นรส ปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยว ใช้น้ำในเครื่องปรุงรส
 - เป็นสารกันเหิน สารกันเสีย (เพิ่มพื้คุณสมบัติยา, น.ป.ป.)



12

มอลโตเด็กซ์ทริน

- เป็นคาร์โบไฮเดรต ประเภท polysaccharide ที่ได้จากการย่อยโมเลกุลของสตาร์ช (starch) บางส่วนให้เป็นสายสั้นๆ ของน้ำตาลกลูโคส มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาว ไม่มีรสหรือมีรสหวานเล็กน้อย สามารถละลายในน้ำได้ดี
- ใช้เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างกว้างขวาง รวมทั้งใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารไขมันต่ำ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เช่น เครื่องดื่มผง เครื่องปรุงรสชนิดผง
- ใช้เป็นสารตกตะกอนไขมันในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใช้เป็นสารเพิ่มเนื้อในการทำแห้งแบบ spray dry หรือ drum dry (พิมพ์ที่เผยแพร่โดย: 2559)



13

วิธีการทำแห้ง

- การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (Sun Drying)
- การใช้กระแสลมร้อนสัมผัสกับอาหาร
 - เครื่องทำแห้งแบบตู้อบ (Cabinet Dryer) หรือแบบถาด (Tray Dryer)
- การทำอาหารหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นชั้นในผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งร้อน
 - เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer)
- การทำอาหารหรือผลิตภัณฑ์หมุนอยู่ในห้องหมุน ซึ่งภายในไม่มีอุณหภูมิสูง
 - เครื่องทำแห้งแบบหมุน (Rotary Dryer)

15

01) การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (Sun drying)

- เป็นการทำแห้งอย่างง่าย และทำได้ที่สด
- ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ นิยมใช้ทำแห้งอาหารต่างๆ เช่น
 - อาหารทะเล : กุ้ง ปลาหมึก
 - ผัก ผลไม้ : ลูกกาด กสับ
 - เมล็ดธัญพืช : ถั่วชนิดต่างๆ
 - เครื่องเทศ : พริก หอม กระเทียม
 - อื่นๆ : ชา กาแฟ โกโก้



ข้อจำกัด
ประสิทธิภาพการทำแห้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนและอุณหภูมิได้ การควบคุมคุณภาพอาหารแห้งจึงทำได้ยาก

17

03) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum drying)

- ประกอบด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอกเดี่ยว (single drum dryer) หรือสองลูก (double drum dryer) ทำด้วยเหล็กปลอดสนิม (stainless steel)
- ลูกกลิ้งยืบริบภายในกลิ้ง ได้รับความร้อนจากด้านในด้วยไอน้ำหรือไฟฟ้าระบบปิดอาหาร ทำให้อาหารเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งเป็นฟิล์มบาง
- อาหารแห้งมีลักษณะเป็นแผ่นบาง (flake) อาจนำมาผ่านความร้อนให้เป็นผงเย็ด
- ปริมาณของแข็งในของเหลวที่ถูกอบความร้อนมีค่าประมาณ 20% เพื่อให้เกาะติดผิวลูกกลิ้งได้ดี
- เหมาะสำหรับอาหารที่มีอนุภาคใหญ่เกินกว่าจะใช้ Spray dryer เช่น มันฝรั่งแผ่น กากน้ำตาล ชุปแห้ง



19

05) การทำแห้งแบบไมโครเวฟ (Microwave Drying)


- เป็นการให้พลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านเข้าไปในอาหาร และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
- ทำให้อัตราการถ่ายเทมวลเร็วขึ้น เวลาการอบแห้งจึงสั้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการพองตัว และมีโครงสร้างรูพรุนภายใน ทำให้เกิดการคืนตัวดี
- การใช้ไมโครเวฟทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมักพบรอยไหม้ เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- การใช้เทคโนโลยีร่วม เช่น การใช้ไมโครเวฟร่วมกับสูญญากาศ



21

07) การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying)

- เป็นการทำแห้งโดยใช้เครื่องพ่นฝอย (atomizer) ทำให้อาหารเหลวเป็นละออง สัมผัสกับกระแสลมร้อนภายในห้องอบแห้ง (drying chamber) ทำให้แห้งในอาหารระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มีลักษณะเป็นผงแห้งถูกอุณหภูมิจากของแข็งตัวสร้างอาหารแห้งที่มีความชื้นต่ำ (น้อยกว่า 5%)
- Drying Chamber
- ตัวทำละออง (atomizer)



23

การทำแห้ง

- ยึดอายุการเก็บรักษาและป้องกันการเน่าเสียของอาหาร
 - ลดค่าความชื้นแฉะ
 - ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 - ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
 - ชะลอการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ
- ลดน้ำหนักและปริมาณของอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
- สะดวกในการใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์ผง
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ลูกกาด



14


วิธีการทำแห้ง (ต่อ)

- การใช้คลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำระเหย
 - เครื่องทำแห้งแบบไมโครเวฟ
 - เครื่องทำแห้งไมโครเวฟร่วมกับสูญญากาศ เพื่อลดอุณหภูมิการอบแห้ง
- การทำให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์แข็งด้วยความเย็นอย่างรวดเร็วและระเหิดน้ำออกภายใต้สภาวะสูญญากาศ
 - เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)
- การพ่นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวเข้าไปในห้องที่มีลมร้อน
 - เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)

16

02) การทำแห้งแบบตู้อบ (Cabinet drying)


- อาศัยหลักการนำความร้อนแบบ การพาความร้อนทำงานเป็นกะ (batch) เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นตู้ (Cabinet) และมีถาดบรรจุอาหาร นิยมใช้ทำแห้งอาหารต่างๆ เช่น
 - ผัก ผลไม้
 - สมุนไพร เครื่องเทศ
 - เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ



18

04) การทำแห้งแบบหมุน (Rotary Drying)

- ประกอบด้วยภาชนะโลหะทรงกระบอกหมุน ที่เยื้องเป็นมุมเล็กน้อยภายใน มีซี่โลหะเพื่อทำให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไอน้ำหรือลมร้อน
- อากาศเคลื่อนที่แบบขนาน หรือสวนทาง
- เหมาะสำหรับอาหารที่มีแนวโน้มจะจับตัวกันหรือเกาะกันในเครื่องอบแห้งแบบถาด
- เหมาะสำหรับอาหารที่ต้องการกำลังการผลิตสูง หมดเครื่องกระแทก ไม่ช้า เช่น
 - ผลิตภัณฑ์น้ำตาล
 - เมล็ดโกโก้
 - เมล็ดธัญพืช
 - ถั่วเมล็ดแห้ง
 - อาหารสัตว์



20


06) การทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying หรือ Lyophilization)

- อาศัยหลักการแช่แข็ง (Freezing) อย่างรวดเร็ว ให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็ก และเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์ของอาหาร กระตุ้นให้เกิดการระเหิดของน้ำ กลายเป็นไอโดยตรง โดยอาศัยหลักการปรับความดันไอของน้ำให้มีค่าต่ำกว่าจุดสามจุด (triple point) ของน้ำ
- ไอน้ำจะถูกกำจัดออกจากอาหาร โดยการเพิ่มอุณหภูมิในห้องเครื่องทำแห้งจนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
- นิยมใช้กับ microbial culture, เอนไซม์, เลือด, วัคซีน, สารทางชีวเคมี, ยา, แอนติเจน, แอนติบอดี, กาแฟ, ตัวอย่างทางชีวภาพ




22

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) (ต่อ)



Drying Chamber
เป็นบริเวณที่เกิดการทำแห้งอาหาร โดยอากาศร้อนแห้งซึ่งเป็นอากาศที่ถูกดูดผ่านระบบกรองและทำให้ร้อนจะปะทะกับอาหารเหลวบริเวณนี้ เกิดการระเหยของน้ำจากหยดอาหารเหลว

การสับฝอยระหว่างอากาศร้อนและอาหารเหลว



24

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) (ต่อ)

❑ ตัวทำละออง (atomizer)

- ❑ ทำให้อาหารเหลวแตกตัวเป็นละอองฝอย
- ❑ เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับความร้อนในภาชนะ
- ❑ กำหนดขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์
- ❑ การเลือกใช้ atomizer ขึ้นกับ
 - คุณสมบัติของอาหารแห้งเริ่มต้น : ความหนืด
 - คุณสมบัติของอาหารแห้งที่ต้องการ : ขนาดอนุภาค การละลาย (solubility) ความหนาแน่น (density)


| 25

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) (ต่อ)

❑ ตัวทำละออง (atomizer) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมี 3 ชนิด

1) Centrifugal atomizer

- ของเหลวจะเข้าสู่โปร่งกลางของแกนหมุน
- ความเร็วประมาณ 5,000-10,000 รอบต่อนาที
- ของเหลวจะถูกเหวี่ยงออกด้านข้าง กระจายเป็นละออง
- ขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 30-120 ไมครอน
- นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป



| 26

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) (ต่อ)


2 Pressure nozzle atomizer

- ของเหลวจะไหลผ่านช่องของหัวฉีดภายใต้ความดันสูง
- ขนาดอนุภาคที่ได้เฉลี่ยประมาณ 120-250 ไมครอน



3 Two-fluid nozzle atomizer

- ของเหลวและอากาศจะไหลผ่านหัวฉีด
- ทำให้แตกเป็นละอองฝอย
- ใช้งานได้กับอาหารเหลวที่มีความหนืดสูง



| 27

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) (ต่อ)


❑ นิยมใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเข้มข้น อยู่ในสภาพเหลว หรือสารแขวนลอย หรือสารเป็นตะกอน

- นมผง โยเกิร์ต ไข่ไก่ นมข้นใส
- สารสกัดจากเนื้อเยื่อและพืช
- ส่วนผสมของไอศกรีม คริมเทียม โยเกิร์ต ผงอบแห้ง



| 28

การผลิตสีม่วงจากดอกอัญชัน ด้วยวิธีการทำให้แห้งแบบพ่นฝอย



| 29

สมบัติของสีม่วงดอกอัญชัน

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพ		ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมี	
สมบัติ	ผลการทดลอง	สมบัติ	ผลการทดลอง
แอลกอฮอล์	10.22 %	ปริมาณของไนโตรเจน	40.2 mg nitrogen / 3-D-glucoside / 100g
คาร์บอเนต	4.31 %	ปริมาณของคลอโรฟิลล์	694.32 mg/100g
pH	0.22	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH	254.24 mg/100g
ของแข็งละลายได้	13.3 %		
ค่าการละลาย	98.71		
ค่าสี			
L*	57.36		
a*	16.02		
b*	-12.63		



สีม่วงจากดอกอัญชัน

| 30



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD
พ.พ.ช. 533/2554


❑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำดอกอัญชัน พ.พ.ช. 533/2554

น้ำดอกอัญชัน หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากน้ำของผลสีดอกอัญชันที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ *Clitoria ternatea L.* ที่สกัดหรือแปรรูปอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย นำไปต้มกับน้ำจนเดือด บรรจุหรือบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาดโดยผ่านเครื่องกรองหรือผ่านกระดาษกรอง และบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดผนึกให้เรียบร้อย

วิธีการเพาะปลูกพืช หมายถึง การมีการฆ่าเชื้อดินก่อนเพาะปลูกในแปลงปลูก และใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีให้ดินให้อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยต่อโรค โดยทั่วไปใช้ดินร่วนซุยที่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกให้ถึงขั้นผลสุก

| 31

การเตรียมผลิตภัณฑ์จากสีม่วงดอกอัญชัน



| 33



“ การผลิต น้ำอัญชัน ”

ผลการตรวจจุลินทรีย์ที่อายุการเก็บรักษา 14 วัน

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
Total Plate Count	<1	CFU/mL
Bacillus cereus	<1	CFU/mL
Clostridium perfringens	<1	CFU/mL
Coliforms	<1.1	MPN/100 mL
Escherichia coli	Not Detected	Per 100 mL
Listeria monocytogenes	Not Detected	Per 25 mL
Staphylococcus aureus	<1	CFU/mL
Salmonella spp.	Not Detected	Per 25 mL
Yeast and Molds	<1	CFU/mL

| 36

❑ 1) ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่มจากสีม่วงดอกอัญชัน



ตารางที่ 3 คุณภาพน้ำอัญชันพร้อมดื่ม	
สมบัติ	ผลการทดลอง
pH	3.22
ของแข็งละลายได้	24.20 %
ค่าสี	
L*	27.71
a*	5.32
b*	-5.08

อายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันพร้อมดื่ม ที่อายุการเก็บรักษา 14 วัน มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำดอกอัญชัน (พ.พ.ช. 533/2554)

ผลการตรวจจุลินทรีย์	
Total Plate Count	<1
Bacillus cereus	<1
Clostridium perfringens	<1
Coliforms	<1.1
Escherichia coli	Not Detected
Listeria monocytogenes	Not Detected
Staphylococcus aureus	<1
Salmonella spp.	Not Detected
Yeast and Molds	<1

| 35




มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD
มพช. ๕๑๙/๒๕๔๗

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เยลลี่อ่อน มพช. 519/2547

เยลลี่อ่อน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผลไม้ ผัก ธัญชาติ หรือสมุนไพร มาขึ้นหรือคิดแล้วผสมกับสารให้ความหวานและสารที่ก่อให้เกิดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน ฟูม ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้อัตราส่วนของน้ำในลักษณะที่แข็ง อาจผสมสารอื่นในส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ผลไม้ ผัก ธัญชาติ สมุนไพร เติมน้ำให้มีความเข้มข้นพอเหมาะเพื่อให้สามารถขึ้นและกินหรือรับประทานได้ บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การเตรียมผลิตภัณฑ์จากสลิมนอกอัญชัน



ผลิตภัณฑ์เยลลี่อ่อนจากสลิมนอกอัญชัน



ตารางที่ 4 คุณภาพเยลลี่อ่อน

สมบัติ	ผลการทดสอบ
pH	2.70
ของแข็งจะสามได้	29.67 %
L*	25.88
a*	5.23
b*	-8.93

อายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์เยลลี่อ่อนที่ทำจากสลิมนอกอัญชัน 14 วัน
มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เยลลี่อ่อน (มพช.519/2547)

พารามิเตอร์	ค่าที่พบ	ค่ามาตรฐาน
Total Plate Count	<10	CFU/g
Escherichia coli	<3.0	MPN/g
Staphylococcus aureus	Not Detected	Per gram
Yeast and Molds	<10	CFU/g

ต้นทุนการผลิตต่อ 1 กิโลกรัม

รายการ	ราคา	ปริมาณ	จำนวนเงิน
คอกอัญชันแห้ง	400 บาท/กก.	1 กก.	400 บาท
กรดซิตริก	70 บาท/กก.	1.5 กก.	105 บาท
มอลโตเด็คซ์ทรีน	70 บาท/กก.	2.5 กก.	175 บาท
รวม			680 บาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าพลังงานเชื้อเพลิง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เยลลี่อ่อน มพช. 519/2547 (ต่อ)

คุณภาพด้านจุลินทรีย์

- จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1x10⁴ โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
- เชื้อราที่ออกสปอร์ ต้องไม่เกินตัวอย่าง 1 กรัม
- แบคทีเรียที่ก่อโรค ต้องไม่เกินตัวอย่าง 3 ตัวอย่างข้าง 1 กรัม
- ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม



ผลการตรวจจุลินทรีย์ที่อายุการเก็บรักษา 14 วัน

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
Total Plate Count	<10	CFU/g
Escherichia coli	<3.0	MPN/g
Staphylococcus aureus	Not Detected	Per gram
Yeast and Molds	<10	CFU/g

ต้นทุนการผลิต

รายการ	ราคา	ผลิตภัณฑ์น้ำอัญชัน 1 กก. (7 ซวด)		ผลิตภัณฑ์เยลลี่ 1 กก. (10 ถ้วย)	
		ปริมาณ	ราคา (บาท)	ปริมาณ	ราคา (บาท)
น้ำ	3 บาท/กก.	85 กรัม	3 บาท	708 กรัม	3 บาท
น้ำตาล	25 บาท/กก.	180 กรัม	4 บาท	250 กรัม	7 บาท
สีผสมอาหาร	680 บาท/กก.	25 กรัม	17 บาท	25 กรัม	17 บาท
คาราจีแนน	600 บาท/กก.	-	-	19 กรัม	12 บาท
ซวด	2 บาท/ซวด	7 ซวด	14 บาท	-	-
ถ้วย	1.50 บาท/ถ้วย	-	-	10 ถ้วย	15 บาท
รวม	-	-	48 บาท	-	54 บาท
หมายเหตุ :			(5.43 บาท/ซวด)		(5.40 บาท/ถ้วย)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าพลังงานเชื้อเพลิง

ขอบคุณค่ะ