

ที่สุด 9.00 เซนติเมตร และเปลือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดที่ 4,109 กิโลกรัม ขณะที่ทุกสายต้นได้รับความนิยมของผู้บริโภคในระดับดี (4 จาก 5 คะแนน)

คำสำคัญ : เปลือก การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือก รังสีแกมมา การกลายพันธุ์

6. คำนำ

เปลือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สำคัญ คนไทยนิยมบริโภคเปลือกเพราะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี หัวเปลือกจะมีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งใบเปลือกสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย มีเปลือกบางประเภทที่ใช้ใบสำหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่เหมาะต่อการบริโภค (มาลินีและคณะ, 2534) เปลือกเป็นพืชเก่าแก่ที่มนุษย์อยู่ในเขตร้อนรู้จักและนำมาเพาะปลูกแหล่งกำเนิดของเปลือก คือ อินเดียโดยเฉพาะปลูกกันมาตั้งแต่ราว 9,000 ปีมาแล้ว และจากอินเดีย เปลือกแพร่กระจายออกไปทางตะวันออกสู่จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะต่างๆ ในแปซิฟิก และทางตะวันตกสู่ทวีปแอฟริกา ประชาชนชาวเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะชาวโพลินีเซีย ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของเกาะฮาวายเป็นพวกที่บริโภคเปลือกมากที่สุดในโลก โดยจะบริโภคเปลือกเป็นอาหารหลักแทนข้าว (ทวีทอง, 2545) เปลือกเป็นพืชที่มีลำต้นใต้ดินเจริญเติบโตกลายเป็นหัว และมีหัวเล็กๆ ล้อมรอบ หัวมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไป ต้นสูง 0.4-2 เมตร ใบใหญ่เป็นรูปหัวใจมีขนาดสีต่างๆ กัน ใบเกิดจากใต้ดิน ดอกประกอบด้วย 2-5 ช่อดอกอยู่ในก้านใบ ช่อดอกมีก้านยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกทยอยบาน มักจะไม่พบดอกตัวเมีย ดอกตัวผู้หนึ่งดอกมีก้านเกสรตัวผู้ 2-3 อัน ผลมีสีเขียวเปลือกบาง ไม่ค่อยมีเมล็ด เปลือกที่ปลูกในฮาวาย นิวกินี และโดมินิกัน สามารถติดเมล็ดได้ ปัจจุบันเปลือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยส่งออกทั้งในรูปหัวเปลือก ก้านเปลือก และใบเปลือก ในปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเปลือกประมาณ 9,162 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 29 จังหวัด ผลผลิตรวมประมาณ 14,774,000 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,997 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยที่ 26 บาทต่อกิโลกรัม แหล่งปลูกเปลือกที่สำคัญได้แก่ กระจับปี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ และตรัง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) Resistant Starch (RS) หรือแป้งทนย่อย คือแป้งที่ไม่สามารถย่อยโดยเอนไซม์ α -1,4 amylase ที่มีอยู่ในกระเพาะลำไส้เล็กของมนุษย์ แต่จะผ่านไปในส่วนลำไส้ใหญ่และถูกหมักโดยจุลินทรีย์ได้กรดไขมันสายสั้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับใยอาหาร (dietary fiber) ที่มีบทบาทในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เปลือกหอมมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก (Prebiotics) สารพรีไบโอติก คือ สารที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหาร มีประโยชน์คือ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากเปลือกหอมมีปริมาณของแป้งทนย่อย (resistant starch) อยู่สูง ซึ่งไม่ถูกย่อยและดูดซึมภายในลำไส้เล็กแต่จะถูกหมักโดยจุลินทรีย์ภายในลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดกรดไขมันสายสั้นได้แก่ อะซีเตท บิวทีเรท และโพรพิโอเนต โดยกรดไขมันนี้จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร (Sajilata *et al.*, 2006) เปลือกมีปริมาณแป้งทนย่อยสูงประมาณร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับแป้งทนย่อยจากอุตสาหกรรม

พันธุ์เหือกที่เกษตรกรปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นมีผลผลิตต่ำ แตกหน่อข้างมากทำให้ผลผลิตต่ำ คุณภาพของหัวไม่ตรงกับความต้องการของตลาดทั่วไป ไม่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง เช่น โรคใบไหม้ หรือโรคใบจุดตาเสือ โรคหัวเน่า หนอนกระทุ้ผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และไรแดง มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 6 เดือน บางพันธุ์ปลูกได้ดีในที่ดอนหรือสภาพไร่ บางพันธุ์ปลูกได้ดีในสภาพที่ลุ่ม ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง เหือกพันธุ์พิจิตร 1 มีกลิ่นหอม เนื้อมีสีขาวปนม่วง แต่ไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ ทรงต้นสูงทำให้ดูแลรักษายาก การปรับปรุงพันธุ์เหือกโดยวิธีการใช้การผสมเกสรทำได้ยาก เพราะสายพันธุ์เหือกที่ปลูกในประเทศไทยออกดอกยาก ทำให้ต้องหาวิธีการอย่างอื่นสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เหือก การใช้รังสีเพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (mutation) เป็นวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่ทำให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ได้พันธุ์ใหม่ ผลผลิตมีคุณภาพดี เหมาะสมสำหรับการรับประทานและแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรศึกษาการปรับปรุงพันธุ์เหือกพันธุ์พิจิตร 1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. Cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อให้ได้พันธุ์เหือกที่มีลักษณะทรงต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคใบไหม้ อายุเก็บเกี่ยวสั้น เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และผลผลิตมีคุณภาพการบริโภคดี

7. วิธีดำเนินการ

อุปกรณ์

1. เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเหือกพันธุ์พิจิตร 1
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16, 13-13-21, 46-0-0
3. สารควบคุมการเจริญเติบโต
4. สารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
5. กระถางพลาสติก
6. วัสดุปลูก vermiculite + พีทมอส
7. เครื่องฉายรังสีแกมมา Mark I (แบบเฉียบพลัน)
8. อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล

วิธีการ

แบบและวิธีการทดลอง

ปรับปรุงพันธุ์เหือกพันธุ์พิจิตร 1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ มี 5 กรรมวิธี ประกอบด้วยปริมาณรังสีแกมมาที่ 0 5 10 15 และ 20 เกรย์

วิธีปฏิบัติการทดลอง

1. ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนของปลายยอดเหือกหอมพันธุ์พิจิตร 1 ในอาหารสูตร Murashige and Skoog medium (1962) ที่ใส่ฮอร์โมน IAA 10 mg L⁻¹ เมื่อต้นอ่อนปลอดเชื้อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 6 - 8 สัปดาห์ นำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมา Gamma Irradiator Mark I ในปริมาณ 0 5 10 15 และ 20 เกรย์ ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การตาย เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต และหาค่าปริมาณรังสีที่ทำให้พืชตาย 50% (50% lethal dose : LD₅₀)

2. เมื่อดันอ่อนที่เลี้ยงขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อมีสภาพต้นแข็งแรงพร้อมที่จะย้ายปลูก นำต้นเผือกออก จากขวดเพื่อปลูกในภาชนะที่ใช้วัสดุปลูก vermiculite + พีทมอส อัตราส่วน 1:1

3. ย้ายต้นกล้าเผือกลงปลูกลงในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ปฏิบัติดูแลรักษาจนกระทั่งเก็บ เกี่ยว บันทึกข้อมูลด้านโรค แมลงศัตรูพืช ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต จำนวนหน่อต่อต้น ขนาดหัว จำนวนหัว น้ำหนักหัว รูปทรงของหัว สีของเนื้อ คุณภาพการบริโภค และลักษณะกลายพันธุ์ต่างๆ

4. คัดเลือกพันธุ์จนถึงรุ่น M_6 บันทึกข้อมูลด้านโรค แมลงศัตรูพืช ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต จำนวนหน่อ ต่อต้น ขนาดหัว จำนวนหัว น้ำหนักหัว รูปทรงของหัว สีของเนื้อ และคุณภาพการบริโภค

5. ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ single seed descent

การบันทึกข้อมูล

1. เปอร์เซ็นต์การตาย เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
2. ค่าปริมาณรังสีที่ทำให้พืชตาย 50% (50% lethal dose : LD_{50})
3. ข้อมูลด้านโรคและแมลงศัตรูพืช
4. ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น เส้นรอบวงโคนต้น จำนวนหน่อต่อต้น ระยะห่างของหน่อ จำนวนลูกขอ ขนาดหัว และน้ำหนักหัว

5. รูปทรงของหัว ลักษณะรูปทรงของหัวเผือกมีดังนี้ (IPGRI, 1999)

- Conical
- Round
- Cylindrical
- Elliptical
- Dumb-bell
- Elongated
- Flat and multifaced
- Clustered

6. สีของเนื้อ ลักษณะสีของเนื้อมีดังนี้ (IPGRI, 1999)

- ขาว
- เหลือง
- ส้ม
- ชมพู
- แดง
- แดงม่วง
- ม่วง
- ไม่สม่ำเสมอ

7. คุณภาพการบริโภคของเนื้อเห็ดที่ผ่านการนึ่ง (100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาที) โดยให้คะแนน ด้านเส้นใย รสชาติ ความหวาน และความนิยมของผู้บริโภค จำนวนคนที่ใช้ทดสอบ 10 คน (N = 10) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

- ความหอม : หอม (1 คะแนน) และไม่หอม (2 คะแนน)
- เส้นใย : น้อย (1 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และมาก (3 คะแนน)
- ความหวาน : ไม่หวาน (1 คะแนน) หวานน้อย (2 คะแนน) หวานปานกลาง (3 คะแนน) และหวานมาก (4 คะแนน)
- ความนิยมของผู้บริโภค : น้อยที่สุด (1 คะแนน) เล็กน้อย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน)

8. ข้อมูลด้านโรคและแมลงศัตรูเห็ด

วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง

วิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีด้วยวิธี DMRT (Duncan's New Multiple Range Test)

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

เริ่มต้น ตุลาคม 2557 สิ้นสุด กันยายน 2563

ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จำนวน 1 แปลง

8. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนของปลายยอดของเห็ดหอมพันธุ์พิจิตร1 ในอาหารสูตร Murashige and Skoog medium (1962) นำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมา Gamma Irradiator Mark I ทำการปลูกคัดเลือกพันธุ์จนถึงรุ่น M_6 แล้วทำการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ในแปลงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร มีผลการทดลองดังนี้

ผลของรังสีแกมมาต่อการรอดชีวิตของต้นเห็ดในสภาพปลอดเชื้อ


หลังจากดำเนินการฉายรังสีแกมมาเห็ดหอมพันธุ์พิจิตร1 ในสภาพปลอดเชื้อ 30 วันทำการตรวจสอบการรอดชีวิตพบว่า เมื่อระดับปริมาณการฉายรังสีเพิ่มขึ้นทำให้มีผลต่อการตายของต้นเห็ดมากขึ้น เมื่อทำการตรวจสอบจำนวนต้นที่รอดชีวิตพบว่า ระดับปริมาณรังสีที่ 5 เกรย์ พบต้นเห็ดมีจำนวนต้นที่รอดชีวิตมากที่สุดที่ 33 ต้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 78.6 เปอร์เซ็นต์ (ความอยู่รอดคิดเป็น 80.5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี) รองลงมาเป็นระดับปริมาณรังสีที่ 10 เกรย์ ที่พบต้นเห็ดมีจำนวนต้นที่รอดชีวิตที่ 32 ต้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 76.2 เปอร์เซ็นต์ (ความอยู่รอดคิดเป็น 78.0 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ไม่ได้รับการ

ฉายรังสี) โดยที่ระดับปริมาณรังสีที่ 15 และ 20 เกรย์ พบว่า ต้นเผือกที่ได้รับการฉายรังสีแกมมาตายเกือบทุกต้น โดยพบต้นเผือกที่รอดชีวิตเท่ากับที่ 1 ต้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 2.38 เปอร์เซ็นต์ (ความอยู่รอดคิดเป็น 2.44 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี) (ตารางที่ 1) ระดับปริมาณรังสีที่ใช้ชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ มีผลต่อการรอดชีวิตของต้นเผือกในสภาพปลอดเชื้อ เห็นได้จากการฉายรังสีในระดับปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลให้การรอดชีวิตของต้นเผือกในสภาพปลอดเชื้อลดลง สอดคล้องกับสุพิชชาและคณะ (2561) ที่รายงานไว้ว่า ระดับปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อลดลง

ตารางที่ 1 จำนวนต้นที่รอดชีวิต เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต และความอยู่รอดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสีของต้นเผือกในสภาพปลอดเชื้อ ที่เป็นผลจากการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร 1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2563

ปริมาณรังสี (เกรย์)	จำนวนต้นที่ใช้ทำการทดลอง (ต้น)	จำนวนต้นที่รอดชีวิตทั้งหมด (ต้น)	เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต (เปอร์เซ็นต์)	ความอยู่รอดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี (เปอร์เซ็นต์)
0	42	41	97.6	100
5	42	33	78.6	80.5
10	42	32	76.2	78.0
15	42	1	2.38	2.44
20	42	1	2.38	2.44

ทำการหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมเพื่อหาค่า LD₅₀ หรือค่าปริมาณรังสีที่ทำให้พืชตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (50% lethal dose : LD₅₀) โดยให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเป็นแกน Y และระดับปริมาณรังสีเป็นแกน X พบว่า ที่ระดับปริมาณรังสี 11.7 เกรย์ ส่งผลให้ต้นเผือกมีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1) พืชแต่ละชนิดมีความไวต่อรังสี (radiosensitivity) แตกต่างกัน ลักษณะความไวหรือการต้านทานต่อรังสีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การพิจารณาการใช้ปริมาณรังสีในปริมาณที่เหมาะสม สามารถคาดคะเนปริมาณรังสีที่เหมาะสมโดยทำการทดลองเพื่อหาค่า LD₅₀ (50% lethal dose : LD₅₀) หรือ GR₅₀ (50% Growth Reduction) (สิรินุช, 2540)



ภาพที่ 1 ค่า LD₅₀ หรือค่าปริมาณรังสีที่ทำให้ต้นเหี่ยวตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (50% lethal dose : LD₅₀)

ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากผลของรังสีแกมมาในชั่ว M₁

ในชั่ว M₁ พบลักษณะผิดปกติที่เป็นผลมาจากการฉายรังสีแกมมา 2 ลักษณะคือ ลักษณะใบหงิกงอและลักษณะใบต่าง จำนวน 5 สายต้น (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 2 ลักษณะใบหงิกงอ (ซ้าย) และลักษณะใบต่าง (ขวา) ที่เป็นผลจากการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร 1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. Cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ในชั่ว M₁

จากการปลูกและคัดเลือกพันธุ์จนถึง M₆ คัดเลือกพันธุ์เผือกไว้ 2 สายต้นสำหรับนำไปปลูกทดสอบพันธุ์ และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของพันธุ์เผือกที่คัดเลือกได้จากการปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพืชไร่ ในด้านความสูงต้น เส้นรอบวงโคนต้น จำนวนหน่อ ระยะห่างของหน่อ จำนวนลูกขอ ความกว้างและความยาวของหัว ผลผลิต และคุณภาพการบริโภค มีผลการทดลองดังนี้

ความสูงต้น เฝือกแต่ละสายต้นมีความสูงต้นแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 มีความสูงต้นไม่แตกต่าง ($p > 0.05$) กับ THA001-5-8-44-2-2 (76.0 เซนติเมตร) แต่มีความสูงต้นเตี้ยกว่า ($p \leq 0.05$) พันธุ์พืชไร่1 ซึ่งมีความสูงต้นสูงที่สุด 107 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

เส้นรอบวงโคนต้น เฝือกแต่ละสายต้นมีความกว้างเส้นรอบวงโคนต้นแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 มีเส้นรอบวงโคนต้นกว้างที่สุด 29.2 เซนติเมตร และมากกว่า ($p \leq 0.05$) เฝือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 และพันธุ์พืชไร่1 ที่มีเส้นรอบวง 27.0 และ 24.5 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2) เส้นรอบวงโคนต้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับขนาดของหัวเฝือก ถ้าเส้นรอบวงโคนต้นมีขนาดใหญ่ จะทำให้ขนาดของหัวเฝือกมีขนาดใหญ่ตามเส้นรอบวงโคนต้นไปด้วย

จำนวนหน่อ เฝือกแต่ละสายต้นมีจำนวนหน่อแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 และ THA001-5-8-44-2-2 มีจำนวนหน่อต่อต้นไม่แตกต่างกัน ($p > 0.05$) มีจำนวนหน่อเท่ากับ 2.00 หน่อ แต่มีจำนวนหน่อต่อต้นน้อยกว่า ($p \leq 0.05$) พันธุ์พืชไร่1 ที่มีจำนวนหน่อต่อต้น 7.00 หน่อ (ตารางที่ 2) จำนวนหน่อจะมีปฏิสัมพันธ์กับขนาดของหัวเฝือก ถ้าหน่อเยอะจะมีผลต่อการแก่งแย่งธาตุอาหารที่ไปสร้างหัว ทำให้หัวเฝือกมีขนาดเล็กลงได้

ระยะห่างของหน่อ เฝือกแต่ละสายต้นมีระยะห่างของหน่อแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 มีระยะห่างของหน่อไม่แตกต่าง ($p > 0.05$) กับสายต้น THA001-5-8-9-2-2 แต่มีระยะห่างของหน่อห่างกว่า ($p \leq 0.05$) พันธุ์พืชไร่1 ที่มีระยะห่างของหน่อ 4.25 (ตารางที่ 2) ระยะห่างของหน่อกว้าง เวลาเพาะเอาลูกขอออกจะไม่ทำให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของหัวเฝือก

จำนวนลูกขอ เฝือกแต่ละสายต้นมีจำนวนลูกขอไม่แตกต่างกัน ($p > 0.05$) จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 และพืชไร่1 มีจำนวนลูกขอน้อยที่สุดเท่ากับ 5.00 หัว และไม่แตกต่าง ($p > 0.05$) กับเฝือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ความสูงต้น เส้นรอบวงโคนต้น จำนวนหน่อ ระยะห่างของหน่อ และจำนวนลูกขอ ที่เป็นผลจากการปรับปรุงพันธุ์เฝือกพันธุ์พืชไร่1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. Cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืชไร่ ปี 2557-2563

สายต้น	ความสูงต้น (ซม.)	เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)	จำนวนหน่อ (หน่อ)	ระยะห่างของหน่อ (ซม.)	จำนวนลูกขอ (หัว)
THA001-5-8-9-2-2	77.0 b	29.2 a	2.00 b	8.50 ab	5.00
THA001-5-8-44-2-2	76.0 b	27.0 b	2.00 b	9.00 a	6.00
พืชไร่1 (check)	107 a	24.5 c	7.00 a	4.25 bc	5.00
F-test	*	*	*	*	ns
CV. (%)	5.34	2.55	44.1	37.3	30.0

หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมัน 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT

^{ns} ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

ความกว้างและความยาวของหัว เฝือกทุกสายต้นมีความกว้างของหัวไม่แตกต่างกัน ($p > 0.05$) โดยเฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 และ THA001-5-8-44-2-2 มีความกว้างของหัว 10.2 และ 11.5 เซนติเมตรตามลำดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์พิจิตร1 ที่มีความกว้างของหัวที่ 10.4 เซนติเมตร ขณะที่เฝือกทุกสายต้นมีความยาวของหัวแตกต่างกัน ($p \leq 0.05$) เฝือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 มีความยาวของหัวยาวที่สุด 18.2 เซนติเมตร ความยาวหัวยาวกว่า ($p \leq 0.05$) เฝือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 และพันธุ์พิจิตร1 (16.5 และ 17.1 เซนติเมตร ตามลำดับ) (ตารางที่ 3)

รูปร่างของหัวและสีของเนื้อ เฝือกทุกสายต้นเมื่อนำมาวัดขนาดความกว้างและความยาวของหัว และดูรูปร่างจากลักษณะภายนอกพบว่า เฝือกทุกสายต้นมีรูปร่างของหัวแบบรูปไข่ (elliptical) ในขณะที่สีของเนื้อพบว่า เฝือกทุกสายต้นเนื้อจะมีสีม่วง (purple) (ตารางที่ 3; ภาพผนวก 1) เฝือกที่เนื้อมีกลิ่นหอมส่วนใหญ่ลักษณะสีของเนื้อจะมีสีม่วง

ผลผลิต เฝือกแต่ละสายต้นให้ผลผลิตต่อไร่แตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เฝือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 ให้ผลผลิตมากที่สุด 4,109 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่าง ($p > 0.05$) กับสายต้น THA001-5-8-9-2-2 แต่สายต้น THA001-5-8-44-2-2 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า ($p \leq 0.05$) พันธุ์พิจิตร1 (ตารางที่ 3)

คุณภาพการบริโภค เฝือกหอมเมื่อนำมาทดสอบคุณภาพพื้นฐานโดยการนึ่ง สังเกตเส้นใย ความหอม ความหวาน และความนิ่มของผู้บริโภคพบว่า เฝือกหอมทุกสายต้นให้ความหอม มีความหวานเล็กน้อย (คะแนน 2 จาก 4) มีเส้นใยเล็กน้อย (คะแนน 1 จาก 3) และจากการให้ผู้บริโภคได้รับประทานพบว่า ผู้บริโภคนิยมเฝือกหอมทุกสายต้นโดยได้คะแนน 4 (จาก 5 คะแนน) หรือได้รับความนิ่มมาก (ตารางที่ 3) ความหอมจะมีปฏิสัมพันธ์กับความนิ่มของผู้บริโภค เฝือกหอมเมื่อนึ่งให้สุกแล้ว เนื้อเฝือกนอกจากมีความหอมแล้วยังมีความร่วนคลุ ทำให้ได้รับความนิ่มในการบริโภค

ตารางที่ 3 ความกว้างของหัว ความยาวของหัว ผลผลิต รูปทรงของหัว สีของเนื้อ และคุณภาพการบริโภค ที่เป็นผลจากการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2563

สายต้น	ขนาดของหัว		ผลผลิต (กก./ไร่)	รูปทรงของหัว	สีของเนื้อ	คุณภาพการบริโภค (คะแนน)
	ความกว้าง (ซม.)	ความยาว (ซม.)				
THA001-5-8-9-2-2	10.2	16.5 b	3,945 a	รูปไข่	สีม่วง	4
THA001-5-8-44-2-2	11.5	18.2 a	4,109 a	รูปไข่	สีม่วง	4
พิจิตร1 (check)	10.4	17.1 b	3,114 b	รูปไข่	สีม่วง	4
F-test	ns	*	*			
CV. (%)	5.77	4.04	6.13			

หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT
 ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

จากผลของการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. Cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ดำเนินงานโดยการปลูกคัดเลือกและทดสอบสายต้นเผือกโดยมีเผือกพันธุ์พิจิตร1 เป็นพันธุ์ควบคุม มีดังนี้

ค่า LD₅₀ หรือค่าปริมาณรังสีที่ทำให้พืชตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (50% lethal dose : LD₅₀) อยู่ที่ระดับปริมาณรังสี 11.7 เกรย์

เผือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 ให้เส้นรอบวงโคนต้นกว้างกว่าสายต้น THA001-5-8-44-2-2 และพันธุ์พิจิตร1 จำนวนหน่อต่อต้นน้อยกว่าพันธุ์พิจิตร1 เผือกสายต้น THA001-5-8-9-2-2 และ THA001-5-8-44-2-2 ให้ระยะห่างของหน่อห่างกว่าพันธุ์พิจิตร1 เผือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์อื่นๆ คือ 4,109 กิโลกรัมต่อไร่

10. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. Cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ สามารถเสนอเผือกสายต้น THA001-5-8-44-2-2 เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ และสามารถนำองค์ความรู้สายต้นเผือกหอมพันธุ์แนะนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตจังหวัดพิจิตรและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ส่งเสริมให้เกษตรกรนำสายต้นเผือกหอมพันธุ์แนะนำไปปลูก ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้

11. คำขอบคุณ (ถ้ามี)

12. เอกสารอ้างอิง

- กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช. แหล่งที่มา: www.doae.go.th, 23 มกราคม 2563.
- ธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริและเตือนใจ โก้สกุล. 2549. ผลของรังสีแกมมาต่ออกลีอกซิเนีย (*Sinningia speciosa*). ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์ (Section T) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 13-23.
- มาลินี พิทักษ์, สมศรี บุญเรือง, และรังสิมันต์ สัมฤทธิ์. 2537. การปลูกเผือก. กลุ่มพืชไร่ กองส่งเสริมพืชไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ. 22 หน้า.
- วิชัย ภูริปัญญวานิช, วิไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ และกนกพร บุญศิริชัย. 2550. ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์พริก. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 10. แหล่งที่มา: <http://www.nst.or.th/nstconf/nst/nst10/BA/BA02.pdf>, 3 มกราคม 2555.
- สิรินุช ลามศรีจันทร์. 2540. การกลายพันธุ์ของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 262 หน้า.
- Josue Jack., Farin Malamug., Susumu Yazawa and Tadashi Asahira. 1993. Morphological variants induced from shoot tips of taro (*Colocasia esculenta* (L.) Schott) treated with gamma radiation. [Online] Available: [www.sciencedirect.com/science /.../0304423894901317](http://www.sciencedirect.com/science/.../0304423894901317). May 3, 2012.
- Sajilata M.G, Rekha S. Singhal, and Pushpa R. Kulkarni. 2006. Resistant Starch—A Review. Institute of Food Technologists. Vol. 5, November 20, 2006.
- Seetohul, S., V. Maunkee and M. Gungadurdoss. 2009. Improvement of Taro (*Colocasia esculenta*) Through In Vitro Mutagenesis. Plant Mutations in the Genomics Era. pp 296-299.

13. ภาคผนวก



ภาพผนวก 1 ลักษณะเนื้อสีเหลืองและรูปร่างของหัวเผือกแบบรูปไข่ (unbranched conical) ของเผือกสายต้น
THA001-5-8-44-2-2



ภาพผนวก 2 แปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์เผือกพันธุ์พิจิตร 1 (*Colocasia esculenta* (L.) Schott. cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร