

## รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่ลิ้นสุด

1. แผนงานวิจัย

: -

2. โครงการวิจัย

: วิจัยพัฒนาพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมทาง

กิจกรรม

: -

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

: -

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)

: การปรับปรุงพันธุ์งาขาวเพื่อผลผลิตสูงชุดปี 2556 : การเปรียบเทียบในไร่  
เกษตรกร

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : White Sesame Varietal Improvement for High Yield Series 2013 :

Farm Trial

4. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าการทดลอง

: สาคร รจนัย

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

ผู้ร่วมงาน

: นภพร คำนวนทิพย์

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ปริยพัชร ทองมั่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

สมใจ โควสุรัตน์

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

ชำรัง เชือกิตติศักดิ์

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

จุ่วรัตน์ หวังเป็น

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

มลุตี สิทธิชา

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

สมหมาย วงศ์

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

5. บทคัดย่อ

: ขั้นตอนการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์งาขาวให้ได้ผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี โดยปลูกงาขาวที่คัดเลือกได้จากขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐาน 7 สายพันธุ์ ร่วมกับงาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ 2 สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ได้แก่สายพันธุ์ PWS56-5-4-8 (104 กก./ไร่) และสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 (102 กก./ไร่) และเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 44% ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ยสูงกว่าและมีผลผลิตเฉลี่ยใกล้เคียงกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ 2 สายพันธุ์ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนอกจากนี้ทั้ง 2 สายพันธุ์ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด

เชียงใหม่ และจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 ยังสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ดี สมควรคัดเลือกและแนะนำแก่เกษตรกรต่อไป

คำสำคัญ : งานวิชา พันธุ์ การเปรียบเทียบในเรื่องการเพิ่มผลผลิต

**ABSTRACT** : Improvement of White sesame variety, series 2013 for high yield at Farm trial level. The objectives are improving of white sesame variety for high yield and selecting the variety that well adapted environment. Seven lines of white sesame from Standard trial were selected and Ubon Ratchathani 2 (UB2) was a check variety. The experiment was conducted in early and late rainy season of 2019-2020 in Ubon Ratchathani, Chiangmai and Loei Province. The experimental design was a randomized complete block (RCB) with eight treatments and four replications. The Plant type, yield, 1,000 seeds, weight, number of pods per plant and seed yield were recorded. The result showed two lines were high yield: PWS56-5-4-8 line was 104 kg/rai and PWS56-5-3-6 line was 102 kg/rai. Both lines had the average yield close to UB2. However, both lines had an average percentage of sesame oil greater (44%) than UB2. A visual assessment of disease was examined. There was not bacterial blight in both lines. While UB2 found the disease that was causing the damage. In addition, both lines were able to adapt and grow well in farm trial at three locations. Especially, PWS56-5-3-6 adapted well in dry conditions. As the result, PWS56-5-3-6 should be the line that was selected and recommended to farmers.

**Keyword :** white sesame, variety, farm trial, yield improvement

**6. คำนำ** : งานเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการการดูแลรักษาน้อย และใช้ปัจจัยการผลิตต่ำ เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ก่อน และหลังการปลูกพืชหลัก แต่พื้นที่ปลูกมากของประเทศไทยลดลง ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความแปรปรวนตามสภาพภูมิอากาศ ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 17,196 ไร่ แต่เก็บเกี่ยวได้เพียง 16,298 ไร่ ผลผลิตรวม 2,202.7 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 167.9 กก./ไร่ ส่วนใหญ่เป็นงานแดงพื้นที่ปลูก 12,667 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.6 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย 132 กก./ไร่ ปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ จำกัดพื้นที่ปลูก 3,970.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย 135 กก./ไร่ ปลูกมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ชัยนาท สุโขทัย และลพบุรี ส่วนงานขาวพื้นที่ปลูก 558.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย 237 กก./ไร่ ปลูกมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) การปลูกงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังเป็นงานแดง และจำกัด แหล่งปลูกงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และลพบุรี รองลงมา คือ ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตรวมทั้งประเทศนับว่า

น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี, 2561) ทั้งที่เป็นพืชที่มีราคาค่อนข้างสูง และทำรายได้ให้กับเกษตรกรสูงกว่าพืชหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากซึ่งมีราคาสูง แต่พื้นที่ปลูกงานชนิดนี้กลับมีเพียงร้อยละ 3.4 ของพื้นที่ปลูกงานทั้งหมด ดังนั้น แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางให้เพียงพอ กับความต้องการของตลาด ทำได้โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

## 7. วิธีดำเนินการ :

### - อุปกรณ์

- เมล็ดงาขาวสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 7 สายพันธุ์
- เมล็ดพันธุ์ขาวพันธุ์รับรอง พันธุ์อุบลราชธานี 2
- วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 16-16-8
- สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช
- อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงไอล์ฟลาก ถุงตาข่ายในลอน ผ้าฟาง เชือกฟาง Tag พลาสติก กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ถادสังกะสี

### - วิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ชั้้า ปลูกขาว จำนวน 8 พันธุ์/สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์อุบลราชธานี 2 เป็นพันธุ์ตรวจสอบ ขนาดแปลงย่อย 4x6 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 3x6 เมตร ปลูกแบบรอยเป็นแท่ง ระยะระหว่างแท่ง 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 10 เซนติเมตร เมื่อ jong ก่อประมาณ 2 สัปดาห์ ถอนแยกให้มีต้นงามห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร และเมื่อ茄อายุประมาณ 15-20 วันหลังออก ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูฯ เมื่อมีการระบาดตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยว.when เมื่อมีฝักงอกบนต้นสุดแก่ ฝักเปลี่ยนเป็นสีเหลืองประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของฝักงอกทั้งหมด

### - การบันทึกข้อมูล

- วันปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว
- ความสูงต้น ความสูงข้อแรกที่ติดฝัก โดยสุ่มจาก 10 ต้น
- จำนวนฝักต่อต้น จำนวนกิ่งต่อต้น จำนวนข้อที่ติดฝักโดยสุ่มจาก 10 ต้น
- น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่

### - การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทุกองค์ประกอบผลผลิต ด้วยการวิเคราะห์ Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan's Multiple Range Test

### - เวลาและสถานที่

ไร่เกษตรกร ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีรธรรมศ์ จ.อุบลราชธานี ต้นและปลายฤดูฝน ปี 2562-2563

ไร่เกษตรกร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ต้นและปลายฤดูฝน ปี 2562-2563

ไร่เกษตรกร ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ต้นและปลายฤดูฝน ปี 2562-2563

## 8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :

ปี 2562

### ต้นฤดูฝน

ผลการเปรียบเทียบพันธุ์งาขาว 8 พันธุ์/สายพันธุ์ เป็นงาขาวสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐาน จำนวน 7 สายพันธุ์ ร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์อุบลราชธานี 2 ดำเนินการที่ไร่เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย ผลการทดลองดังนี้

ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อต้น โดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 77-143 กก./ไร่ สายพันธุ์ PWS56-5-3-26 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (143 กก./ไร่) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.77-3.78 กรัม พันธุ์อุบลราชธานี 2 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด (3.78 กรัม) จำนวนฝักอยู่ระหว่าง 29-56 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักต่อต้นมากที่สุด (56 ฝัก) จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-0.7 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-5-3-26 มีแนวโน้มมีจำนวนกิ่งมากที่สุด (0.7 กิ่ง) สำหรับความสูงต้น พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความสูงอยู่ระหว่าง 136-166 เซนติเมตร สายพันธุ์ PWS56-5-4-8 มีความสูงต้นสูงที่สุด 166 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-5-24 PWS56-3-3-6 PWS56-5-3-26 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 161-154 เซนติเมตร และไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยมีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 28,000-32,667 ต้นต่อไร่ (Table 1)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อต้น โดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 122-216 กก./ไร่ โดยพันธุ์อุบลราชธานี 2 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (216 กก./ไร่) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.60-3.20 กรัม โดยพบร้า มี 7 พันธุ์/สายพันธุ์ มีน้ำหนักเมล็ดมากที่สุด (2.93-3.15 กรัม) จำนวนฝักต่อต้น อยู่ระหว่าง 60-123 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักต่อต้นมากที่สุด (123 ฝัก) จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-0.7 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-5-3-26 มีแนวโน้มมีจำนวนกิ่งมากที่สุด (0.7 กิ่ง) สำหรับความสูงต้น พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 176-200 เซนติเมตร สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 มีความสูงต้นสูงที่สุด (200 เซนติเมตร) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ 5 พันธุ์/สายพันธุ์ มีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 187-195 เซนติเมตร และไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยมีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 30,667-32,000 ต้นต่อไร่ (Table 2)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเลย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ดโดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 18-90 กก./ไร่ โดยสายพันธุ์ PWS56-5-4-8 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (90 กก./ไร่) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.60-3.44 กรัม โดยมี 4 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์อุบลราชธานี 2 สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 PWS56-5-4-8 และ PWS56-5-3-6 มีน้ำหนักเมล็ดมากที่สุด 3.44 3.38

3.35 และ 3.33 กรัม ตามลำดับ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจำนวนฝักต่อตัน โดยจำนวนฝักต่อตันอยู่ระหว่าง 54-79 ฝัก จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-2.1 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-5-4-3 มีแนวโน้มมีจำนวนกิ่งมากที่สุด (2.1 กิ่ง) สำหรับความสูงต้น พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงต้น อยู่ระหว่าง 124-161 เซนติเมตร สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 พันธุ์อุบลราชธานี 2 และ PWS56-3-3-6 มีความสูงต้นสูงที่สุด 161 161 และ 160 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 และ PWS56-5-4-8 มีความสูงต้น 153 และ 151 เซนติเมตร ตามลำดับ และไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยมีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 16,867-24,022 ตันต่อไร่ (Table 3)

### ปลายฤดูฝน

ที่เรือเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อตัน และจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 28-56 กก./ไร่ สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (56 และ 52 กก./ไร่ ตามลำดับ) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.17-3.99 กรัม พันธุ์อุบลราชธานี 2 และสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีน้ำหนักเมล็ดมากที่สุด (2.99 และ 2.96 กรัม ตามลำดับ) จำนวนฝักอยู่ระหว่าง 17-24 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักต่อตันมากที่สุด (24 ฝัก) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 สายพันธุ์ PWS56-5-4-8 และ PWS56-5-3-6 มีจำนวนฝัก 22 20 และ 19 ฝัก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากผลผลิตน้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อตัน จะพบว่า มีค่าน้อยกว่าต้นฤดูฝนค่อนข้างมาก เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนเกิดพายุมีฝนตกติดต่อ กันหลายวัน ทำให้ต้นง乍ะจักการเจริญเติบโตและเสียหายจากพายุ จำนวนกิ่ง อยู่ระหว่าง 0.0-0.5 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-3-3-6 มีแนวโน้มมีจำนวนกิ่งมากที่สุด (0.5 กิ่ง) จำนวนต้นเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่าง 19,081-26,756 ตันต่อไร่ โดยสายพันธุ์ PWS56-3-3-6 มีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวมากที่สุด 26,756 ตันต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ 4 พันธุ์/สายพันธุ์ มีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 22,252-25,807 ตันต่อไร่ สำหรับความสูงต้นไม่พบความแตกต่าง กันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 74-80 เซนติเมตร (Table 4)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อตัน โดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 128-201 กก./ไร่ โดยพันธุ์อุบลราชธานี 2 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (201 กก./ไร่) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-4-8 (173 กก./ไร่) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 3.00-3.38 กรัม โดยพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 3.38 กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-4-8 (3.20 กรัม) จำนวนฝักต่อตันอยู่ระหว่าง 58-80 ฝักสายพันธุ์ PWS56-5-3-26 และ PWS56-5-4-3 มีจำนวนฝักต่อตันมากที่สุด 80 และ 78 ฝัก ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-3-1-38 (76 ฝัก) จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-0.7 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-3-3-6 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด (0.7 กิ่ง) สำหรับความสูงต้นไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 146-153 เซนติเมตร และไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยมีจำนวนต้นเก็บเกี่ยว 32,000 ตันต่อไร่ (Table 5)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเลย พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนฝักต่อต้น และจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยผลผลิตอยู่ระหว่าง 97-132 กก./ไร่ โดยสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (132 กก./ไร่) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 PWS56-5-4-8 และ PWS56-3-3-8 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 126-111 กก./ไร่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.50-3.24 กรัมโดยพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 3.24 กรัม จำนวนฝักต่อต้นอยู่ระหว่าง 32-50 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักต่อต้นมากที่สุด 50 ฝัก จำนวนต้น เก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 33,756-40,022 ต้นต่อไร่ โดยสายพันธุ์ PWS56-3-3-6 มีจำนวนต้นเก็บเกี่ยมมากที่สุด (40,022 ต้นต่อไร่) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-4-3 (37,200 ต้นต่อไร่) จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-0.4 กิ่ง และไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของความสูงต้นอยู่ระหว่าง 125-130 เซนติเมตร (Table 6)

ผลผลิตเฉลี่ยของต้นถูกน ทั้ง 3 สถานที่ ได้แก่ ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเลย พบร้า พันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (135 กก./ไร่) รองลงมา ได้แก่ PWS56-5-4-8 และ PWS56-3-1-38 มีผลผลิตเฉลี่ย 125 และ 118 กก./ไร่ ตามลำดับ และจะเห็นว่า ที่ไร่ เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ขาข้าวเกือบทุกสายพันธุ์สามารถปรับตัวและเริ่มเติบโตได้ดีกว่าที่ไร่เกษตรกรจังหวัด อุบลราชธานี และจังหวัดเลย และมีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูงกว่า (Table 7)

ผลผลิตเฉลี่ยของปลายถูกน ทั้ง 3 สถานที่ ได้แก่ ไร่เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเลย พบร้า พันธุ์อุบลราชธานีซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (126 กก./ไร่) รองลงมา ได้แก่ PWS56-5-3-6 และ PWS56-5-4-8 มีผลผลิตเฉลี่ย 111 และ 110 กก./ไร่ ตามลำดับ และเช่นเดียวกับต้นถูกน พบว่า ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ขาข้าวเกือบทุกสายพันธุ์สามารถปรับตัวและเริ่มเติบโตได้ดีกว่าที่ไร่เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย และมีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 สามารถปรับตัวและเริ่มเติบโตได้ดี โดยที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 ให้ผลผลิตสูงที่สุด มีผลผลิต 56 และ 132 กก./ไร่ ตามลำดับ (Table 7)

ผลผลิตเฉลี่ยของต้นและปลายถูกน ทั้ง 3 สถานที่ พบร้า พันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้ ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (131 กก./ไร่) รองลงมา ได้แก่ PWS56-5-4-8 PWS56-5-3-6 และ PWS56-3-1-38 มีผลผลิต เฉลี่ย 118 109 และ 106 กก./ไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 7) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ซึ่งเป็น องค์ประกอบที่สำคัญ พบสายพันธุ์ที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้ผลผลิต และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 2 สายพันธุ์ คือ PWS56-3-1-38 (106 กก./ไร่) มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 47.3% และ PWS56-5-3-26 (103 กก./ไร่) มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 45.7% ขณะที่พันธุ์อุบลราชธานี 2 มีผลผลิตเฉลี่ย 131 กก./ไร่ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 44.0% (Table 8)

ปี 2563

### ต้นถูกน

ผลการทดลองการเปรียบเทียบพันธุ์งาขาว 8 พันธุ์/สายพันธุ์ เป็นขาข้าวสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากขันตอน การเปรียบเทียบมาตรฐานจำนวน 7 สายพันธุ์ ร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์อุบลราชธานี 2 ดำเนินการ ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย ผลการทดลองดังนี้

ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนฝักต่อต้น และจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยสายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีผลผลิตสูงที่สุด (82 กก./ไร่) แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 และ PWS56-3-3-6 มีผลผลิต 65 และ 59 กก./ไร่ ตามลำดับ สูงกว่าพันธุ์อุบลราชธานี 2 (34 กก./ไร่) เนื่องจากพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีความอ่อนแอก่อโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ระบาดรุนแรงในช่วงต้นฤดูฝน สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด (2.91 กรัม) แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ PWS56-5-5-24 (2.85 กรัม) ซึ่งจากการประเมินด้วยสายตา พบร้า ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ค่อนข้างทนทานต่อโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจึงทำให้เมล็ดไม่เสียหาย สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักต่อต้นมากที่สุด (42 ฝัก) แต่ไม่แตกต่างกับ 4 พันธุ์/สายพันธุ์ มีจำนวนฝัก 31-36 ฝัก จำนวนต้นเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 19,156-40,022 ต้นต่อไร่ สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวยากที่สุด (40,022 ต้นต่อไร่) สำหรับความสูงต้น พบร้า พันธุ์อุบลราชธานี 2 มีความสูงต้นสูงที่สุด (179 เซนติเมตร) แต่ไม่แตกต่างกับ 5 สายพันธุ์ มีความสูงต้น 174-177 เซนติเมตร ขณะที่จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-0.8 กิ่ง โดยสายพันธุ์ PWS56-3-3-6 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด (0.8 กิ่ง) (Table 9)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และจำนวนฝักต่อต้น โดยสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีผลผลิตสูงที่สุด (128 กก./ไร่) แต่ไม่แตกต่างกับ 4 พันธุ์/สายพันธุ์ มีผลผลิต 102-119 กก./ไร่ สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด (3.00 กรัม) แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด 2.88 และ 2.75 กรัม ตามลำดับ สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 และ PWS56-5-3-26 มีจำนวนฝักมากที่สุด (81 ฝัก) จำนวนต้นเก็บเกี่ยว 32,000 ต้นต่อไร่ จำนวนกิ่งอยู่ระหว่าง 0.0-2.9 กิ่ง สายพันธุ์ PWS56-5-3-26 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด (2.9 กิ่ง) (Table 10)

ไร่เกษตรกรจังหวัดเลย พบร้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตน้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนฝักต่อต้น และจำนวนต้นเก็บเกี่ยว โดยสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 PWS56-3-3-6 และ PWS56-5-5-24 มีผลผลิตสูงที่สุด 75 71 และ 71 กก./ไร่ ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 และ PWS56-5-4-8 มีผลผลิต 61 และ 59 กก./ไร่ ตามลำดับ สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 น้ำหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 3.03 และ 3.02 กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีน้ำหนัก 2.87 กรัม สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจำนวนฝักมากที่สุด (84 ฝัก) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 และ PWS56-5-4-8 มีจำนวนฝัก 65 และ 64 ฝัก ตามลำดับ และพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของความสูงต้น โดยสายพันธุ์ PWS56-5-4-8 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีความสูงต้นสูงที่สุด 137 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 5 สายพันธุ์ มีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 122-136 เซนติเมตร จำนวนกิ่ง อยู่ระหว่าง (Table 11)

ผลผลิตเฉลี่ยของต้นฤดูฝน ทั้ง 3 สถานที่ ได้แก่ ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย พบร้า สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (89 กก./ไร่) รองลงมา ได้แก่ PWS56-3-3-6 (82 กก./ไร่) ขณะพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์เบรียบเทียบ มีผลผลิตเฉลี่ย 71 กก./ไร่ และเช่นเดียวกันกับปี 2562 จะเห็นว่า ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จากรากทุกสายพันธุ์สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่ไร่

เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย และมีแนวให้ผลผลิตที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี โดยที่ไร่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย โดยให้ผลผลิตสูงที่สุด ซึ่งมีผลผลิต 128 และ 75 กก./ไร่ ตามลำดับ ส่วนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีผลผลิต 65 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยมีผลผลิต 82 กก./ไร่ (Table 12)

ผลผลิต 2 ปี ทั้ง 3 สถานที่ พบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นเอกภาพ โดยพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด (111 กก./ไร่) เปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 43% รองลงมา ได้แก่ สายพันธุ์ PWS56-5-4-8 มีผลผลิตเฉลี่ย 104 กก./ไร่ มีค่า % relative to check (UB2) เท่ากับ 94 และสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีผลผลิตเฉลี่ย 102 กก./ไร่ เปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 44% มีค่า % relative to check (UB2) เท่ากับ 92 ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ให้ผลผลิต และ % relative to check (UB2) ใกล้เคียงกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 (Table 13)

การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกงานข้าวสายพันธุ์ผลผลิตสูง พบว่า เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุดต่อสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 เนื่องจากมีผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดโตและเมล็ดมีสีขาวสวย สำหรับเกษตรกรจังหวัดเลย มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสายพันธุ์ผลผลิตสูงน้อย เนื่องจากมีความชอบงานข้าวพันธุ์พื้นเมืองเลยที่นิยมบริโภคและมีกลิ่นหอมมากกว่าสายพันธุ์ผลผลิตสูง

## 9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :

สายพันธุ์ PWS56-5-4-8 และ PWS56-5-3-6 เป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ยสูงกว่า และ มีผลผลิตเฉลี่ยใกล้เคียงกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์เบรียบเทียบ และจากการประเมินด้วยสายตาไม่พบราก เกิดโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ นอกจากนี้ ทั้ง 2 สายพันธุ์ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่ไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ PWS56-5-3-6 ยังสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ดี สมควรคัดเลือกและแนะนำแก่เกษตรกรต่อไป

## 10. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:

ได้สายพันธุ์งานข้าวที่ให้ผลผลิตสูง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเพื่อแนะนำเกษตรกรต่อไป

## 11. คำขอคุณ : -

## 12. เอกสารอ้างอิง :

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. รายงานสถิติทางการเกษตร (รต.01). <https://production.doae.go.th/doaservice/report-product-statistic/index>. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563.

ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี. 2561. งานสถานการณ์การผลิตและการตลาด. หน้า 42-43: ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “บูรณาการงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสร้างสรรค์เกษตรไทย” วันที่ 4-6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเช็นทารา ชีวิว รีสอร์ฟ เชาหลักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา. สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงานร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช.

13. ກາຄຜນວກ : -

**Table 1** Yields and yield component in early rainy season, 2019 from farm trial at Ubon Ratchathani Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	120 bc	2.84 de	56 a	136 c	30,667	0.1
2. PWS56-3-3-6	90 de	3.09 cd	29 c	150 b	29,000	0.5
3. PWS56-5-3-6	83 de	3.53 b	34 bc	157 ab	29,667	0.0
4. PWS56-5-3-26	143 a	2.96 cde	42 b	157 ab	28,883	0.7
5. PWS56-5-4-3	124 b	2.77 e	43 b	151 b	32,333	0.4
6. PWS56-5-4-8	117 bc	3.21 c	42 b	166 a	32,667	0.4
7. PWS56-5-5-24	77 e	3.16 c	29 c	161 ab	28,000	0.2
8. UB2	102 cd	3.78 a	36 bc	154 ab	30,667	0.1
<b>Average</b>	<b>107</b>	<b>3.17</b>	<b>39</b>	<b>154</b>	<b>30,229</b>	<b>0.3</b>
<b>CV (%)</b>	<b>11.9</b>	<b>5.2</b>	<b>14.4</b>	<b>5.1</b>	<b>12.0</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 2** Yields and yield component in early rainy season, 2019 from farm trial at Chiangmai Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant Height (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	179 ab	2.93 a	123 a	176 c	32,000	0.2
2. PWS56-3-3-6	157 ab	2.95 a	60 b	191 abc	32,000	0.3
3. PWS56-5-3-6	165 ab	3.20 a	61 b	189 abc	30,667	0.0
4. PWS56-5-3-26	134 b	2.93 a	81 b	187 abc	32,000	0.7
5. PWS56-5-4-3	122 b	2.60 b	69 b	182 bc	32,000	0.5
6. PWS56-5-4-8	168 ab	2.95 a	63 b	195 ab	32,000	0.1
7. PWS56-5-5-24	149 ab	2.98 a	60 b	200 a	31,489	0.1
8. UB2	216 a	3.15 a	69 b	188 abc	32,000	0.1
<b>Average</b>	<b>161</b>	<b>2.96</b>	<b>73</b>	<b>188</b>	<b>31,769</b>	<b>0.2</b>
<b>CV (%)</b>	<b>27.1</b>	<b>6.8</b>	<b>22.2</b>	<b>5.0</b>	<b>3.2</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 3** Yields and yield component in early rainy season, 2019 from farm trial at Loei Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant Height (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	56 bc	2.75 bc	79	134 bc	21,111	0.6
2. PWS56-3-3-6	83 ab	2.94 b	68	160 a	17,378	0.7
3. PWS56-5-3-6	74 ab	3.33 a	64	153 ab	18,489	0.0
4. PWS56-5-3-26	41 cd	2.69 bd	61	124 c	18,378	1.9
5. PWS56-5-4-3	18 d	2.60 c	71	125 c	16,867	2.1
6. PWS56-5-4-8	90 a	3.35 a	56	151 ab	24,022	0.1
7. PWS56-5-5-24	84 ab	3.38 a	54	161 a	17,267	0.1
8. UB2	87 ab	3.44 a	63	161 a	22,934	0.1
<b>Average</b>	<b>67</b>	<b>3.06</b>	<b>64</b>	<b>146</b>	<b>19,556</b>	<b>0.7</b>
<b>CV (%)</b>	<b>29.2</b>	<b>5.7</b>	<b>25.3</b>	<b>9.4</b>	<b>21.9</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 4** Yields and yield component in late rainy season, 2019 from farm trial at Ubon Ratchathani Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	37 b	2.17 c	24 a	74	25,303 ab	0.0
2. PWS56-3-3-6	39 b	2.59 b	17 c	80	26,756 a	0.5
3. PWS56-5-3-6	56 a	2.96 a	19 abc	80	24,681 abc	0.0
4. PWS56-5-3-26	38 b	2.51 b	18 bc	80	25,807 ab	0.1
5. PWS56-5-4-3	28 b	2.46 b	17 c	77	20,355 cd	0.0
6. PWS56-5-4-8	37 b	2.61 b	20 abc	79	21,422 bcd	0.1
7. PWS56-5-5-24	33 b	2.69 b	17 c	79	19,081 d	0.1
8. UB2	52 a	2.99 a	22 ab	80	22,252 a-d	0.0
<b>Average</b>	<b>40</b>	<b>2.62</b>	<b>19</b>	<b>78</b>	<b>23,207</b>	<b>0.1</b>
<b>CV (%)</b>	<b>20.9</b>	<b>6.5</b>	<b>16.6</b>	<b>11.4</b>	<b>12.6</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 5** Yields and yield component in late rainy season, 2019 from farm trial at Chiangmai Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	145 bcd	3.00 b	76 ab	153	32,000	0.3
2. PWS56-3-3-6	136 cd	3.03 b	63 bc	154	32,000	0.7
3. PWS56-5-3-6	144 bcd	3.10 b	59 c	148	32,000	0.0
4. PWS56-5-3-26	169 bc	3.05 b	78 a	152	32,000	2.0
5. PWS56-5-4-3	128 d	3.10 b	80 a	146	32,000	2.0
6. PWS56-5-4-8	173 ab	3.20 ab	63 bc	151	32,000	0.5
7. PWS56-5-5-24	146 bcd	3.13 b	58 c	147	32,000	0.5
8. UB2	201 a	3.38 a	58 c	153	32,000	0.1
<b>Average</b>	<b>155</b>	<b>3.12</b>	<b>67</b>	<b>150</b>	<b>32,000</b>	<b>0.8</b>
<b>CV (%)</b>	<b>13.5</b>	<b>4.5</b>	<b>14.3</b>	<b>2.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 6** Yields and yield component in late rainy season, 2019 from farm trial at Loei Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	100 bcd	2.50 c	125	50 a	36,312 bc	0.0
2. PWS56-3-3-6	111 a-d	2.90 b	127	32 b	40,022 a	0.0
3. PWS56-5-3-6	132 a	2.88 b	128	40 b	35,733 bc	0.0
4. PWS56-5-3-26	88 d	2.52 c	126	34 b	34,689 bc	0.4
5. PWS56-5-4-3	97 cd	2.60 c	126	36 b	37,200 ab	0.4
6. PWS56-5-4-8	120 abc	2.67 bc	127	37 b	34,645 bc	0.0
7. PWS56-5-5-24	121 abc	2.86 b	130	34 b	33,756 c	0.0
8. UB2	126 ab	3.24 a	128	38 b	34,422 bc	0.0
<b>Average</b>	<b>112</b>	<b>2.77</b>	<b>127</b>	<b>38</b>	<b>35,847</b>	<b>0.1</b>
<b>CV (%)</b>	<b>14.9</b>	<b>5.7</b>	<b>7.4</b>	<b>15.6</b>	<b>5.4</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 7** Average of yields, early and late rainy season, 2019 from farm trial at Ubon Ratchathani, Chiangmai and Loei Province

Varieties/lines	Early rainy season				Late rainy season				Average
	Ubon Ratchathani	Chiangmai	Loei	Average	Ubon Ratchathani	Chiangmai	Loei	Average	
1. PWS56-3-1-38	120 bc	179 ab	56 bc	118	37 b	145 bcd	100 bcd	94	106
2. PWS56-3-3-6	90 de	157 ab	83 ab	110	39 b	136 cd	111 a-d	95	103
3. PWS56-5-3-6	83 de	165 ab	74 ab	107	56 a	144 bcd	132 a	111	109
4. PWS56-5-3-26	143 a	134 b	41 cd	106	38 b	169 bc	88 d	98	102
5. PWS56-5-4-3	124 b	122 b	18 d	88	28 b	128 d	97 cd	84	86
6. PWS56-5-4-8	117 bc	168 ab	90 a	125	37 b	173 ab	120 abc	110	118
7. PWS56-5-5-24	77 e	149 ab	84 ab	103	33 b	146 bcd	121 abc	100	102
8. UB2	102 cd	216 a	87 ab	135	52 a	201 a	126 ab	126	131
<b>Average</b>	<b>107</b>	<b>161</b>	<b>67</b>	<b>112</b>	<b>40</b>	<b>155</b>	<b>112</b>	<b>102</b>	<b>107</b>
<b>CV (%)</b>	<b>11.9</b>	<b>27.1</b>	<b>29.2</b>	<b>-</b>	<b>20.9</b>	<b>13.5</b>	<b>14.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 8** Average of yields, 1,000 seeds weight and percentage of oil sesame, early and late rainy season, 2019 from farm trial at Ubon Ratchathani Chiangmai and Loei Province

Varieties/lines	Yield	1000 seeds weight	% oil sesame
	(kg./rai)	(g)	
1. PWS56-3-1-38	106	2.70	47.3 a
2. PWS56-3-3-6	103	2.92	45.0 bc
3. PWS56-5-3-6	109	3.17	43.9 c
4. PWS56-5-3-26	103	2.78	45.7 ab
5. PWS56-5-4-3	86	2.69	46.9 a
6. PWS56-5-4-8	118	3.00	44.1 bc
7. PWS56-5-5-24	102	3.03	43.2 c
8. UB2	131	3.33	44.0 bc
<b>Average</b>	<b>107</b>	<b>2.95</b>	<b>45.0</b>
<b>CV (%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Remark :** % oil sesame were analyzed at only Ubon Ratchathani Province

**Table 9** Yields and yield component in early rainy season, 2020 from farm trial at Ubon Ratchathani Province

Varieties/lines	Yield	1000 seeds	Number of	Plant	Number	Number
	(kg./rai)	weight (g)	pods/plant	Height	of plants	/branch
1. PWS56-3-1-38	82 a	2.30 d	143 c	42 a	40,022 a	0.0
2. PWS56-3-3-6	59 ab	2.64 bc	175 ab	26 b	21,045 c	0.8
3. PWS56-5-3-6	65 ab	2.91 a	177 ab	31 ab	25,531 c	0.0
4. PWS56-5-3-26	26 c	2.05 e	174 ab	36 ab	32,378 b	2.3
5. PWS56-5-4-3	20 d	2.06 de	161 b	28 b	23,572 c	0.5
6. PWS56-5-4-8	57 bc	2.57 c	176 ab	31 ab	20,778 c	0.1
7. PWS56-5-5-24	42 bcd	2.85 ab	176 ab	28 b	19,156 c	0.0
8. UB2	34 cd	2.56 c	179 a	32 ab	22,889 c	0.0
<b>Average</b>	<b>48</b>	<b>2.49</b>	<b>170</b>	<b>32</b>	<b>25,671</b>	<b>0.5</b>
<b>CV (%)</b>	<b>31.5</b>	<b>6.6</b>	<b>6.1</b>	<b>23.3</b>	<b>17.4</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 10** Yields and yield component in early rainy season, 2020 from farm trial at Chiangmai Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	102 abc	2.48 cde	172 ab	81 a	32,000	0.0
2. PWS56-3-3-6	117 ab	2.68 bcd	196 a	58 b	32,000	0.2
3. PWS56-5-3-6	128 a	2.88 ab	186 ab	54 b	32,000	0.1
4. PWS56-5-3-26	73 c	2.30 e	176 ab	81 a	32,000	2.9
5. PWS56-5-4-3	63 c	2.40 de	163 b	61 b	32,000	2.2
6. PWS56-5-4-8	115 ab	2.85 ab	195 a	58 b	32,000	0.3
7. PWS56-5-5-24	82 bc	3.00 a	191 a	48 b	32,000	0.1
8. UB2	119 ab	2.75 abc	187 ab	53 b	32,000	0.0
<b>Average</b>	<b>100</b>	<b>2.67</b>	<b>183</b>	<b>62</b>	<b>32,000</b>	<b>0.7</b>
<b>CV (%)</b>	<b>26.5</b>	<b>6.7</b>	<b>8.3</b>	<b>18.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 11** Yields and yield component in early rainy season, 2020 from farm trial at Loei Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)	1000 seeds weight (g)	Number of pods/plant	Plant (cm)	Number of plants harvest	Number of branch /plant
1. PWS56-3-1-38	41 bcd	2.27 c	123 ab	84 a	13,267 b	0.3
2. PWS56-3-3-6	71 a	2.69 b	135 ab	55 b	22,733 a	0.5
3. PWS56-5-3-6	75 a	2.87 ab	133 ab	65 ab	14,444 b	0.4
4. PWS56-5-3-26	31 cd	2.21 c	122 ab	55 b	13,756 b	1.3
5. PWS56-5-4-3	24 d	2.14 c	120 b	42 b	18,178 ab	0.9
6. PWS56-5-4-8	59 abc	2.72 b	137 a	64 ab	18,667 ab	0.3
7. PWS56-5-5-24	71 a	3.03 a	136 ab	47 b	14,178 b	0.2
8. UB2	61 ab	3.02 a	137 a	47 b	16,489 ab	0.6
<b>Average</b>	<b>54</b>	<b>2.62</b>	<b>130</b>	<b>57</b>	<b>16,464</b>	<b>0.6</b>
<b>CV (%)</b>	<b>34.7</b>	<b>4.7</b>	<b>7.6</b>	<b>25.7</b>	<b>28.8</b>	<b>-</b>

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 12** Average of yields, 1,000 seeds weight and percentage of oil sesame, early rainy season, 2020 from farm trial at Ubon Ratchathani, Chiangmai and Loei Province

Varieties/lines	Yield (kg./rai)			Average	1000 seeds	% oil
	Ubon Ratchathani	Chiangmai	Loei		weight (g)	sesame
1. PWS56-3-1-38	82 a	102 abc	41 bcd	75	2.35	44.8 a
2. PWS56-3-3-6	59 ab	117 ab	71 a	82	2.67	43.7 abc
3. PWS56-5-3-6	65 ab	128 a	75 a	89	2.89	44.1 ab
4. PWS56-5-3-26	26 c	73 c	31 cd	43	2.19	41.5 c
5. PWS56-5-4-3	20 d	63 c	24 d	36	2.20	42.8 abc
6. PWS56-5-4-8	57 bc	115 ab	59 abc	77	2.71	44.0 ab
7. PWS56-5-5-24	42 bcd	82 bc	71 a	65	2.96	43.2 abc
8. UB2	34 cd	119 ab	61 ab	71	2.78	42.2 bc
Average	48	100	54	67	2.59	43.3
CV (%)	31.5	26.5	34.7	-	-	3.2

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT

**Table 13** Average of yields, early and late rainy season, 2019-2020 from farm trial at Ubon Ratchathani, Chiangmai and Loei Province

Varieties/lines	2019						2020			Average	% Oil	% relative
	Early rainy season			Late rainy season			AVG	Early rainy season			AVG	2019-2020
	UBN	CMI	LEI	UBN	CMI	LEI		UBN	CMI	LEI		
1. PWS56-3-1-38	120	179	56	37	145	100	106	82	102	41	75	96
2. PWS56-3-3-6	90	157	83	39	136	111	103	59	117	71	82	96
3. PWS56-5-3-6	83	165	74	56	144	132	109	65	128	75	89	102
4. PWS56-5-3-26	143	134	41	38	169	88	102	26	73	31	43	83
5. PWS56-5-4-3	124	122	18	28	128	97	86	20	63	24	36	69
6. PWS56-5-4-8	117	168	90	37	173	120	118	57	115	59	77	104
7. PWS56-5-5-24	77	149	84	33	146	121	102	42	82	71	65	89
8. UB2	102	216	87	52	201	126	131	34	119	61	71	111
<b>Average</b>	<b>107</b>	<b>161</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>155</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>94</b>
												<b>-</b>

Remark : Ubon Ratchathani Province (UBN), Chiangmai Province (CMI) and Loei Province (LEI)