

ข้อมูลพืชสำหรับการพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชสำหรับพื้นที่ สวพ. 7

ชนิดพืช กัญหวมทอง

| เดือน | ระยะพืช | ศัตรูพืชที่พบ | ลักษณะอาการที่อาจพบ | แนวทางในการป้องกันกำจัดในพื้นที่ |
|---------|------------|---|---|--|
| ธันวาคม | เก็บเกี่ยว | ใบจุดชิกาโตกา (เชื้อรา <i>Pseudocercospora musae</i> (<i>Mycosphaerella musicola</i>)) ในกัญหวม  | เริ่มแรกพบจุดขนาดเล็ก สีเหลือง ต่อมาขยายใหญ่ เป็นขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเส้นใบ จากนั้นจะใหญ่ขึ้น ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทา แผลคล้ายรูปตา มีวงสีเหลืองล้อมรอบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะเหลือง ขอบใบแห้งและฉีกขาด ทำให้กัญหวมมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ การออกดอกและผลไม่ปกติ ผลไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก แก่ก่อนกำหนด | 1. ตัดแต่งใบกัญหวมในแต่ละต้น หรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อลดความชื้นในกอ กัญหวม ที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสะสมโรค 2. ตรวจสอบแปลงกัญหวมอย่างสม่ำเสมอ หากพบใบกัญหวมมีอาการโรค ให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล 43% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80 % WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรค |

